

**JO MARIAE LANCISI
... DE SUBITANEIS
MORTIBUS LIBRI
DUO, HAC TERTIA
EDITIONE AB...**

Giovanni Maria Lancisi, Isabella
Piccini



D E
S U B I T A N E I S
M O R T I B U S.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

J O: M A R I Æ
L A N C I S I I

Intimi Cubicularii, & Archiatri Pontificii
D E S U B I T A N E I S
M O R T I B U S .
L I B R I D U O ,

Hæc tertiâ editione ab Authore aucti , & recogniti.



V E N E T I I S , M D C C V I I I .

Sumptibus Andreae Poleti.

SUPERIORUM PERMISSU, & PRIVILEGIO.

*Attendite vobis , ne fortè graventur corda vestra in
crapulâ , Et ebrietate , Et curis hujus vitæ , Et
superveniat in vos repentina illa dies.*

Lucæ 21. 34.

CLEMENTI XI.
PONT. OPT. MAX.

IO: MARIA LANCISIUS
FELICITATEM.



*Ajus, ac justius
obsequii genus,
quàm simplicem
libri nuncupatio-
nem, sisto ad SAN-
CTITATIS TUÆ PEDES, B. P.,
dum*

*dum hos qualescumque labores
meos, in publicam salubritatem
Tuo Jussu, quâ decet veneratio-
ne, susceptos, Tibi nunc humili-
ter offero. Hoc enim, quantum-
vis tenuissimo munere, non solum
gratum animum erga Benefi-
centis. Principem; sed promp-
tam etiam, ac sollicitam erga Su-
prema Tua Mandata volunta-
tem profiteor, & obedientiam. Si-
quidem, hoc ineunte anno, quo re-
pentinarum mortium strages in
Urbe multis jam mensibus gras-
sabatur, nihil, post Divinam im-
ploratam Opem, habuisti prius,
quàm, detectis causis, ipsas mor-
borum radices evellere. Hinc, ut
soli-*

sollicitudine, curâque meâ Vigilantissimæ Providentiæ Tuæ, Principibus aliis ad Populorum salutem imitandæ, responderem; suspensio tantisper studio, Tibi jam debito, Tibique à me plures annos elucubrato, de Motu Cordis, & Aneurysmatibus; me totum ad ista converti. Quare Pindari ductu, qui, cum promissum Agesidamo hymnum distulisset, adjecit alium breviorum, ut sorti persolvendæ usuram adjungeret; nos, hæc inter moras, præsentibus libris, tanquam fœnus majoris operis, Tibi dependimus; hoc certè Pindaro diligentiores, quod sortem fœno-

Od. 10.
& 11.

*re præcurramus. Utinam hæc,
PONTIFEX SANCTISSIME, id uni-
cè assequantur, ut Tuo, univer-
sos apud homines admirabili,
Judicio comprobentur: quo sanè
Judicio, insigniumque Operum,
à Te jam absolutorum, luce, &
exemplis in spem erigimur, ut
Religionem quoque ad extrema
terrarum propagatam, reliquas
sacras Ædes, ac vetera Urbis
Monumenta restituta, novaque
in prisorum æmulationem Cæ-
sarum sublimiùs evecta publi-
cè gratulemur; & magnifica in-
ter hæc, naturalibus etiam scien-
tiis latiore viam per tuta, ac
solida experimenta patefactam*

pro-

prospiciamus : ne quid sub Tanto
Principe ipsa Roma vel Atticæ
Academiæ, vel Exterorum no-
stræ ætatis inventis habeat invi-
dendum ; quorum profectò Con-
siliorum magnitudinem nemo
cogitatione rectiùs metiatur ,
quàm nos, qui, SANCTITATI TUÆ
propiùs adstantes , famam de
Justitiâ , de Celsitudine Animi
Tui , cum admirabili Modera-
tione conjunctâ , deque cæteris
Virtutibus universis latissimè
diffusam , veritate ipsâ longè
minorem animadvertimus ; atq;
Tuis in Actibus cunctis ea , quæ
rarè in eundem conveniunt, unâ
concurrere , admiramur , sum-

*mam nempe Doctrinam cum
incredibili Humanitate, Gravi-
tatemq; veteris disciplinæ, quam
crebris jejuniis, & austerâ pie-
tatis exercitatione profiteris, mi-
râ cum sermonis, Morumque
suavitate conspirantem; ut qui
tam sublimi fastigio Potestatis,
ac Meritorum, præclarisq; Ope-
ribus antecellis, tamen aliis Te
fœdere charitatis, ac sensu Chri-
stianæ humilitatis exæques. Ita
Deus Te diù sospitem ad Eccle-
siæ, & Populorum felicitatem
servet, ac Cæptis Tuis, votisque
nostris benignus adspiret.*

*Ex Quirinali Tuo Kal. Nov.
MDCCVI.*

Typographus Lectori.



Quoniam comperimus, à doctis non solum in Arte Medicâ, sed in omni eruditione Viris cupidè flagitari exemplaria, quæ jam rarefcunt, Librorum de Subitaneis Mortibus Illustrissimi Lancisii; enixè postulavimus ab Excellentiss. Viris, & Scriptoribus D. D. Antonio Francisco Bertino, & Jo: Baptista Morgagnio, ut proprio illorum, & nostro nomine aliquot horas à Clarissimo Authore impetrarent; unde, refrigerato inventionis amore, opus repeteret. Nostrorum autem votorum, propter singularem utriusque Viri humanitatem, compotes facti, tertiam hanc editionem, novis, innumerisque interspersis observationibus, & annotationibus, summâ, ut fieri potuit, fide, ac diligentia in manus tuas de nostro prælo venire, curavimus. Vale.

NOI REFFORMATORI Dello Studio di Padoa.

H Avendo veduto per la Fede di revisione , & approbatione del P. F. Vincenzo Maria Mazzoleni Inquisitore, nel Libro intitolato – *Jo: Mariae Lancisii de Subitaneis Mortibus Libri duo* – non v'esser cos' alcuna contro la Santa Fede Cattolica , & parimente per Attestato del Segretario Nostro , niente contro Principi , & buoni costumi , concedemo Licenza ad Andrea Poletti Stampatore, che possi esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe , & presentando le solite copie alle Publiche Librerie di Venetia , & di Padoa.

Dat. 23. Maggio 1708.

§ Ferigo Marcello Proc. Reff.

§

§ Marin Zorzi Reff.

Agostino Gadaldini Segr.
OR.

ORDO, ET INDEX

Capitum, Historiarum, & Scholiorum,
quæ in duobus his Libris
continentur.

Occasio scribendi.

LIBER PRIMUS.

- CAP. I. *Vita in quo consistat, præsertim apud animalia perfecta.* pag. 1
- CAP. II. *Ostenditur, mortem esse individuan, & subitanæam, sed ex hominum opinione variè dispertiri.* pag. 7
- CAP. III. *Quæ vera sit in hominibus mortis idea, & unde discrimina petenda sint.* pag. 10
- CAP. IV. *De naturâ, & differentiis repentinæ mortis.* pag. 13
- CAP. V. *Agitur in genere de causis mortis, quam vocant repentinam.* pag. 15
- CAP. VI. *De causis subitanæ mortis ex parte fluidorum majoris usus, & primò ex parte aeris.* pag. 18
- CAP. VII. *De causis subitanearum mortium ex parte sanguinis.* pag. 32
- CAP.

- CAP. VIII. *De causis subitaneorum mortium ex parte fluidi nervorum, seu spirituum animalium.* pag. 35
- CAP. IX. *De causis subitaneæ mortis ex parte solidorum majoris usus, & primò ex parte instrumentorum, respirationi famulantium.* p. 48
- CAP. X. *De causis improvisarum mortium ex parte cordis, & magnorum vasorum.* pag. 52
- CAP. XI. *De causis improvisarum mortium ex parte cerebri, & nervorum.* pag. 59
- CAP. XII. *Subitanei morbi hæcenus expositi ad tria capita rediguntur, ad Suffocationem, ad Syncopem, atque ad Apoplexiam, quæ & simul plerunque concurrunt.* pag. 75
- CAP. XIII. *Recensitæ causæ subitaneorum mortium invincibiles, aut vincibiles existunt.* pag. 78
- CAP. XIV. *De signis improvise mortis, & primò de simulatis, ac suppositis, seu supplantatis mortibus.* pag. 83
- CAP. XV. *Exponitur difficultas inveniendi certa signa, quibus dignoscantur qui naturâ, non arte pseudo-mortui occurrunt.* pag. 85
- CAP. XVI. *De signis, quibus pseudo-mortui à verè mortuis distingui possunt.* pag. 89
- CAP. XVII. *De signis medicis, quibus repentina mors prænosci potest.* pag. 96
- CAP. XVIII. *Agitur de signis futuræ mortis repen-*

- repentinæ , petitis ex læsione instrumentorum ,
respirationi famulantium.* pag. 101
- CAP. XIX. *De signis futurae subitaneæ mortis
à corde , magnis vasis , & sanguine.* pag. 107
- CAP. XX. *De signis improvise mortis à cere-
bro , nervis , & liquido animali.* pag. 123
- CAP. XXI. *Agitur in genere de methodo præ-
servandi à subitaneis mortibus.* pag. 131
- CAP. XXII. *Quâ methodo præservanda sint
corpora aspectu sana.* pag. 135
- CAP. XXIII. *De methodo præservandi à subi-
taneo interitu corpora valetudinaria.* pag. 141

LIBER SECUNDUS.

De subitaneis mortibus, illarumque causis,
quæ decursu annorum 1705. & 1706.
Romæ contigerunt.

- CAP. I. *Quæritur , an causa repentinæ mor-
tium , quæ Romæ per hæc tempora grassate
sunt , fuerit universalis , & simplex , an verò
particularis , & mixta.* pag. 165
- CAP. II. *Demonstratur , inaequalem aeris con-
stitutionem fuisse etiam inter causas vagan-
tium repentinæ mortium.* pag. 169
- CAP. III. *Adducuntur quædam argumenta ad
con-*

confirmandum , non ex universali solùm causâ tot hominum discrimina Romæ contigisse , sed ob morbosas eorundem corporum dispositiones , ac potissimùm intemperantiam . pag. 172

CAP. IV. *Numerus morientium in Urbe forsitân hoc tempore minor extitit , licet major visus sit , ex quo consveti , Et exitiales Romæ morbî nequaquam vagati sunt .* pag. 178

CAP. V. *Quæ remedia hoc anno jis maximè profuerint , qui à subitaneis morbis , repentinas mortes minitantibus , evaserunt .* pag. 181

OBSERVATIONES

Physico-Medicæ nonnullorum , qui , cùm primùm istiusmodi repentinis morbis tentati fuerint , feliciter evaserunt . pag. 197

OBSERVATIO I. *Apoplexia cum aphoniâ , Et paralyâ dexteræ corporis medietatis , pblebotomiâ , catharticis , ac diaphoreticis soluta in Illustriss. Archiepiscopo Bottino .* pag. 198

OBSERVATIO II. *Fortis Apoplexia cum relicta paralyâ feliciter curata in Matronâ sexagenariâ .* pag. 204

OBSERVATIO III. *Subita capitis occupatio cum aphoniâ ex affectione cerebri partim idiopathicâ , partim sympatbicâ , prosperè cedens*

<i>-dens in Reverendissimo P. Abb. Malaspi- na.</i>	pag. 208
OBSERVATIO IV. <i>Apoplexia cum affe- ctione epilepticâ, & syncopali in paralyfim dexteræ medietatis corporis, salvâ tunc vitâ, concedens in Illustriss. Præsule Spada.</i>	p. 211
<i>Ætiologia hujus morbi, & Ægri mors.</i>	pag. 220
<i>Dissectio cadaveris.</i>	pag. 225
<i>Scholium dissectionis.</i>	pag. 228

OBSERVATIONES

<i>Physico-Anatomica nonnullorum, qui primo im- petu morbi repenti per hæc tempora perie- runt.</i>	pag. 240
OBSERVATIO I. <i>Repentina mors ex apo- plexiâ syncopali in Viro obeso, & cacochy- mo.</i>	pag. 243
<i>Cadaveris dissectio.</i>	pag. 245
<i>Scholium.</i>	pag. 248
OBSERVATIO II. <i>Sabita mors ex syncope ob cordis magnitudinem, prolapsum, atque aneurysma.</i>	pag. 255
<i>Cadaveris dissectio.</i>	pag. 257
<i>Scholium.</i>	pag. 258
OBSERVATIO III. <i>Cita mors ob interce- ptum motum aeris, & sanguinis in præcordiis,</i>	

<i>una cum cerebri consensu.</i>	pag. 269
<i>Cadaveris dissectio.</i>	pag. 270
<i>Scholium.</i>	pag. 272
OBSERVATIO IV. <i>Repentina mors ex convulsione thoracis, praecordiorum, meningum, ac totius corporis, in fortissimam apoplexiam ocysimè desinente.</i>	pag. 281
<i>Cadaveris dissectio.</i>	pag. 282
<i>Scholium.</i>	pag. 285
OBSERVATIO V. <i>Improvisa mors ex subitâ cavæ intrâ pericardium disruptione, cum aneurysmate arteriæ magnæ.</i>	pag. 294
<i>Cadaveris dissectio.</i>	pag. 295
<i>Scholium.</i>	pag. 299

OCCASIO SCRIBENDI

De Subitaneis Mortibus.



QUIM in Urbe Româ improvisæ hominum mortes, decursu æstatis, autumni, & hyemis anni 1705. usque ad æquinoctium vernalis currentis anni 1706. frequentiùs acciderint; atque hinc vulgus, tacito perculsum timore; ac metu errabundum, in diversa, ut assolet, scinderetur, nunc pravam tabaci qualitatem, nunc putidos ex præteritis terræ motibus excussos halitus, nunc abusum chocolatæ, nunc ignotum ambientis virus imperitè non minùs, quàm temerè inculpans; meritò Sanctissimus, ac Vigilantissimus Pontifex CLEMENS XI. primò Animum ad Spiritualia Remedia convertit, fervidis ad Deum fufis Precibus, novaque

*Qualis of-
se debeat
Principi
vigilantia
in his ca-
sibus.*

vâque in Ecclesiâ Universali, ad implorandam benè, pièque moriendi gratiam, institutâ Liturgiâ: subindè Prudentiam cum Pietate conjunxit, & verè sapiens publicâ usus fuit providentiâ, quæ, in tanti mali causas diligenter inquirens, eidem opportuna, si quæ forent necessaria, præsidia porrigeret, vel saltèm bonâ spe timidâ, ancipitesque populi mentes firmaret. Jussit propterea mense Januario labentis anni, ut Protomedicus, & Consiliarii Medicorum Almæ Urbis Collegii, dissectis aliquorum, qui repenti decesserint, cadaveribus, veras grassantis Libitinæ causas perquirerent; quibus sanè extispiciis me idcirco præesse, mandavit, ut, re penitus observatâ, si quæ magis spectanda occurrissent, SANCTITATI SUÆ illico referrem.

Omnem interea facturis periculum

lum munificam præbuit opem Eminentiss. Card. Pallavicinus, Gubernator tunc Urbis Meritissimus. Qua de re, selecto ad cadaverum sectiones publico Romani Archilycæi Theatro, cœpta fuerunt experimenta.

Postulat itaque suspicienda, admirandaque Sollicitudo PONTIFICIS, ut, cum omnia, quæ publica, totius nempe Christiani Orbis, quæ privata subjectarum Provinciarum studia divino quodam Animi robore Ipse regat, ac moderetur, faciatque unus, & solus, quæ præsens stupeat ætas, & miratura sit postera; postulat, inquam, ut nos quoque in partem, etsi minimam, Suarum curarum scribendi celeritate, atque alacritate veniamus. Et quoniam in causas vagantium repentinorum mortium Supremo PRINCIPIS Jussu fati per cadavera, perque alias ob-

observationes inquisitum fuit , consentaneum rationi ducimus , peracta , fideliterque descripta experimenta ad rationis lancem diligenter expendere : quæ quidem eò nunc liberiùs in manus hominum prodire sinimus , quòd plures viderimus de subitis istius anni casibus sparsim editas hetrusco , ac latino sermone *Dissertationes* , quæ , utcunque argumentum egregiè attingant , integrum tamen ; propter observationum paucitatem , perstrictumque nimis causarum examen ; minimè complectuntur .

opris distri-
frutio .

At verò , ut opus hoc nec inutilis , nec indecora doctrinæ varietas commendaret , è re putavimus in primo *Libro* agere de *Subitaneis Mortibus* in univèrsam , idque eò libentiùs , quòd nemo *Recentiorum* magnum aliquid conferre huc videatur . Multi enim particulatim ,
& ob-

& obiter, nullus, quòd sciam, post
detectam circulationem, genera-
tim, discretè, atque ex instituto,
de hoc argumento scripserunt; vi-
suri deinde in secundo Libro, veluti
in hypothesis, an universale, vel par-
ticulare, an verò, ut putamus, mix-
tum fuerit principium, ex quo su-
premi hoc anno fati causa tot Ro-
manis Civibus, & Incolis impen-
derit. Quod variis insuper obser-
vationibus anatomicis ostendere,
ac demonstrare curabimus. His
fruere, Lector, & vale.

Hippocrates lib. 2. de morbo

Οἱ ἢ ἀθρώποι ἐκ τῶν φανερῶν τὰ ἀφανῆ σκέπτεσθαι ἢ ἐπίστανται ,
τέχνησιν γὰρ χρέμεσθαι , ὁμοίησιν ἀθρώπινη φύσει , ἢ γινώσκουσι .
Θεῶν γὰρ νόος ἐδίδαξε μιμῆσθαι τὰ ἑαυτῶν , γινώσκοντας ἢ παύε-
σι , ἢ ἢ γινώσκοντας ἢ μιμῶνται .

At verò homines ex manifestis obscura con-
siderare non noverunt ; cùm enim artibus
utantur similibus humanæ naturæ , id ip-
sum ignorant . Divina enim Mens edo-
cuit ipsos sua ipsorum imitari ; ita ut co-
gnoscant , quæ faciunt , & non cognô-
scant , quæ imitantur .

Hippocrates lib.1. de Dietâ num.13.

I
DE SUBITANEIS
MORTIBUS

In genere
LIBER PRIMUS.

*Vita in quo consistat, præsertim apud
animalia perfectæ.*

C A P U T I



UM nemo veram, ac per-
spicquam ullius mortis ide-
am fingere sibi possit, quin
claram priùs, atque ve-
ram vitæ rationem diligen-
ter expendat; profectò ne-
cesse in præsens erit, ut, naturam, &
causas subitanearum mortium investiga-
turi, genuinas vitæ notiones præmitta-
mus. Longas itaque rejicientes disputa-
tionum tricas, quibus Peripatetici se suis
aculeis compungunt; illud unicè adver-
tendum ducimus, proprias, atque indivi-
duas rerum naturas per complexum mul-

*Ex vitæ
notione vera
mortis idea
desumenda.*

*Singularium
natura per i-
deas abstra-
ctas rariò elu-
cescit.*

A ta-

tarum abstractarum idearum rarò perspicuas haberi posse . Quo fit , ut prisci physiologi , dum universalem quandam vitæ rationem quærunt , quæ cum plant-animalibus , insectis , & monstris , cum piscibus , brutis , & hominibus adamus-sim congruat , nihil præter confusionem , & ambiguitatem nostris mentibus ingerant . Exemplo sint quæ sparsim de vitæ conceptibus obscurè tradidit Aristoteles , & collegit inter alios^a Licetus .

^a Aristoteles de Vita conceptus tradidit obscuros .

^a Lib. de jis qui viv. sinè alim.

Res, rerumque modi vocum numerum superant .

II. Cùm enim vocum numerus à rebus , rerumque modis longè superetur ; cùmque nomina à majoribus nostris aliquando perperam rebus imposita fuerint ; exindè sæpe oritur , ut cupientes unâ sub voce multas res comprehendere , incauti aut falsas , aut saltèm obscuras ideas nostris cogitationibus infundamus , atque admisceamus .

III. Qua de re pauca de vita hîc præfaturi , non de quacunquè etiam lenissima fluidorum motione intrâ quacunquè resistantium , & cohærentium corporum organa , ex principio seminali proficiscentia , nobis agendum proponimus (etiam si sciamus , notionem istam universales quas-

quasdam vitæ regulas , ac rationes in nobis utcunque posse ingenerare) sed consilium est, nostram mentem , sponte alioquin suâ per omnia viventium regna vagaturam , ad perfectorum , ut ajunt , solummodò animalium vitam inquirendam figere , ac seriò determinare.

IV. Quod fanè ut assequamur , memoriâ repetendum est ex Anatomicis, & Chymico-mechanicis, tria esse in perfectis animalibus organa, quæ propter maximam, quam præstant, utilitatem, vocamus solida majoris usus ; totidemque esse fluida consimilis necessitatis . Solida sunt primò instrumenta respirationis, nimirum machina thoracis cum viis suis à pulmonibus usque ad fauces , & os; Secundò cor cum appensis sanguiferis canalibus; Tertio cerebrum unà cum continvatis nervis præsertim viscerum , quos splanchnicos appellant. Fluida verò censentur primò aer cum subtilissimis, pernicissimique motus, in aere contentis, partibus ; Secundò sanguis, seu fluidum universale cum aliis liquidis , illud integrantibus ; Tertio fluidum illud , quod

Solida, & fluida majoris usus, utraque tria, & qualia.

Splanchnici nervi quales.

vocant spiritum animale, & succum nerveum.

V. Nunc verò intelligere non erit arduum, vitam in perfectis animalibus (ut consultò de illorum sensationibus taceamus) non unidumtaxat, sed complexui plurimorum principiorum, ac duorum potissimùm deberi, organicæ nimirum structuræ solidarum partium majoris usus, simulque congruæ mixturæ, fluiditatis, ac moli partium liquidarum similis usus, quæ tum intestino nixu, tum etiam externâ continentium pressione perenniter eâ methodo agitantur in nobis, ut, animâ præfide, liquida cum solidis mutuò sibi opitulentur, vicissimque manus præbeant ad motum. Scilicet quemadmodum ars, naturæ operum imitatrix, ut advertit Hippocrates, qui primus mechanicam in medicinam invexit, quemadmodum, inquam, ars hydraulicas machinas compaginavit, quas eadem aqua mota, dum relabitur, ad certum tempus movet, iterumque movetur; ita multiplici, ac nunquam fatis admirando divino artificio, idem sanguis, chylo renutritus, qui in jam natis ab alterno cordis,

pul-

Vita in animalibus perfectis solidarum ac liquidarum majoris usus structura, ac motui debetur.

Ars natura operum imitatrix.

Hippocr. primus mechanicam in medicinâ invexit.

pulmonum , ac thoracis motu pellitur , & quaquaverfum per arterias movetur , cùm partim penè immutatus per venas , partim sub fluidi animalis crafi per nervos recurrat , ac relabatur in thoracem , pulmones , & cor ; hæc rursùs viscera movet , à quibus fuerat dimotus , eritque in pofterum per fingulas ætates movendus . Similiter cerebrum fuis cum membranis , quod liquidum animale , propriis è glandulis fecretum , pro fua parte ad movendum cor , & thoracem per nervos undatim pellit , accepto viciffim à corde , ac thorace fanguine pro illius viribus movetur . Vita igitur perfectorum animalium nihil aliud effe videtur , quàm continuus , præfide , ac movente animâ , fluxus , ac refluxus , plùs , minùsve sensibilis aeris , fanguinis , & liquidi nervorum per organa , & ex organis majoris ufus , fatìs probè conftitutis , & mutuò , atque alternè plùs minùsve fenfibiliter agitatìs , & agitantibus .

Vita continuus est fluxus refluxusq; aeris, fanguinis, & liquidi nervorum per organa majoris ufus.

VI. Si quis verò definitionem vitæ ex caufis phyfico-mechanicis subtiliter deducere malit , fatìs habebit , fi dicat ; *Vita est potentia , non impedita , machinæ ani-*

Definitio vitæ phyfico-mechanica.

ma-

malium ad motum fluidorum majoris usus .
 Ubi sanè principium ex potentiâ quidem, sed eâ non impeditâ, deduximus, ut vitam actu, non potestate solummodo, designaremus. Etenim in fœcundati ovi, sed non adhuc incubati, cicatriculâ inest certè potentia ad motum machinæ animalis, sed ea impeditur à liquidis femiconcretis, & à canalibus penè conniventibus. Unde, usque dum per incubatum impedimenta non tolluntur, fufis, seu rarefactis liquidis, simulque explicatis canalibus, animal vivere non dicitur.

*Ad vitæ con-
 servationem
 quomodo par-
 tes minoris
 usus concurrunt.*

VII. Ad Istorum deindè motuum conservationem mirâ profectò energiâ, miroque inter se ordine concurrunt innumera alia organa sub glandularum, tubulorum, muscutorumque specie, per viscera, artusque dispersa; scilicet ut fluida partim renoventur, partim defæcentur, ac perficiantur.

Osten-

Ostenditur, mortem esse individuan, & subitanæam, sed ex hominum opinione variè dispertiri.

CAPUT II.

QUæ per compendium in præcedenti cap. de vitæ ratione posuimus, nos faciliè ducent ad ea intelligenda, quæ mortis, subitanæ præsertim, naturam, & discrimina, non omnibus obvia, possunt ostendere.

II. Is porrò non sum, qui mortem repentinam, ut vulgò fertur, rarè censeam advenire: Nullam enim novi mortem, nisi repentinam, sive puncto temporis contingentem. Scilicet, ut vitæ principium in puncto saliente, cùm omnia concurrunt, subitò excitatur: ita vitæ finis, cùm aliquid ad vitæ necessitatem constantissimè deficit, repentè semper, hoc est puncto temporis, accidit. Iter utique ad mortem, quod ægritudinem, atque agonem appellamus, nunc tardum, ac longum, nunc plùs minùsve concitatum, ac brevè, fecit, ut vulgus hominum

Qualibet mors est repentina.

Vita, & mors puncto temporis accidunt.

Cur Vulgo mors, et si individua, in plures tamen distinguatur.

mor-

mortem, suapte naturâ individuum; distingueret in longam, brevem, ac subitanam. Illud verò nunquam non maximâ admiratione me perculit, quî nimirum fiat, ut delicata, ac perexilis hæc, affabrèque contexta, ac dimota fluidorum, solidorumque compago, quam viventium animalium dicimus, non semper citissimo, atque improvise morbo, sed tam sæpe naturali confecta senio, paulatim contabescat, ac dissolvatur.

III. At enim verò quanquam universæ mortes puncto temporis naturâ contingant; earum tamen aliquæ nobis metu, ac dolore prævisæ, ac diù, quasi dixerim, præsensæ, aliquæ verò tacitè veluti subrepentes, tanquam inopinatæ nobis offeruntur; quæ quidem variæ mortium species varias, corrigendi mores hominum in præceps labentium, occasiones, & causas moralibus potissimum Philosophis exhibuerunt; varias itidem Jurisconsultis, Canonistis, ac Theologis rationes præbere solent judicandi, decernendique circa ea, quæ dicuntur, aut fiunt ab hominibus in extremo vitæ termino constitutis. Qua de re fusè differit
Pau-

*Varia mortium
species quos
modis viventibus
utilis.*

Paulus ^a Zacchia. Physicis verò non tam morum, rerumque civilium, quàm valetudinis curam gerentibus, illud præcipuè hujusmodi moriendi discrimina suggerunt, ut diversas illorum causas diligenter perquirant, quibus detectis, & cognitis, ipsi judicent, num prævisas necesse aliquo excogitato, vel experimentis comprobato remedio avertere queant; & num quæ inopinatò nobis adveniunt, ipsæ quoque occulto aliquo, & peculiari prævideri signo, aut exhibitio pharmaco, saltèm ad animæ salutem, aliquantisper prorogari possint. Quòd si nec prævideri, nec prorogari ullâ arte valeant, id Medici assequantur, ut philosophiam experimentalem pleniùs illustrent. *Pulchrum est enim, ut scripsit ^a Hippocrates, ea quoque addiscere, quæ in experimentum assumpta successu caruerunt, & cur successum non habuerunt.*

^a Quæst. Med. leg. lib. 2. tit. p. qu. 19.

Philosophia experimentalis illustratur etiam jii, quæ successu caruerunt.

^a Lib. de artic. n. 46.

Hippocras. resimonium.

IV: Itaque hujusmodi rationibus ducti utemur nos etiam cum vulgo jis differentiis, & nomenclaturis mortium, quæ inter se distinguuntur, non ex variâ ipsius necis naturâ, cujus una semper, eademque proprietas est subitò invaden-

Mortis differentia unde petenda.

B di,

di, atque occupandi, sed solummodo ratione causæ, ac modi, nimirum morbi, qui mortem infert; vel ratione nostræ mentis, quæ de futuro interitu silet, aut cogitat: idcirco nonnullas subnectemus definitiones, ac divisiones, quas ituris per obscuros lethi libros lumen aliquod prælaturas non dubitamus.

Quæ vera sit in hominibus Mortis idea, & unde discrimina petenda sint.

C A P U T III.

Mors est totalis cessatio motus aeris, sanguinis, & liquidi nervorum in organis, & per organa majoris usus.

Mors in hominibus, qui perfectorum animalium sunt omnium opinione perfectissimi, quacunque ex causa, & quomodolibet contingat, est vera, & omnimoda cessatio motus aeris, sanguinis, & fluidi nervorum in organis, & per organa majoris usus, quæ naturales suas motiones verè, ac omnino amiserunt; ita tamen firma, & constans, ut per naturæ vires resuscitari non possit; seu, ut mechanicè loquamur, *Mors est impotentia*
ma-

machinæ animalium ad motum fluidorum majoris usus, quam utique animalium motuum cessationem, seu dissolutionem nexus naturæ, ut cum Aretæo loquar, necessariò comitatur, & constituit discessus animæ, quæ, ut momento temporis infunditur, ita momento temporis, planè imperceptibili, sejungitur à corpore, ac separatur.

II. Hujusmodi verò absoluta cessatio motuum animalium, & abscessio animæ à corpore, quanquam cogitatione citiùs perpetuò contingant; nihilominus tamen, vulgaris consuetudinis, clariorisque doctrinæ gratia, mors distinguitur in naturalem, immaturam, & violentam; singulæ verò in lentas, & subitaneas, in prævisas, ac præsensas, denique in improvisas, insensiles, atque inopinatas.

*Variæ mortis
differentiæ.*

III. Mors naturalis non ea solummodo dicenda est, quæ decrepitis, sed quæ, vel jis accidit, quos, etsi annorum numero metientes, passim vocemus pueros, adolescentes, ac juvenes, adeò tamen languidam suorum corporum constitutionem, nascendo, sortitos fuisse, vide-

*Mors naturalis
quam.*

Etiã in juvenibus.

B 2 mus,

mus, ut breviori temporis decursu, sed pari cum senibus fato, hebescentibus membris, ut Fabius loquitur, similes fenectæ pigrescant, ac necem ipsam incurrant; scilicet quòd utrobique sensim, ac sinè sensu subtile illud, atque oleoso-volatile, fluida, solidaque pervadens, ac dimovens, partim transpiratum deficit, partim non extricatum desideratur; unàque simul prompta fibrarum distractilitas, & contractilitas, lento tabo deficiens, fluida vicissim excipere, & contra eadem opportunè oscillare non potest.

— *Mors immatura qualis.*

IV. Mors immatura illa esse videtur, quæ ex interno morbo proveniens, homines, cæteroqui sanos, & vegetos, de medio vitæ tollit.

— *Violenta unde dicatur.*

V. Mors denique violenta ea firmanda est, quæ ab externâ, & cum sensibili, magnâque vi agente causâ, hominibus obvenit.

VI. De cæteris verò indicatis mortium discriminibus ita procul dubio discernendum putamus, ut eadem oriri dicantur à variis sentiendi, cogitandique modis, quibus homines diuturno, aut celeri, sensibili, aut insensibili morbo, atque

que agone confectos , cum signis lethali-
bus , vel finè illis sublatos videmus . De
subitaneâ siquidem , atque improvisâ
morte , quippe quæ nostri scopus est la-
boris , accuratius proximo capite agen-
dum esse , arbitramur .

De Natura, & differentiis repentinae mortis.

C A P U T I V .

Subitanea , seu repentina mors , ul-
tro hodie , vel ipsi vulgo innotescit ,
quominus longo fermone sit
pertractanda : illa siquidem appella-
ri solet , quæ per morbum celerrimi
motus homines ut plurimum fanos , vel
morbis inducias promittentibus detentos ,
absque ullo , vel certè breviori agone de
viventium numero tollit ; & cùm plerun-
que inopinatò imperitis adveniat , terri-
bile facit moriendi compendium .

*Repentina
mortis idea.*

II. In subitaneâ verò nece diligenter
notandum est , morbi celeritatem , ex
quâ ipsa constituitur , aliquando esse no-
bis insensibilem , & improvisam , ut oc-
cur-

Mors ex præcordiorum paralyfi insensibilis.

Syncope lethalem ex obstructione, & corrosione magnorum vasorum quam præcedant.

currit. e.g. in syncope ex præcordiorum, vasorumque sanguineorum paralyfi, quæ, nihil nobis de illâ cogitantibus, aut sentientibus, in mortem transire solet, si perseveret; aliquando verò ægrotis esse sensibilem, & curantibus prævisam; quemadmodum observamus in eâdem met lethali syncope ex obstructione, & corrosione magnorum vasorum; hanc enim præcedere solent anhelitus, dolores circa cor, pulsus inæqualitates, & animi deliquia, quæ ultro præsentuntur, mortemque reddunt Medicis non modò prævisam, sed præcautam. Ut nihil penitus dicamus de vulneribus summorum vasorum, de magnis cerebri contusionibus, de fulminum ictu, de carbonis empyreumate, de peste, similibusque veneficis causis, quæ nunc præsensæ, nunc clanculum, sæpe tamen repente solent occidere.

Agri-

*Agitur in genere de causis mortis, quam
vocant repentinam.*

C A P U T V.

Hic statim notandum, nullam esse causam, seu ægritudinem, Subitanea mortis causa semper cum tempore operari solent. celerrimè occidere potentem, quæ vires suas per divisibilia temporis momenta non exerceat; & licèt acutissimorum, atque maximè exitialium tempora morborum, quos ^a In suo Tract. de morb. subit. Ranchinus meritò subitaneos vocat, velocissimo cursu compleri, advertamus, nunquam tamen in syncope, e. g., aut apoplexiâ, quantumvis ocysimè plerunque soleant interimere, aliqua temporis momenta non excurrunt, priusquàm ad illud perveniatur momentum, in quo talis fluidorum, solidorumque quies inducta sit, quam post animæ discessum, mortem appellamus. Hoc autem propterea hîc advertimus, ne Lector in posterum queratur, si nos acturi de subitanæ, quam vocant, mortis causis, nonnullarum meminerimus, quæ clam, aut palam, semper tamen cum tempore, nostro-

strorum etiam sensuum iudicio operari solent.

Occasiones sæpe confunduntur cum causis subitaneæ mortis.

a Lib. 9. c. 12.

II. Præterea monendum ducimus, quædam pro veris subitaneæ mortis causis sæpe sæpiùs accusari, quæ potiùs occasiones videntur habendæ. *Fine namque vitæ nostræ, ut ait Val. ^a Max., variis, & occultis causis exposito, interdum quædam immerentia supremi fati titulum occupant: cum magis in tempus mortis incidant, quàm ipsam mortem accersant.*

Mortis subitaneæ causa duplicis sunt generis.

III. Quanquam verò innumeræ sint causæ, quæ subitaneas mortes valent inducere, æque variè inter se misceri, & complicari soleant, ut vix simplicem invenias; duobus tamen generibus, ad doctrinæ claritatem, aptè distingui posse videntur, quorum alterum est vitium solidorum, alterum fluidorum majoris usus, dummodo vitium sit constans, & maximum. Etenim cum vitam posuerimus in motu liquidorum, ac solidorum prædicti usus; certè quidquid citissimè, ac pertinaciter enunciata fluida, aut solida maximè lædere, vel alternos illorum motus, qui nullo artis, vel naturæ auxilio restituantur, tol-

tollere potest , repentinam mortem inducet.

IV. Et quoniam ut cap. I. §. IV. monuimus, tria sunt fluida, quæ vitæ machinam potissimum librant, aer, sanguis, & spiritus animalis, totidemque solida, thorax, cor, & cerebrum: ea propter ab horum altero, pluribus, aut omnibus, seorsum, aut simul, ab internis, vel externis causis, modò maximè, & constantissimè læsis, improvise mors impendere potest: ut enim singula hæc, integra cum sunt, in vitæ beneficium, ita, si vitientur, in maleficium, vicissim conspirant, viresque confociant.

Repentina mors oritur ex constanti magnaque læsione partium majoris usus.

V. Cæterum causas ab animo pendentibus ideo peculiari capite à corporeis non distinguimus, quia idcirco improvise mortem interdum accersunt, quòd solidas corporis partes, apud illos, quos interimunt, præcordia scilicet, & cerebrum, admodum imbecilla, penèque effracta, aut inveniant, aut efficiant. Unde promiscuè de utroque causarum genere scribere constituimus.

Animi passiones quomodo mortem improvise accersant.

*De causis subitaneæ mortis ex parte fluidorum
majoris usus, Et primò ex parte aeris.*

C A P U T VI.

V Idimus hæctenus in universum, ex quibus fontibus improvisarum, ut dicunt, necium causæ fluere soleant; nunc agendum, ut, saltèm obiter, internoscamus modos, quibus aliquæ ex unoquoque genere vires suas validissimas exerunt.

*Aer multifa-
ridum ad necem
subitam con-
spirat.*

II. Et quidem ex parte aeris celerimus animalium interitus potest contingere, cùm vel moles ejus, vel pondus insigni diminutione, aut excessu laborant; vel id, quod subtilissimum in aere ad vitæ necessitatem natat, & intercurrit, magno aliquo vitio lethaliter afficitur.

III. Diminuitur primò aeris moles in vacuo, per Boylei anthliam facto, ubi animalia statim deficiunt, & mox emoriuntur. Minuitur verò pondus in atmosphærâ, premendis pulmonibus, & sanguine respectivè leviori redditâ; ut in conclavi nimis calido, & quorundam montium cacuminibus, ubi, ut fertur, ce-

celerem homines interitum subeunt, nisi citò illinc reducantur.

IV. Propter auctam molem puri etiam aeris intrà cor (si aliquando ex sanguine secerni, ac ibidem subsistere posset) subita mors procul dubio contingeret. Celebre est doctissimi ^a Bohnii experimentum infundendi aerem per syringam intrà vivorum venas, unde animalia citissimè mōriuntur. Hoc tamen non proinde accidere, putarim, quemadmodum nonnulli eruditissimi Viri arbitrantur, quòd externus, purusque aer potentissimi coaguli, vel alterius veneni vires induat, exerceatque; nisi venenum appellare velimus quidquid ocyssimè necat, quo in casu simplex etiam aqua, vel nudus gladius venenum erit: sed quia aer, affatim intrà præcordia impulsus, spatium aufert sanguini, qui continvus, & continens sit oportet ex magnis venis in auriculas, & ventriculos, ut cor ex diastole migrare faciat in systolem. Ubi verò aer solitarius, vel cum minori, quàm par est, sanguinis quantitate dexteram auriculam, proximumque ventriculum occupaverit; tunc profectò eæ cordis ca-

^a Progy. 4. circul. Anat. Cita mors ex infuso per syringam aere intrà vivorum venas.

Rejicitur causa ab aliis a d. Anst.

Qualis sit vera causa.

vitates vel nullas, vel pauculas continebunt particulas oleoso-volatiles, quibus unâ cum nervorum liquido excitatur alterna tensio fibrarum muscularium, finus illos comprehendentium. Mors igitur in isto casu plus, minusve cita, non quidem ex aeris intrâ cor præsentia, verùm ex necessarij ad motum, cruoris absentia oriri dicenda erit. Vide quæ cap. VII. num. 1. & 2. trademus; sed multò uberiora dabimus in lib. de Corde.

V. E contrario adaugetur pondus aeris, ejusque compactior evadit elater in quibusdam metallicis fodinis. Narrat etiam Boylius, ex peculiari flante apud Septentrionales vento, homines repentè interire: tanta enim ejus est densandi vis, ut vel hispanicum vinum congelat.

VI. Tandem magno aliquo vitio noxius, ac lethalis fit aer, ut ex fumo carbonum in conclavi clauso, ex constitutionibus pestiferis, ex veneficis, vel, peculiari ratione particularibus naturis incongruis, odoramentis, aut sævâ quadam, ac naturali mephiti; ut etiam ex sepulchris, aut frumenti puteis diù clausis, cum primò aperiuntur; quæ omnia solent

lent inopinatò animalia suffocare, & interficere, densatâ potissimùm, aut vitiatâ illâ, quæ per cranii meatus, & pulmonum porulos permeare deberet, particularum mixturâ, quæque subtilis alioquin, & nescia quietis, ut sanguini fluiditatem, ac respectivam levitatem, ita & nervis spirituofum vitæ igniculum erat conciliatura.

VII. Sed quoniam non una, eademque omnibus in animalibus aut pulmonum laxitas, aut fluidorum mixtura invenitur; hinc non omnibus eadem nocent inquinamenta aeris; ex quo evenit, ut particulares narrentur pestes, quæ nunc solos homines, nunc hoc, vel illud pecudum genus interficiunt. Quinimo, cùm una, eademque minima solidorum textura, ac particularum sanguinem integrantium proportio nec semper, nec singulis hominibus accidat; hoc sanè in causâ est, cur, sæviente peste, in eâdem urbe, ac etiam domo, alii pereant, alii ferventur. Adèò verum est, ad labem, ex aere potissimùm contrahendam, eoque valere corporis dispositionem (quam ut plurimum intemperans, atque

in-

Aer juxta corporum dispositionem apparet noxius ..

incontinens vitæ genus infert) ut propterea nonnullis in medio Tiburi , Sardinia fit.

VIII. Cùm verò viginti ab hinc annis Eruditus Juvenis , meusque olim discipulus Antonius Donarellus me consulisset de repentinâ quadam syncope, præcocique morte ex subitò perruptâ serpentis cavernâ , cujus rei tum historia ad nos data , cùm nostra ad illum responsio suprapositam de labe aeris , diù conclusi , doctrinam confirmet , atque illustret , opportunum duxi utramque epistolam Lectori communicare.

Cl-

Clarissimo, Doctissimoque Viro
Præptori olim meo

D. JO: Mariæ LANCISIO

In Romano Archilyceo Anat. Prof. Celeberrimo.

ANTONIUS DONARELLUS S. P. D.

MUltis, magnisque tuis expertus
 sum officiis, quantâ me profe-
 quaris humanitate, ut novum
 nunc beneficium fidentiùs op-
 tem, atque abs Te alacriùs sperem. Hoc
 sanè acre est, ac sincerum Judicium tuum
 de quodam rarissimo casu, qui apud nos
 contigit elapsis diebus.

Rusticus valetudinarius, ætatis suæ *Historia.*
 annorum 23., cùm prope antiquam quer-
 cum effoderet, illamque, percutiendo,
 in ruinam daret, fortè fortunâ prægran-
 dem ex magnâ illius arboris cavernâ vi-
 dit egredientem serpentem, cujus post
 triplicem sibilum in terram ipse cecidit
 suorum omnium cum sensuum jacturâ. *Animi deli-*
 Sed vix parvus, abjectusque ad officia *quium.*
 rediit animus, cùm accurrentes sodales
 agrestem hunc juvenem statim illinc ab-
 du-

*Symptomata
exitialia.*

Præcox mors.

ducunt, & capitis dolore, sopore, vomitu, extremarumque partium perfrigeratione miserè correptum, ac paulò post rursus in lypothymiam labentem videntur; tandem duas circiter intrà horas cum supervenientibus signis propinati veneni è vivis sublatum dolentissimi collacrymarunt. Interim ipse ego tunc temporis accersitus, mœrens, & admirans, lividum cadaver observavi.

Postulo nunc, quam Tu, Clarissime Vir, fuisse judicas istius mortis causam, scilicet an solum timorem, an etiam venenum, per oculos, auresque infusum? an fortè serpentis sibilum, qui lethiferas particulas intrà Juvenis corpus per vias narium, orisque urgere potuerit? Habes, Doctissime Lancisi, quibus acerrimum, & singulare ingenium tuum exerceas. Vale, & me, perinde ut filium, precor, ames, dum ipse, Hippocratici memor Jurisjurandi, Te Parentis loco assidue veneror, & colo.

*Datum Introduci prid. id. Aug.
MDCLXXXVI.*

Stu.

Studiofissimo, optimaque spei Juveni
D. ANTONIO DONARELLO

JO: MARIA LANCISIUS S. P.



Ideo Te admodum sollicitum, quid ipse sentiam de causâ repentini morbi, & præcociis mortis descripti Juvenis. Dicam graves inter occupationes breviter, & aperte; Petis enim non minùs curiosa, quàm utilia. Unicè quidem tu quærere videris, quid causæ fuisse putem, cur sanus alioquin Juvenis tam citò decesserit? Scilicet an solum timorem, an etiam haustos veneficos, cum serpentis sibilo extrusos, halitus?

Porrò qui ex simplici timore pereunt, ji subitò quidem, sed citra signa propinati veneni, extingvuntur; ut tibi, per Historicorum monumenta diligenter vaganti, clarè poterit innotescere. Non ergo tuus Adolescens, qui pravis postea symptomatibus correptus fuit, ex nudo timore interfectus est. Utique exhibilans invisus serpens per nares, oculosque repentinam, maximique momenti in Ru-

Qui ex simplici timore peroliti, quomodo dignoscantur ab jis, qui ex causis venenatis celerrimè decedunt.

D

stici,

*Subitus rimer
quemodo hypo-
thymiam in-
terdum indu-
cat.*

stici, alioquin valetudinarii, cerebro exci-
tare potuit terroris ideam, ob quam il-
lico, violenterque contractis illius fibris,
propagatoque spasmō ad usque præcor-
dia, continvò perturbatus substitit flui-
dorum motus, ac proinde infelix juve-
nis animo defecit. Sed hæc in illo malo-
rum initia, atque excitamenta fuerunt.

*Vera mortis
causa qualis.*

Enimverò quis adeò in rebus physicis
hospes est, qui possit inficiari, ad veram
hujus ægritudinis, mortisque causam ac-
cessisse veneficum virus, quod non ex
serpentis modò visceribus, unà cum si-
bilo expulsum fuit, quemadmodum haud
immeritò hæsitare videris; sed maximè
ex concussâ, apertâque quercus cavernâ
repentè in libertatem venit, illumque
aerem, qui circùm Juvenem fluitabat,
implevit, atque inquinavit; quo factum
est, ut homo miserrimus unde vitæ ali-
mentum trahebat, repentè morbum hau-
ferit, ac mortem.

*Cujus generis,
Et quomodo ex-
caltetur vene-
num in caver-
nis arborum
ex morâ ser-
pentum.*

Qualis præterea extiterit speciatim
hujus mixtura veneni, & quomodo idem
in quercus cavernâ mortiferam indolem
nactum fuerit; quid censeam, tibi osten-
dam. Sanè, ubi vetusta quercus teredine

cor-

corroditur , prægrandemque suâ in medullâ concamerationem undique stipatam admittit , tunc non rarò anguiculus , foris intrò per cuniculosum fortè inventum , vel factum , subterraneum arboris corticem subrepens , cavernam ingreditur , ibique teredinum , lignearumque scoriarum pabulo nutritus , sensim adolefcit . Interim verò sulphur impurum ex ulceribus ligni , atque ex malè olente serpentis perspiratu jugiter effluit , quod necessariò cum acribus salibus ipsarum fæcum , & urinæ , quas fera illa egerit , cohobatur , intimè permiscetur , ac , eo loci diù fusque , deque agitatum , in pestiferum spiritum evehitur , qui tandem , convulso; apertoque arboris antro , (ut ex subitò referatis sepulchris , frumenti foveis , latrinis , & cloacis non rarò contingit) turbidas exilit in auras , quæ non tantùm hominum sanguini , ac spiritibus , puro sulphure , dulcique fale volatili constantibus , sunt penitus lethiferæ , sed , quod summè notandum , pulmonum porulos , per quos subtiles aeris partes intrâ venas ingrediuntur , cùm implendo , obstruunt , tum irritando , per-

*Quomodo, &
per quas vias
in sanguinem
feratur...*

stringunt, eâque ratione commercium boni aeris cum sanguine, & cum cerebro, ad vitam adeò necessarium, celeriter intercipiunt.

Hujus profectò exitialis auræ vires expertus est descriptus Rusticus, cæteroquin valetudinarius, qui statim atque venenatum aerem per nares, ac fauces excepit, sua sensit solida irritatione affecta, ac fluida lue quâdam inquinata. Unde non solùm dolor capitis, vomitus, ac sopor, sed etiam lypothymia, cæteraque symptomata suborta sunt, quæ propinati toxici indicia passim habentur. Diffuso enim veneno quaquaversum per corpus, tum corruptiva quædam fermentatio excitatur, propter quam cadavera tumescunt, ac livescunt; tum erosiones inducuntur, ex quo unguis, ac pili decidunt, & reliqua, horroris plena, symptomata apparent.

^a Lib. de venen.
^b Lib. 30. obs. pr. in schol.
^c De med. Princ. hist. l. 5. hist. 3. in paraphr.

Scio, graves inveniri Authores, quos inter ^a Guainerius, ^b Forestus, & ^c Zacutus, qui venena non solùm per nares, atque os, sed per reliquos etiam externos sensus in homines aliquando propagari posse, judicaverint. Hoc tamen indu-

dubium de oculis, atque auribus, quatenus duos peculiare sensus ; à sensu tactus omnino distinctos, constituunt, me judice, facile revocabitur, si planè intelligamus, utrumque ex jis organis texturâ adeò arctâ donatum, multiplicibusque machinulis vallatum esse, ut de medio aereo nonnisi tenuissimas lucis particulas, undulantesque tremores valeat admittere, qui nihil vitæ animalium hostile (dummodo amoris, timoris, mœrorisque causas excipias) intrò solent transferre. Latior contra, atque expeditior lethiferis corpusculis in hominum viscera patet via per os, ac per nares, quorum foramina in cerebrum, in pulmones, atque ventriculum altè penetrantia, luem aeris ad liquidi nervorum, ad salivæ, ad chyli, ad sanguinis denique commercium illico possunt transducere.

An venena per omnia sensuum organa traduci possint.

Negatur, et quare, de oculis, auribusque.

Quòd si adverteris apud Amatam Lufitanam ^a historiam Viri Anconitani, qui, cum vineam putaret, serpentem offendit, eoque interfecto, repentè conqueri cæpit de capitis dolore, mox febricitavit ; demum ; omnibus gravioribus

a Cent. pr. curat. 62.

Ex interfecto serpente mori.

a Lib. de ther.
ad Pisonē c. 5.
b Lib. 8. c. 21.
c Exercitat.
200. contra
Cardanum.
d Lib. 7. obs.
92.

bus factis, die *xxi.* obiit: cujus farinae plura prostant exempla apud *a* Gal., *b* Plin., *c* Scalig., aliosque relatos à *d* Schenchio; certè minus admiraberis nostrum casum, in quo non tantùm de serpentis corpore, quantùm de cavernâ veneficus halitus erupit, atque in Rusticum, viribus jam hebetem, terroreque perculsum, insiliit.

e Lib. 50. de
serpentibus.

*Ex balneo ca-
lesfacto cum li-
gni venenati
mori.*

Quid nunc dices, si veram credideris rariorem historiam, à *e* Gesnero descriptam, cujusdam hominis, qui è viventium numero sublatus fuit, cùm balneo dumtaxat se merfisset aquæ, calefactæ ex lignis, excisis à cavernis serpentum? Dices profectò, hujusmodi animantia genus esse ferarum foetidissimum, ac pestiferum: quo fit, ut circa illorum viciniam teter semper expiret odor.

f In appen-
dic. ad discus-
sum med. phi-
losoph.
*Serpentes, qui
morantur in
quercibus, vo-
cantur Dryini.*

Cæterùm si curiosus adhuc postules, cujusnam fuerit speciei, & quo nomine compellendus serpens ille, qui intrâ quercem, à te significatam, cavernam hospitabatur, succurrunt statim Ballonius, aliique, quos recitat *f* Sebitius, qui hujusmodi serpentes appellant *Dryinos*, & latinâ voce, propter eorum domicilium,

Quer-

Querculos, qui fanè , si credere fas est , in immensam penè magnitudinè belluæ , in quam reliqui serpentes haud solent , crescere asseruntur .

Tu interim , mi *Donarelle* , virtuti , ut facis , studere perge : nec velim dubites , me filii loco te semper habiturum , & eo quidem filiorum genere , qui , cùm suis dent gloriam Præceptoribus , plùs amantur , quàm filii carnis , qui sæpe Parentum fortunas , famamque disperdunt .
Vale .

*Datum Romæ Kal. Septembris
MDCLXXXVI.*

IX. At verò de vitiis aeris , subitas mortes inferentibus , fatiis , ut arbitror , dictum est . Nunc inceptum ordinem prosequamur .

De

De Causis subitaneorum mortuum ex parte sanguinis.

C A P U T VII.

*Sanguis
quadrupliciter
mortem inten-
sat repentinã.*

EX parte sanguinis improvifam mortem intentant quatuor præcipuæ ejufdem affectiones. Primò præceps, ac talis diminutio molis ejufdem, quæ, cordi, & cerebro fubtracta, alternum horum viscerum motum, & circuli continuationem penitus tollat. Hinc fanguis à majoribus venæ cavæ, & pulmonicæ truncis, vel à corde, fummisque arteriis, pulmonicâ fcilicet, & aortâ, affatim erumpens, verè improvifò vitam intercludit; fi enim à fanguiferis, intrâ cerebrum apertis, effluat, non adedò fubitò mortem accerfit, ut fequenti capite, vel appofito exemplo, demonftrabimus.

II. Secundò celerrima pariter, nimifque abundans ejufdem fanguinis, præfertim effervescentis, ad cor, atque ad cerebrum confluxio, & quâvis ex causâ, mora pertinax, ubi languefcenti vi circumpulfivæ horum viscerum validè re-
ni-

nitatur , & vitæ cursum , quem in motu posuimus , continvò suspendat ; ut in jis observatur , qui , subito timore , mœrore , vel gaudio perculsi , repentè concidunt ; aut qui nimiâ plethorâ saginati , vel qui post corporis excalefactionem , sive præsentè aliquâ evacuatione , frigidò potu , vel balneo utuntur . Non enim capacitas ad continendum , & vis ad pellendum sanguinem in corde , & appensis vasis sunt indefinitæ , atque immensæ ; verùm proportione respondent certæ , ac determinatæ moli , & gravitati ejusdem sanguinis , quem nonnisi citra violentam distractionem , ac resistantiam capere , atque urgere possunt . Ecce jam ,

^a Exerc. pr.
de mot. cord.
cap. 10.

inquit Cl. ^aHarvæus , duo sunt genera mortis , extinctio ob defectum , & suffocatio ob copiam . Hinc ob oculos exemplum utriusque habere licet , & dictam veritatem autopsiâ in vivorum corde confirmare : etenim comprehensâ venâ cavâ vel tenaculis , vel pollice , sanguinisque cursu versùs cor intercepto , statim videbis , cor albidiori admodum colore fieri , & languidiùs pulsare , ut emori denique videatur . Postea verò , si re-

*Pulchrum
Harvæi experimentum .*

E lin-

linquas venam ; & arterias similiter per aliquam distantiam à corde ligaveris , videbis contra , illas vehementer turgere in parte comprehensâ , & cor ultra modum distendi , purpureum colorem contrahere usque ad livorem , & tandem opprimi sanguine , sicut suffocatum iri , credas .

III. Tertiò vitam sæpe confestim adimit illud sanguinis vitium , quod ab hypochondriis , ab utero , vel aliunde , ac præsertim à ventriculo communicatum , propter summam acredinem , vel aliam externis sensibus non satis expositam qualitatem , præcordia , & cerebrum convellit , & valde efficax est ad fluida vel coagulanda , vel dissolvenda ; quibus in casibus magna interdum feri copia , ex coacto intrâ pulmonum , ac cerebri vasa sanguine , violenter extruditur , & in thoracis , vel cerebri cavitatibus colligitur ; hinc frequens erroris ansa apud minùs in arte peritos , qui , lympham in sinibus cerebri invenientes , illam apoplexiæ causam , cùm plerunque fuerit dumtaxat effectus , accusare solent .

Lympha in cavitatibus collecta , injussè pro morbi causâ plerunque ab imperitiis accusatur .

IV. Postremò pestiferum quid , ac planè veneficum in sanguine vitium ,
hau-

haustum ex aere, ex ingestis per os, aut aliunde, recondi posse, experimur, quod dato tempore, vires suas in spiritus, cordisque, ac cerebri fibras exerat, ignoto fanè, tacitoque molimine, ac veluti syderatione.

De causis subitaneorum mortium ex parte fluidi nervorum, seu spirituum animalium.

C A P U T V I I I .

QUOD denique ad tertium maximi usus fluidum, nempe ad liquidum nervorum, seu spiritus animales, attinet, jis profectò, utpote à sanguine derivatis, eadem vitia congruè aptari possunt, quæ modò ipsi sanguini attribuimus. Etenim primo loco, subtractâ, vel interceptâ contumaciter tantâ sanguinis copiâ, quanta per carotides, & cervicales arterias, earundemque plexus ad cerebri, & cerebelli cortices naturaliter fluxura est, ut liquidum nervorum separetur, statim debent & ipsi spiritus, qui ex solo sanguine se-

Multiplex spirituum defectus improvisa mortis causa.

E 2 cer-

cernuntur, deficere. Hoc sanè contingit in magnis fanguiferorum circa jugulum vulneribus, vel intrà cerebrum rupturis; in quibus postremis, si fuerit ingens copia effusi sanguinis, ejusdem procul dubio defectum mortifera cerebri, ac cerebelli compressio (unde spirituum animalium interceptio) sequatur, necesse est.

II. Et quidem adeò valet moles jam effusi intrà cranium sanguinis ad ce-
rem mortem inferendam, ut, etiamsi non ex arteriis, sed ex venis egressa fuerit, nec magnam liquido animali materiam subtrahat, adhuc tamen, propter solum infarctum, & compressionem, citò necare soleat.

III. Est hïc tamen loci, ut diligenter attendamus, illos verè subitò interire, quibus in præcordiis sanguineum vas disrumpitur; eos verò, quibus intrà calvariam hoc infortunium accidit, nonnisi post multas horas, quantum nobis huc usque observare licuit, necem subire. Et quoniam exemplis clariùs instrui-mur, quàm commentis; idcirco casum ruptæ ad cerebri basim venæ, quippe quem

*Sanguinea
vasa in præ-
cordiis disru-
pta, subitam
mortem; in ce-
rebro autem,
non ita cele-
rem inferunt.*

quem ob suas circumstantias rarum arbitramur, fideliter subnectemus.

IV. Vir Nobilissimus sexagenario major, gracilis, ac biliosi habitus, acerrimi ingenii, hypochondriacis, ac vertiginosis affectionibus ab ipsâ juventute obnoxius, ante aliquot annos prævio capitis calore, sanguineas cum metu quidem, at sine noxâ lacrymas effundebat. Deinde circa hyemale solstitium anni 1706. post gravissimas animi curas, uberrimâ narium hæmorrhagiâ tentatus fuit; cui sistendæ cum nos nihil efficax neque in chirurgiâ, neque in pharmaciâ inveniremus, inito consilio cum Excellentissimis Curantibus D. D. Dominico Gagliardi, & Jo: Thomasio, ad topica, nimirum ad pulver. ex calcant., opio usto, & fungo Melitensi, veluti ad sacram anchoram, lentè, ut decebat, confugimus. Sed, cum elapsis aliquot horis, rursus sanguis efflueret, Æger, ut fieri solet, longioris moræ impatiens, ad anceps potiùs, quàm ad tutum remedium recurrendum esse, sibi svasit, novumque proinde, nobisque planè ignotum, pulverem, cum se priùs fortiter emunxisset, naribus hausit; atque

Historia apoplexia, convulsivorum motu, tandemq; apoplexia, & morbi ex disruptâ venâ ad cerebri basim.

que confestim, excitato sensu urentis irritationis, substitit hæmorrhagia, quam illico exceptit summa capitis confusio, oculorumque pruritus, itaut Nob. Vir mortem sibi jamjam instare, timeret. Qui tamen, despumato jam majori ex parte sanguine, ac depuratis deinceps hypochondriis, utcumque bene se habuit usque ad Kalendas Aprilis 1707. quo tempore prius capitis gravitate, & calore, deinde horâ quintâ noctis sextæ ejusdem mensis repentinâ correptus fuit aphonîâ, in quâ initiò mentis officia minimè sublata ei fuisse, probabiliter indè judicatum est, quòd ipse, vel sentiens irritationem, vel sperans venturam hæmorrhagiam, validè, atque identidem, conversis ad adstantes oculis, nares emungeret. Sed quoniam vena, quæ foris jam sanguine utiliter manaverat, propter escharoticum errhinum forsitan obcalluit, pessimo fato interiùs rupta est. Idcirco, incassum tentatis omnibus revellentibus, ac phlebotomiis non modò ex venis brachii, sed etiam jugulì, post jactatos huc illuc artus, forti prosternitur apoplexiâ, quæ spatio

tio quinque circiter horarum illum perdidit.

V. In cadavere dura mater solito crassior, & undequaque cranio fortissimè adhærens inventa est : sanguinea piæ matris vasa usque adeo turgida, & varicosa, præsertim ad anteriorem cerebri partem, ut coralliorum ramis viderentur similia.

Quæ in cadavere observata fuerunt.

VI. In utroque anteriorum ventriculorum quantitas coacti sanguinis non minor semilibrâ continebatur ; quinimo non parva cruoris moles, eaque fluidior, diffusa occurrit per reliquas cerebri cavitates usque ad spinalis medullæ principium, ac sub eo præsertim duræ matris segmento, quod cerebrum dividit à cerebello. Neque sibi defuit celebris dissector D. Cecchinus, sedulò inquirens in foramen disrupti sanguiferi, quod ostendit fuisse propaginem venæ jugularis internæ, quæ sanguinem regerit à partibus finitimis ossis sphænoidis, quæque ramusculum, superato cranio, ad radicem nasi, unde jam sanguis effluebat, dimittere solet.

Quale fuit sanguiferum vas intra cranium disruptum.

VII. Reliqua cum naturalia, tum vitalia viscera nullo sensibili vitio, præter ali-

aliquam contentorum fluidorum culpam, laborasse deprehensa sunt; ut non sit dubitandum, quin ad subitum morbum, citamque mortem accersendam, defectio unius fluidi, vel solidi majoris usus, atque in nostro potissimum casu, interceptio spirituum animalium ab effusione ipsius sanguinis intrà cranium, abundè sufficiat.

VIII. Sed quanquam hujus interitus causa sit apertissima; nonnulla tamen ab ipso extispicio deducemus corollaria, quæ tum discantibus, tum scientibus utilia fore, speramus.

Præcepti aphonia plerumque oritur ab interceptione venarum ad cerebri basim.

IX. Primò sanè docemur, subitam aphoniam vix aliunde oriri, quàm ab interceptione venarum ad cerebri basim, unde nervi, in linguam protensi, ad perpendiculum premuntur. Et si quidem interceptio ista magna fuerit, cumque magno, & pravo corporis apparatu, nec brevi solvitur, nec finit sanguinem regredi ab anteriori præsertim cerebri parte, atque à plexibus, qui intrà ventriculos locantur: quo certè fit, ut vasa illa non solùm tumeant, sensimque capiplenium, & apoplecticum affectum, gra-

Quomodo, & quando si non solvatur, oritur apoplexia, & venarum disruptio.

gravando, urgendoque, producant, sed, quod magis est, si contineant sanguinem erodentibus salibus refertum, perrumpantur, eodem planè modo, quo externæ contingunt hæmorrhagiæ, & quemadmodum contigit in exposito casu.

X. Secundò erudimur, quòd quemadmodum sanguis, si supra alterum cerebri hemisphærium effundatur, unum dumtaxat corticem comprimendo, ac simul obstruendo, inducit tandem apoplexiam, & eam quidem cum illius lateris paralyfi, quod affecto hemisphærio respondet; ita idem sanguis si effluat ex vase, ad cerebri basim posito, ut plurimum gignit aphoniam, jactationes, denique apoplexiam citra præviam paralyfim, dummodo alia non concurrant, quæ paralyfim inducunt. Etenim egrediens è perrupto vase sanguis, ob conceptum jam impetum propter motum circularem, eò influit, quò patet aditus per omnes ventriculorum cavitates usque ad principium spinalis medullæ, cujus tam dextrum, quàm sinistram intrà calvariam locatum caudicem calore primùm, & mole, mox etiam acredine,

Sanguis effusus supra alterum cerebri hemisphærium, apoplexiam cum paralyfi, in basif verò, potius aphoniam, et convulsionem, tandemque apoplexiam inducit.

F

quæ

quæ rarò abest , quaquaversum æqualiter incendit , premit , atque irritat ; unde injussi quidam artuum motus , seu jactationes absque paralyfi nascuntur ; deinde verò , extra suas ripas uberiùs diffluente cruore , longè major pressio vis undequaque adjungitur , quæ animalium spirituum cursum tam à cortice versùs medullam , quàm à medulla versùs externas partes intercipit ; atque hinc apoplexia , & mors ipsa succedit , quas profectò fatales calamitates nostro Ægroto celerrimè contigisse , conspeximus .

XI. Postremò unum elicimus corollarium , ad praxim , ni fallor , utilissimum . Scilicet naribus ferè nunquam escharotica pro sistendâ spontè ortâ hæmorrhagiâ , ne quidem apud fenes , admovenda esse . Etenim rarissimè ex hujusmodi sanguinis fluxibus ægros decessisse , contra verò sæpe ex violentâ illorum suppressione celerem morbum , citamque etiam mortem inferri , comperimus . Sanguis enim , cùm induratum , ac renitens vas exteriùs invenit , minimo negotio , eâdem recurrente exitus necessitate , alicubi internum canalem dif-

rum-

Escharotica nunquã spontaneis in hæmorrhagiis adhibenda .

Transfer huc que narratur de copiosissimâ aquâ , ac utilissimâ hæmorrhagiâ in fene lib. seq. c. 5. num. 8.

rumpit . Erit igitur curantis officium causam pro virili parte corrigere , motumque sanguinis aliò avertere . At nunquam de claudendo violenter dehiscētis venæ ore cogitare debbit , nisi cūm ægroti vires verè langueant ; nec illas ex ipsius ægri querelis , aut vanis Conjunctorum terroribus metiri debbit , sed ex pulsu , qui spontaneis in hæmorrhagiis cūm plerunque durus , magnusque esse soleat , nos de spe minimè depellit ; à qua tunc deturbandi erimus , cūm exilis evadit , extremaque frigent .

XII. Neque id sanè reticeam , quod facile post longam praxim quisque per se didicit ; nempe in hujusmodi magnis spontaneis hæmorrhagiis videri sanguinem propter inductam fermentationem , suâ mole , ut ita dicam , fieri majorem , darique quandam veluti aeris particularum immissionem , vel conversionem in sanguinem . Usqueadeo superstes intrà vasa cruoris moles sufficit tum continvandæ ingenti evacuationi , tum implendis , elevandisque arteriis , quæ adhuc magnæ , duræque post ejectiones multas rubri liquidi mensuras mirabiliter

In spontaneis hæmorrhagiis mirabilis est novi sanguinis reproductio .

F 2.

per-

persistunt . Exinde fit , ut immatura
 suppressio plerunque pariat convulsio-
 nem, quam sola per artem instituta sol-
 vit sanguinis missio, ut ostendemus cap.
 XXIII. num. XIV. hujus libri.

XIII. Sed, ut ad id, unde digressa est,
 nostra revertatur oratio, possunt pariter
 animales spiritus deficere, cum eorum
 excursus per nervos ad præcordia, alia-
 que maximi. usus partes, penitus inter-
 cluditur vi convulsionis, compressionis,
 vel obstructionis, è solo corporis vitio,
 aut simul animi motibus pendentium .

a De collu-
 vie ferros. pag.
 166.

Atque hinc Carol.^a Pifo plures collegit
 observationes funestissimarum, ac subi-
 tanearum syncopum, quas ex cordis
 apoplexiâ, seu ex obstructo per lym-
 pham nervo, qui ad cor descendit, natas
 arbitratur.

XIV. Possunt quoque deesse spiritus
 ob inediam, ob motuum violentiam, ob
 nimias evacuationes, ob intemperantem
 veneris usum, præsertim in senibus, quos
 satis jam ætas spiritibus destituerat. Quod
 genus exempla invenientur abunde apud
 Authores, quibus hic repetendis frustra
 non immoramur.

XV.

XV. Secundò nimia etiam eorundem copia, quæ semper sanguinis ubertatem comitatur, nimiam pressurâ, & inflatione glandularum corticalium cerebri, nervorum vias ita potest aliquando comprimere, ut fluxuro animali liquido omne spatium adimatur, fiatque propterea, ut vel in cerebro spiritus non separentur, vel à cerebro (infirmatis villis extrudentibus, & auctâ resistantiâ extrudendi liquidi) in præcordia non dimittantur; quod interdum contingit in ebriosis, aliisque, qui cibis, & potibus, plurimo sale, ac sulphure narcotico refertis, sese ingurgitant.

Spirituum nimia copia subitanæ mortis causa.

XVI. Tertiò summa spirituum acrimonia ex eodem sanguinis vitio, atque ex lentis animi pathematibus, studiisque intensioribus inducta, convellendo pertinaciter præcordia, & cerebrum, homines, alioquin valetudinarios, ad idem repentinæ mortis genus potest adducere; ut olim in Amplissimo Card. vidimus, & passim in exitialibus epilepsis, quæ dicto citius in fortes desinunt apoplexias, de quibus agit etiam Hippocrates.

Ipsorum acrimonia æquid noxia.

Epilepsis transitus in apoplexiam ex Hipp.

a Lib. de gland. n. 9.

XVII.

*Qua ratione
hujusmodi
transitus fiat.*

XVII. Sed quoniam ætiologiam epilepsiarum, quæ in apoplexias, mortemque definunt improvifam, hîc scitu sum-mopere necessariam putamus ; idcirco attentè considerandum , convulsionem membranarum, ac sinuum, nec non fibrillarum cerebri, in qua penè tota ratio idiopathicæ epilepsiæ posita est , multifariam, sed duplici potissimùm modo, contingere ; altero scilicet, cùm acre, ac ferè arsenicale , vel aliud quodvis liquidum, convellendis nervis idoneum, non omnia simul cerebri segmenta , sed eadem successivo quodam , atque inæquali ordine, ac tempore irritat, & crispat ; unde nonnisi inæquales, inordinati , atque inæqualiter contingentes convulsivi artuum, ac thoracis motus, per totum ferè paroxysmum, respondent, ac observantur : Quod sanè quotidianum, ac vulgare hujus morbi exemplum se prodit . Altero verò modo , cùm eodem penè tempore, æqualibusque viribus irritans causa, quaquaversum per cerebrum diffusa, æqualiter , eodemque tempore anteriores cum posterioribus partibus, dextras cum sinistris , immo fortè etiam ipsum

sum cerebellum, adeò vehementer convellit, ut indè animale liquidum simul, & æqualiter in omnes contranitentes musculos validè expressum, post brevissimas artuum contorsiones, universum corpus tensum, rigidum, atque immobile reddat. Hæc autem posterior epilepsiæ differentia, ea præsertim existit, quæ si sæpe recurrat, ac plùs justo perseveret, frequenter in apoplexiam transiens, subitum vitæ discrimen solet afferre: quia scilicet, non solùm vasa cerebri, si à lentâ priùs ægritudine fuerint debilitata, & in varices dilatata, ex illo forti, & universali nixu convulsioni, ac strangulationis, sanguinem prementis, atque intercipientis, & renixu ejusdem contenti sanguinis, mole, & acie suâ extrorsum urgentis, sæpe dissiliunt, sed, vel maximè, quia idem sanguis, propter inæqualem suarum partium indolem, uno in loco volatilis-oleosi spiritus expers, viscidulus ex morâ concrevit; alio autem fluxilior, & acrior, suos extra limites, per glandularum orificia, nervorumque tubulos exprimitur: propterea, quanquam ipsa denique convulsio deficiat,

ciat, attamen, perturbatâ jam spirituum materie, & in alienam naturam conversâ, jisdemque cerebri, nervorumque viis, quâ dilatatis, ac discissis, quâ compressis, & obstructis; fortissima inducitur apoplexia, quæ plerunque subitam mortem accersit.

XVIII. Tandem ignotum illud virus, quod in aere, ac sanguine superiùs notavimus, potest in ipsos animales spiritus derivari, eundemque lethalem, ac repentinum effectum producere; ut in peste, & venenis infusis, vel ingentis frequenter offendimus.

De causis subitanæ mortis ex parte solidorum majoris usus, & primò ex parte instrumentorum respirationi famulantium.

C A P U T IX.

Fluidorum vitiis jam explicatis, ad ea solidorum mala progredimur, quæ sunt mortalis hujus exitus principia; illud iterum, iterumque monentes, quòd utriusque ordi-

dinis causæ mutuam sibi opem, ad subitum inferendum interitum, necessariò præbent; ut proinde non invenias vitium solidorum, repentè aptum occidere, quod motui saltèm liquidorum non officiat; & vicissim fluidorum vitium lethale absque solidorum læsione.

*Solida, & li-
quida mutuo
concursum mor-
tem inferunt
improvissam.*

II. Sed ad mortiferas causas, ex ipsiis solidis ortas, propiùs accessuris illud etiam accuratè advertendum, solida majoris usus duabus conditionibus naturaliter instructa esse oportere, ut ad vitæ conservationem conspirent; nimirum ut sint integra, seu organicâ naturali structurâ donentur; deinde, ut in alterno constrictionis, ac distensionis motu perpetuò versentur. Quidquid propterea structuram, vel motum prædictarum partium maximè, occurrissimè, & pertinaciter lædet, mortem quoque celerrimam, quam subitam dicunt, poterit inferre.

*Ex parte soli-
dorum majoris
usus quomodo
subita mors.*

III. Sequentes itaque præfatam initio solidorum distinctionem, asserimus primò, ex parte instrumentorum, respirationi interservientium, animalia repentè posse interire, si aspera arteria, ejusque bronchia obstructa, convulsa, vel com-

*Varia tra-
cheæ, & bron-
chiorum mala
repentè inter-
ficiunt.*

G

pref-

pressa, citissimè, ac penitus iter aeri per pulmones intercludant, ut in laqueo suspensis passim animadvertitur, vel in jis, quibus solidum corpus, inter deglutendum, laryngis foramen occludat, vel ruptâ vomicâ, vel aqua in demersis, per bronchia loco aeris diffusa, non revomantur; vel sanguis, aut serum in repentino pectoris hydrope pulmones, quominus ab aere impleri possint, subito impediat. Tanta enim est hominibus spiritus necessitas; ut ad rem scripsit ^a Hippocrates; *ut si quidem omnibus aliis abstineat homo, neque cibum sumat, neque potum, possit tamen plures dies ducere; Si cui verò spiritus in corpus intercipiatur, vel exigua diei parte pereundum sit.*

^a Lib. de flat. n. 6.

IV. Deinde, si omnia simul inspirationis, atque expirationis instrumenta suis ab officiis citò, ac pertinaciter vacaverint, ob eundem impeditum aeri alternum intrâ pulmones ingressum, atque egressum, illico extremi fati dies est in procinctu; ob quam sanè rationem fervus ille barbarus apud ^b Galenum, coacto spontè spiritu, citam sibi mortem conscivisse, fertur: cujus profectò volunta-

Spiritus spontè cohibitus mortis causa apud Galenum.

^b 2. de mot. muscul. cap. 6.

tarii , si verus est , effectûs , multæ etiam morbosæ , ex necessitate operantes , numerantur causæ , quæ scilicet aptæ sunt diaphragmatis , sterni , costarumque structuram , continuitatem , vel motum ita firmiter lædere , ut alternè supra pulmones concidere , vel à pulmonibus recedere nequeant . Ita magna e. g. vulnera , quæ utrumque thoracis latus , septumque simul transversum confodiunt , si aperta detinerentur , celerissimam mortem possent accersere . Aer enim , per dehiscencia vulnera ingrediens , & forinsecus pulmones premens , æquilibraretur cum aere , qui per tracheam intrâ pulmones labitur , ipsosque pulmones , veluti quandam immobilem stateram , cum totius circulantis sanguinis morâ , vitæque pernicie , suspenderet , ac libraret . Et sic de quacunque aliâ consimili prædictorum læsione organorum , respirationi famulantium , paralytisi nempe , aut convulsione (dummodo subita , magna , ac pertinax fuerit) erit sentiendum .

Hujus effectus causa exponuntur .

Quanam thoracis vulnera , externum cum interno pulmonum aërem æquilibrando , læsalia .

De causis improvifarum mortium ex parte cordis, & magnorum vasorum.

C A P U T X.

Proximè dicendum venit de cordis, magnorumque sanguiferorum vitiis, homines celerrimè interimentibus; & quanquam omnia, quotquot dari possunt, ad id unicè colliment, ut cordis motum penitus tollant, & lethiferam syncopem inducant; nihilominus tamen, cum ad vitæ necessitatem, ex parte cordis, tria considerari debeant; primò congrua structura tam cordis, quàm magnorum vasorum; secundò viarum libertas; tertio vis movens, quam facultatem pulsivam dicunt; certè ex unoquoque fonte maximi oriri possunt morbi, qui confestim perimant.

Tria, ex parte cordis, & vasorum ad vitæ necessaria.

II. Primò, quod attinet ad structuram, cum ad eam constituendam integritas, & continuitas fibrarum, villorum, & membranarum potissimùm exigatur; quotiescunque aut inflicto vulnere, aut lentâ exesione in aneurysmatibus, eò tan-

tandem pervenitur , ut continitas parietum cordis , & magnorum fanguiferorum auferatur , illico , proficiente uberimè sanguine , mors urget ; ut historiâ V. eorum , qui hâc temporum constitutione repentè interierunt , publico patuit in theatro.

III. Cùm verò ad structuræ vitium referri quoque possit solito major cordis moles , naturâ primùm contexta , deinde per morbos adauçta ; hæc sanè frequenter subitæ morti præbet occasionem . Sanguis enim , si progressu temporis acer , minùsque fluxilis evadat , sensim , propter suam in præcordiis moram , magnitudini cordis novum pondus adjungit , quod tandem cor ipsum versùs diaphragma detrudit , & usque adeò renititur ei potentiæ , ex qua cor tenditur , & sanguis quaquaversum in arterias pel- litur (verbo , unde animal vivit) ut non solùm cum eâdem potentiâ ad æqualitatem perveniat , sed illam plerunque repentè , atque inopinatò vincat . Quod porrò genus interitus sæpe à nobis visum est ; cujus proinde clarum exemplum (præter ea , quæ reiicimus in libros , quos

nunc

*Aucta magnitudo cordis
reptina mortis occasio.*

nunc de Corde, atque Aneurysmatibus adornamus) dabitur sequenti libro hist. II illorum, qui subitò è vivorum numero exturbati fuerunt.

*Cordis raso-
rumque con-
vulsio, com-
pressio, & ob-
structio, mor-
tis cause.*

IV. Quod verò spectat ad viarum libertatem ; quæcunque causa venam cavam, vel pulmonicam, & aortam, aut arterias carotides eousque constantissimè, atque integrè potest convellere, comprimere, vel obstruere, ut sanguis ad auriculas, & ventriculos pervenire, aut ab auriculis, & ventriculis in majores arteriarum ramos, atque in cerebrum fluere prohibeatur, subitum minitari potest interitum ; ut de magnis sanguiferorum polypis, ac de tumoribus, vel ossibus, majora vasa comprimentibus, vel obstruentibus, memorant Observatores.

*Vis movens
cor, à fluidorum
defectu, & vi-
tio lethaliter
labefactatur.*

V. Denique, quia vis movens cor, non solùm pendet à congruâ fibrarum structurâ, sed etiam à fluidis nerveo, & sanguineo, idcirco labefactari potest, ut hominem celerrimè interficiat, si utrumque liquidorum contumaciter deficiat (unde syncope ex cordis, & arteriarum paralyfi) aut quodvis aliud lethale vitium

tium contrahat : quod sanè accidit non in peste solùm, sed ubi os ventriculi, vel ipsum etiam cor à vermibus mordetur, ut proinde ^a Trallianus, ^b Mesue, & ^c Schenchius referant, aliquos ex hujusmodi causis repente decessisse. Vermes enim cujusdam speciei proboscidem veneno armant, ut, non erodendo dumtaxat, sed veneficum fortè liquidum sanguini, ac fluido animali penitus hostile, vulneribus inspergendo, interimere soleant. Quod sanè adeò ex antedictis per se clarum est, ut summatim indicasse satis fore, duxerimus.

VI. Hoc verò solummodo memorandum hïc arbitramur : cordis, magnorumque vasorum motum dividi in systolem, ac diastolem; & licèt alter dumtaxat ex jis motibus sit agens, uterque tamen ad vitam est necessarius: idcirco fieri potest, ut æger repente moriatur, tum si cor alternè constringi non possit (quod vel enervatâ penitus structurâ, vel prædictorum maximo vitio liquidorum, solet contingere) tum si alternè dilatari nequeat, quod vel pertinaci ejusdem spasmo, vel ex causis illud validissimè com-

Oris ventriculi, & cordis morsus à vermibus.

*a Lib. 7. c. 11.
b De ægrit. cord. cap. 1.
c Lib. 2. obs. 194.*

Cur letalis.

Systole, & diastole cordis &c. utraque ad vitam necessaria.

Ex inflicto sub
xiphoide pu-
gno, ob mira-
bilem partium
cohesionem su-
bita mors.

^a Lib. 7. cont.
cap. 1.

^b Lib. 3. sect.
2. n. 17.

Vide latius
tractatam de
cordis dolore
materiem c.
xix. n. 2.

comprimantibus, tumore nempe ejusdemmet cordis, pericardii, aut adjacentium partium, facillè oriretur. Sic olim vidimus, inflicto vehementer pugno sub cartilagine mucronatâ, vitæ nodum ex tempore solutum; nimirum quòd eò loci unâ conveniunt, validèque per nerveam, ac tendineam cohesionem junguntur sinistrum ventriculi orificium, diaphragmatis centrum, arteria magna, vena cava, & pericardium; excitatâ idcirco repentè, ob fortem percussione vim, prædictarum simul omnium partium convulsione, subitò pariter, apud imbecillem alioqui hominem, cum respiratio, tum sanguinis motus lethaliter potuit subsistere. Sic^a Rasis affirmat, repentinas mortes ex cordis apostematibus evenire. Quamobrem *Et cordis dolor*, ut in coacis scripsit^b Hippocrates, *seniori sapiùs consvescens, repentinam mortem significat*. Præcordiorum enim convulsio, si pertinax fuerit, atque per id temporis sanguis, qui intercurrere deberet, necessariam fluxilitatem, & crasim amitteret (ut de cerebri convulsionibus diximus) etiamsi postea spasmus ille cessaret, non ideo

ideo tamen cruor sublatæ resistantiæ obsecundaret, cursumque suum repeteret; idcirco subitam necem facillimè induceret. Interim verò indicatas alibi causas omnino veneficas, ex ventriculo, vel alio quovis viscere derivatas, consultò tacemus.

VII. Sed, cùm studium detegendæ veritatis nihil nos vel præterire, vel dissimulare patiatur, advertendum, istiusmodi veneficos succos, motum cordis subito enervantes, intrà nostra corpora cumulari, non vitio dumtaxat fermentorum, animi pathematum, aliarumque etiam causarum, à cibis, potibus, atque aere deductarum; sed interdum (ut reticeam quæ palam venena dicuntur) culpâ *arcanorum*, ut jactant, remediorum, per quæ ignavum vulgus magnos morbos profligatum iri confidit. Quanquam enim in unaquaque Civitate, justissimis constitutâ legibus, pseudo-chymici, & agyrtæ, ne medicinam faciant, semper vetentur, & tamen semper retineantur; sanè accidit non rarò, ut aliquis, sive lue venereâ, sive hypochondriorum ægitudine vexatus, postquam rectam meden-

H

di

Mers ex Agyrtarum arcanis.

di viam, ob mali contumaciam, vel suos ob errores, prorsus inutilem expertus est, jis tandem agyrtis, celerem salutem perfrictâ fronte pollicentibus, facile credat. At, cùm miser homo, antimonialè, mercuriale, aliudve hujus farinæ medicamentum acceperit, proprio (utinam pœnitentiâ delendo) discit experimento, se non ad salutem, sed ad necem pseudo-medicis usum fuisse. Et enim hujusmodi remedia, si malè parata fuerint, veneni naturam induunt; si verò extra dosim, aut sinè methodo valetudinariis corporibus propinentur, variâ subindè cum pravis hypochondriorum succis-initâ miscellâ, & fœdere, in toxicum convertuntur, & hominem repentiè plerunque perimunt. Quod sanè ubique locorum, sed in Romanâ maxime Civitate, usu venire, dolendum, in quâ multos proindè vidimus, sumptis, per aliquot dies, hujusmodi *arcanis*, tandem stomachi, ac præcordiorum doloribus correptos, citissimè sublatos fuisse. Unde ^a Brunonianis vocibus exclamare compellimur. *O deplorandam Magistratuum lenitatem, quâ impunè de corio*
bu-

^a In lex. Med. verb. agyrt.

humano ludere concessum, quâ datur ita temerè scire in humana viscera! O inexcusabilem dissimulationem!

De causis improvisarum mortiam ex parte cerebri, & nervorum.

C A P U T X I

QUanquam ex antedictis de vitio sanguinis, & liquidi nervorum, abunde colligi possit, quales causæ ex parte cerebri, & nervorum, ad subitum producendum interitum, concurrant; ne tamen hæc nostra elucubratio alicubi manca videatur, præcipuo capite perstringimus eas causas, quæ cerebri, tanquam solidæ partis, culpâ, homines citissimè de medio tollere possunt.

II. Cùm verò, ut superiùs de corde monuimus, tria quoque in cerebro, suisque membranis, ac nervis, ad vitam summopere necessària, considerari debeant; scilicet primò congrua structura; secundò viarum libertas; tertio motus

Tria in cerebro, meningibus, & nervis ad vitam necessaria; & qualia.

alternus membranarum, & corticis ejusdem; sanè ex maximâ; constantique prædictorum læsione, citissima mors, sub specie fortis apoplexiæ, potest accidere; mutuò scilicet inter se conspirantibus prædictis vitiis; ita ut maxima structuræ læsio alternum motum, vasorumque libertatem tollat; quemadmodum cessatio motus supponit, vel infert impedimentum viarum; denique maximum viarum impedimentum statim naturalem cerebro motum aufert, & aliquale structuræ vitium inducit.

III. Primò itaque, si capitis, ac cerebri structuram spectemus, quotiescunque eadem ob magnum, profundumque vulnus, vel contritionem ita vitietur, ut indè tollatur membranarum motus, viarum, & fluidorum continitas, ad spirituum præsertim animalium, usque in præcordia, descensum, illico animal corruit, ac moritur.

Spiritus de-
scensus ad præ-
cordia inhibi-
tus rep. mortis
causa.

IV. Præterea non rarò contingit, ut aliquis ebrietate, aut vertigine à summo ruat, caputque ad durum corpus allidat; unde, rupto intrà cranium vase, citò decedat. Mors verò ista frequenter
ab

ab imperitis internæ dumtaxat causæ, Repentina
mori quando-
que salò ad-
scribitur in-
terna cause,
cùm pendeat
ab externâ.
turpiter adscribi solet, cùm fuerit exter-
na: Quo fit, ut hac in re cautos velim
tam ipsos Medicos, qui propriam ali-
quando sententiam pro usu forensi in-
terponere debent, quàm Judices, puni-
turos eos, qui, etiamsi levi impulsu de-
jecerint ebrium, vel quemcumque alium,
si hic statim de vitâ abjerit, illatæ mor-
tis fiunt rei.

V. Facile verò, dissecto cadavere, co-
gnoscitur, num quis ex ipso casu, Ex dissecto
cadavere di-
stinguitur. vel ex
internâ causâ diem suum objerit. Et-
enim, si ruptura ossis, atque interni sub
illo vasis invenitur, non est dubium,
quin ictus, vel contusio præcocis mortis
causa sit accusanda. Exemplum dabit
sequens historia.

VI. Auriga Eminentiss. Card. Palla-
vicini ann. 35. propter luem celticam, Exemplum.
vinum, quod appellant, medicatum lon-
go jam tempore sumebat. Cùm die 26.
Decembr. 1707. suum Herum in atrio
prope Sacellum Pontificium expectaret,
fortè tum ut se debilem reficeret, tum
ut prorogandi tempus prandii hilariter
falleret, duos generosi vini cyathos cum
frag-

fragmento panis ingurgitavit. Post hæc, fluxo jam meridie, repentè de sellâ immoti currus dextrorsum cecidit. Rumor, cui timor initium dedit, credulitas incrementum, statim per Ædes Vaticanas dispergitur, hominem subitâ morte sublatum. Accurritur, & cùm inventus fuerit aphonus, sed adhuc respirans, ad proximum S. Spiritus Xenodochium illico transducitur, ubi multa adhibita remedia prohibere non potuerunt, quin totis stertens præcordiis citissimè animam egerit.

VII. Congruo transacto tempore, Præclariss. D. D. de Paulis, unus ex primariis ejusdem Xenodochii Medicus, cui miseri hominis cura contigit, jussit, illius cadaver aperiri, quod vel ipse ego admodum flagitavi, ut falsæ opinioni, quæ Urbem impleverat, hunc ex internâ dumtaxat causâ fuisse denatum, occurrerem. Visum itaque est cranium contusum in dextero temporum cum rimâ duarum circiter unciarum; deinde apparuit intrâ cranium, & ponè duram matrem eo loci sanguis effusus, & quaquaversum diffusus, totusque in continen-

*Cadaveris
dissectio.*

nentem grumum coactus pondere non minùs unciarum octo . Cæterùm dextrarum cerebri hemisphærium citra sensibilem defectum , sinistrum verò cum vasorum plenitudine , sectumque , subobscuro refertum colore , deprehensum est . Ventriculi pauco sero scatebant .

VIII. Hæc porrò , quæ per cerebri dissectionem innotuerunt, probabili dant *Etiologia.* locum conjecturæ , causam ruinæ adeò præcipitis dextrorsum , in homine isto , subitam extitisse cruoris moram in sinistro cerebri hemisphærio , ubi vasa turgida inventa sunt . Debilitatâ enim dexterâ corporis medietate , in quam communi , firmiorique Anatomicorum opinione distribui creduntur nervi , qui à sinistro cortice profiscuntur , minimo negocio deficere eo in latere æquilibras trunci , & versùs illud casus totius corporis contingere potuit . Sed tunc mortem verosimiliter miserrimus auriga vitasset , nisi magnam illam interni vasis rupturam passus fuisset . Atque hinc discamus , quàm facilè repentinorum morborum causæ manus invicem conferunt , ut ocysimè occidant .

IX.

Magna capitis lasso, & parva interalli conne lethifera.

a Exerc. 8 de Tabac.

Quomodo ex sternutatione, mors subita.

b Lib. 3. prælect. 4. cui tit. cur sternuentes saluentur.

Ex Famiano Strada exemplum.

IX. Neque solùm ex magnâ cranii, cerebrique dedolatione, aut contritione, quæ contentis partibus motum, & vasis continuitatem auferat, homines brevè moriuntur; sed interdum ex levibus quantumvis creditis capitis contusionibus, & concussionibus, ob occultam vasorum rupturam, cùm ægri maximè convaluisse videntur, tunc subitò pereunt, rigore correpti. Ichor enim, aut sanies intrâ membranarum, aut cerebri cuniculos colligi solet, acerrimamque, & planè veneficam, ex morâ indolem nancisci, ob quam universa cerebri, ac nervorum œconomia subvertitur; nimirum, crispatis, aut syderatis nervis, & ruptis quandoque sanguiferis, vitale illud commercium cerebri cum corde, & cordis cum cerebro è vestigio intercipitur. Ita *a* Magnenus narrat, nonnullos sternutantes, agitato violenter capite, disruptisque eo impetu meningum vasis, subitò interiisse. Quod sanè à *b* Famiano Strada exemplo Pistoris Suburrani confirmatur, qui, cùm ter, ac vicies sternuisset, vigesimo quarto sternutamento animam efflavit. Quâ de causâ, nem-

nempe ob vitæ periculum, evenisse putat ^a Sigonius, (quanquam à Famiano redargutus) ut, consveto jam diù more, salutem sternuentibus à Deo precemur; scilicet quòd multi tempore D. Gregorii Magni, cùm sternutarent, repentè spiritum emittebant. Repete, si cupis, quæ à nobis scripta sunt cap. VIII.

^a Lib. 1. de regn Ital. Mos precandi salutem sternuentibus un- de.

X. Ab internis quoque causis lentæ in cerebro congestiones fieri solent, quæ postquam diù ægros, nunc hemicraniâ, & sopore, nunc mœrore, vertigine, & epilepsiâ, juxta varium pressio- nis momentum, variamve interceptorum suc- corum indolem, divexarunt; denique, fortissimâ inductâ apoplexiâ, repentè jugulant.

Lenta in cere- bro congestio- nes tandem ven- pensè jugulât.

XI. Novimus Equitem Commenda- tarium ex Familiâ de Puteo, qui floridio- ribus annis hemicraniæ, atque hæmor- rhoidibus obnoxius, post quinquagesi- mum ætatis suæ annum incertis animi motibus, mœrore præfertim, exagitari cœpit, & paulatim ferè ad triennium suppressis identidem mariscis, jugi gra- vativo circa tempus sinistrum dolore in- fixo, varias vices ex medentium auxiliis

Historiâ mi- rabili confir- matur.

expertus fuit . Verùm , cùm ex Laurentanâ Domo rediret (præcedente graviore sincipitis dolore, ad sinistrum oculum protenso , unâ cum animi luctu) Fulginei repentè in levem apoplexiam incidit , facie subpallidâ , tumentibus palpebris , respiratione liberâ , nisi illam sicca tussis frequenter interturbasset , quibus febricula per aliquot dies accessit ; à quo sanè paroxysmo , propter opportunam opem eidem præstitam à Clarissimo Physico Nuccarino , antiquæ probitatis Viro , eoque nomine mihi conjunctissimo , vindicatus fuit . Romam deinde repetens , occurrit nobis cum siccâ tussi , meticulosior , taciturnus , obliviosus ; quinimo decursu autumnii , & hyemis 1694. recurrentibus semel , vel bis in unoquoque mensè apoplecticis insultibus , infelicem planè vitam duxit . Tandem die 26. Januarii 1695. cùm sibi meliùs habere videretur , fortissimâ correptus syderatione , subito interiit . In cujus cadavere præcipuum fuit observare in posteriori hepatis parte , quâ diaphragmati adnectitur , tumorem folliculatum , æruginosâ veluti argillâ plenum . Unde septum

ptum transversum eo loci subrufam coloris labem contraxerat ; atque indè siccam tussim , quâ æger tenebatur , profectam existimavimus . In cerebro autem omnia piæ matris sanguifera ; ac lymphatica vasa penè in varices abjerant . In ventriculis copiosa ferositas continebatur . Sed malorum summa latebat sub dexterâ parte ossis frontis ; ubi dura , & pia mater in multam crassitiem evaserant , & finitimus cerebri cortex concreverat in crudum abscessum substantiæ ferè polypeæ , & magnitudinis æqualis illi pomo , quod apium redolens appellatur . Interim profundior cerebri cortex , ejusque medullæ pars , quæ tumori substernebatur , adeò diffluebat , ut puris crasim æmularetur .

Tussis sicca ex diaphragmatis labe ab hepate contractâ .

Lymphatica piæ matris vasificosa .

Ingens abscessus polypeus meningum , & corticis cerebri .

XII. Hoc sanè extispicium non tantùm admirationem excitat , propter ipsam tumoris in cerebro collecti conditionem , quantum propter situm ; ut , cùm æger de gravativo sincipitis , & oculi sinistri dolore perpetuò quereretur , morbi causa in dextero meningum , cerebrique latere inventa fuerit . De cujus phænomeni ratione plura differemus in

Doloris sincipitis , & oculi sinistri in oppositâ parte delitescentis causa .

scholio dissectionis cadaveris Illustrissimi Præfulis Spadæ.

XIII. Novimus item Eminentissimum Sacchettum nostræ, ac Doctissimi juxta, atque Humanissimi Joh: Trulli curæ traditum, simili congestione laborasse, cujus brevem tum historiæ, tum extispicii descriptionem, à nobis exhibitam Diligentiss. ^a Pacchiono (Juveni virtutis, & ingenii meritis mihi jucundissimo) huc congruè transferemus. Vir igitur Eminentissimus sexagenario major, à suppressâ podagrâ melancholicus, immemor, atque epilepticus evaserat; sedulâ tamen curandi methodo, præsertim vini abstinentiâ, hinc sex supra annos vixerat. Tandem repentè sublato, in ejus dexterâ corticali cerebri parte versus occiput, insignis hydatis, ovi columbini molem adæquans, inventa est, laxa, & lacera, quæ construi videbatur ex ipsâmet piâ meninge, suis potissimum dilatatis, scissisque lymphaticis, interceptoque liquido. Quod sanè vel nudis occurrebat oculis ex fluido intus contento. Erat enim lymphâ partim subtilis, & flava, partim in crassam veluti gelatinam

^a Quam inseruit suæ dissertationi epist. de glâd. & lymph. mening.

Hydatis insignis supra cerebrum.

nam conversa. Ubi, quod mirabilius apparuit, id certè fuit, ut istius folliculi basis, cortex nempe cerebri, ad talem resistantem consistentiam devenerit, quæ planè scirrhusa videretur.

XIV. Ex his verò duobus exemplis fati patet, obstructis paulatim sanguiferis, ac lymphaticis, posse in cerebro congeri tumores, intercipientes liquida, maximopere viscosa, simulque acria, vel quovis alio modo capiti, & nervis hostilia, quæ, ruptis tandem alicubi repagulis, per proxima vasa diffluant, & quaquaversum subitò diffusa, tum animalium spirituum crasim penitus invertant, tum eorundem vias intercludant, & meningum, minimumque cerebri motum, unà cum vitâ, penitus tollant.

XV. Secundò, quanquam de viarum libertate fati dicat, qui de structuræ vitio agit; adhuc tamen monendum censemus, aliquando, etiamsi vasorum in cerebro structura nusquam appareat vitata, fieri posse, ut celerrimè mors invadat, ratione solius repentinæ totalis pressiois, & obstructionis vasorum inferentium, ac referentium, nec non mi-

Quid ex a& ductis bifforrii deducantur.

*Obes: repenti-
na totalis va-
sorum intrā
cranium ob-
structio, faci-
lis.*

nimarum glandularum cerebri, ac cerebelli. Quod præsertim obes is interdum accidere, videmus, in quibus ob celerissimam sanguinis stagnationem non modò subita vasorum obstructio, sed subita quoque paraly sis membranarum, sinuum, totiusque cerebri corticis proficiscitur, cujus exemplum dabimus hist. 1. illorum, qui hoc anno repentè interierunt, de quibus etiam habitus est sermo superiùs cap. VII.

XVI. Citissima quoque mors apud obesos, præsertim senes, potest contingere propter usum aquarum mineralium, quarum ob copiam cerebri vasa ita gravari solent, ut languescente peristaltico ipsorum motu, & dilutâ nimis, enervatâque contenti spiritus energiâ, sanguis confestim subsistat; indèque serum subterfugiens lymphatica diffingat. Neque sanè nobis desunt hujusce miserandi exitus exempla, quippe qui præ aliis vidimus Nobilem Rom. in primo senio constitutum, & subpinguis habitus, haustâ de more aquâ Villensi, eodem die repentè sublatum.

*Mors repenti-
na in Seno post
haustam aquâ
Villensem.*

XVII. Facit pariter ad viarum inter-
ce-

ceptionem quidquid nervos, qui ad præcordia, & ad meninges feruntur, ita comprimere potest, ut animalium spirituum ad eas partes cursum penitus intercludat. Ita mulierem, quam aphonia, & brachii paralyfis diù detinuerat, repente mortuam, aperuimus; in qua nihil conspicuum inventum fuit, præter scirrhosam glandulam, quæ sub cerebello, ad internum principium spinalis medullæ, prædictos nervos validissimè compresserat. Quid non etiam iidem nervi extra cranium obstructi, aut compressi, post aliquas præcordiorum passiones illatas; repentinam mortem inferre valent, quamvis nulla sensibilis causa in ipsis cadaveribus postmodum inveniatur? Constat enim per Diligentissimum^a Val-salvam, cordis nervos ad jugulum canis arctè constrictos, & illico solutos, adeo in structurâ insensibili labefactari, ut canis intrâ aliquot dies, eodem modo, ac si nervi illi amputati essent, indè moriatur, licèt iidem rursus inspecti, in se nullum sensibilis læsionis vestigium ostendant. Quod sanè multò facilius potest contingere, si sanguis, per cor devol-

ven-

Nervorum ad præcordia, & meninges tendentium compressio mortifera.

^a De auris part. usu c. 5. Nobile Val-salvæ experimentum.

vendus, ob minorem, quàm par est, fluxilitatem, ac volatilitatem, motui renitatur, quod hisce in casibus plerunque contingit.

*Meningum, &
cerebri motus
multipliciter
ablatas.*

XVIII. Postremò membranarum, & cerebri motus, ut de corde diximus, tolli potest vel ob recens inductum structuræ vitium, quod ex magnis vulneribus, magnâve offis depressione accidit; vel ob repentinam meningum, totiusque nervosi generis paralyfim, quæ ex narcoticis, aliisque cerebrum afficientibus venenis oritur; vel siprehendat fortis, & pertinax convulsio, quæ, omnia cerebri vasa strangulando, cursum sanguinis, lymphæ, ac spirituum illico, & pertinaciter intercipiat; ut contingit in mortiferis epilepsiis, ac potissimum in magnis, ac subitis animi pathematibus, de quibus egimus cap. VI I. quæque in ipso statim cerebro vires suas lethaliter interdum exercent. Etenim, cum hujusmodi animorum affectiones, per externos sensus à cerebro suscipiantur, si viscus hoc naturâ, morbo, vel ætate languidulum, simulque fluidum, acie, ac mole intrâ cerebri vasa redundans, inveniatur; facîle, pro-

*Animi passio-
nes cur letba-
les.*

propter subitam vasorum omnium strangu-
lationem , epilepticam apoplexiam
inducunt , hominemque ex tempore tol-
lunt . Cujus profectò rei evidens ante
plures annos habuimus experimentum in
Optimate quodam sene , ac valetudina-
rio , qui , dum tranquillè alioquin cœ-
naret , improvisò accipiens nuncium de
adventu , sibi neque grato , neque hono-
rifico , consanguinei sui , repentinâ syde-
ratione sublatus est . In hujus verò disse-
cti cadaveris cerebro vasa undique tumi-
da ex intercepto , propter subitum ani-
mi pathema , sanguinis , lymphæque cur-
su , indèque cavitates tum sulcorum ,
tum ventriculorum usque ad spinalem
medullam exundante sero repletæ oc-
currerunt .

*Exemplo res
illustratur .*

XIX. Ad eundem postremò censum
spasmodicarum passionum cerebri , &
nervorum splanchnicorum referri pos-
sunt dolores immanes , qui ex artuum ,
sphacelo correptorum , amputatione
oriuntur , si eâ , quâ nondum mortui
sunt , parte (præsertim si debiles fuerint)
refecentur ; de quibus apud ^a Hipp. scri-
ptum legimus , *Magnum periculum est , ne*

*Artuum spha-
celatorum am-
putationes in-
terdum subite
mortis causa
ex Hip.*

^a Lib. de art.
n. 8.

K

præ

præ dolore in animi deliquium incidant . Talia verò animi deliquia multos jam è vestigio peremerunt .

XX. Pauca hæc de subitaneorum mortium causis attulisse fati duximus , ne liber in magnum volumen evaderet . Neque ego has solas esse contenderem ; quinimo hortor ad quærendum , & alias inveniri posse , fateor , quæ tamen non multum ab jis abhorrebunt . Interim qui ad curiositatem explendam , longiorem exemplorum seriem petierit , penum habebit paratam , inter Veteres quidem , in unâ Dominici Tirilli Tractatione de causis repentinæ mortis , qui sanè Author fuit cum rebus Philosophicis , tum Medicis (ut temporibus illis) fati eruditus ; inter nostros verò , in Miscellaneis Naturæ Curiosorum Germaniæ , in Boneti Sepulchreto , & Medicinâ Septentrionali , aliisque Compilatorum libris , qui Priscorum , Recentiorumque observationes brevi , & concinnâ methodo ad nos tra- duxerunt .

*Tirillus inter
Priscos egit de
mortibus re-
pentinis .*

Su.

*Subitanei morbi hætenus expositi ad tria capita rediguntur, ad Suffocationem, ad Syn-
copem, atque ad Apoplexiam, quæ
Et simul plerunque concurrunt.*

C A P U T XII

UT consulamus jis, quos facilè
tædet multitudinis idearum,
quæ veniunt concipiendæ, ad
intelligendas possibles subita-
nearum mortium causas, earundemque
operandi modos; opportunum censemus
hoc loco tribus tantùm malorum specie-
bus universam hanc, penèque immen-
sam rem solerter complecti, quæ quidem
species sub genere morbi attoniti, &
sensuum, respirationis, pulsusque offi-
cia plùs, minùsve tollentis comprehen-
duntur. Cùm enim repentinæ mortes
ex certis tantummodo repentinis morbis
orientur, horum sanè interimere poten-
tes sunt

*Sub genere
morbi attoniti
tota res ista
comprehendi-
tur.*

II. Primò quidem morbi omnes, qui,
ex aeris vitiis, aut læsionibus instrumen-
torum, respirationi inservientium, pro-
ducti, confestim interficiunt; id sanè fa-
ciunt,

ciunt, quia vitam alterno aeris, & illius, quod in aere natat, corporis pabulo defraudant, ac proindè ad præcipitem suffocationem, aut præfocationem tutò referri debent.

Aer sanguinem faciliat.

III. Cùm verò aer, reciproca inspirationis, atque expirationis lege, sanguinem obscuro, ac penè ignoto movente fœcundet, eundemque clarâ nobis pulsione per venam pulmonicam versùs lævum cordis ventriculum urgeat; idcirco, prohibetâ respiratione, statim universa sistitur circulatio, indèque cor, & cerebrum, propriis motibus destituta, necessariò in syncopem, atque apoplexiam incurrunt.

Prohibetâ respiratione, quomodo cor, & cerebrum ledantur.

Corde &c. affesto (in iis scil. qui subitò moriuntur) cur cerebri, & pulmonum motus sistantur.

IV. Secundò morbi omnes, ex sanguinis, aut cordis, magnorumque sanguiferorum vitio exorti, si ægros ex tempore interimant, id moliuntur, quia alternum cordi motum celeriter auferunt, ac propterea syncopem inducunt, ex quâ facilè est concipere, quomodo cum cerebri, tum pulmonum motus continuò sistatur, seu quomodo apoplexia, & suffocatio ex necessitate succedant.

V. Postremò maxima illa spirituum ani-

animalium , & cerebri mala , quæ subitam necem accersire posse , probavimus , non aliò tendunt , quàm ut motum , ac sensum internis visceribus , externisque organis , & artubus non illico solùm , sed omnino tollant , seu fortissimas apoplexias inducant . At verò , positis huiusmodi apoplexiis , è vestigio motus cordis , atque pulmonum extinguitur , ac proinde syncope , & suffocatio necessariò suboriuntur .

*Cerebro lese,
idem cordis,
& pulmonibus
accidit .*

VI. Sed non ipsa solùm infelix prædictorum trium successio malorum ; quin lethifera etiam eorundem complicatio ut plurimum , tanquam subitarum mortium causa , uno , eodemque tempore concurrit , tunc præcipuè , cùm ab interno , fluidoque principio iidem morbi dependent . Non enim humoralis causa , quæ , cùm movetur , e. g. potens est in cerebro inducere convulsionem , aut paralysem eorum nervorum , qui ad viscera majoris usus feruntur , hominem subito interimeret , nisi per eadem viscera cum sanguine diffusa , in corde syncopem , in pulmonibus præfocationem , in cerebro apoplexiam eodem ferè momento tempo-

*Magna liquorum vitia solidis exiti-
lia, & contra.*

*a De alim.
n. 4.*

poris plerunque machinaretur. Hoc sane præcipuè apparebit ex his, quæ in Observationibus trademus. Magna siquidem vitia fluidorum statim cum solidis partibus communicantur, & vicissim solida, magnopere labefactata, fluidas partes diù incolumes superesse, non sinunt. Unde scitè, prudenterque ajebat " Hippocrates, *Consensus unus, conspiratio una, consentientia omnia*. Quod certè non pro servandâ solùm, sed pro destruendâ animalium œconomiâ intelligendum esse, putamus.

Recensitæ causæ subitanearum mortium invincibiles, aut vincibiles existunt.

C A P U T XIII

*Præfocati &c.
ad vitam naturaliter quâ-
dèq; restituntur.*

Quemadmodum sæpe factum est, ut morbi, qui ad suffocationem, ad syncopem, vel ad apoplexiam referuntur, hominem inopinatò occiderint; ita non dubitamus, quin aliquis suffocatus, aut præfocatus, syncope gravissimâ, vel fortissimâ apople-

plexiâ correptus ; etiamsi pro mortuo habeatur , ac prædicetur ; ad vitæ tamen officia , naturali interdum viâ , redire possit . Quare inter morbos , inopinatam , subitamque mortem inducere potentes , alii penitus invincibiles , alii verò vel ipso negligentia , ac temporis beneficio , vel medicamentorum ope vincibiles sint , oportet .

II. Invincibiles , hoc est omnino insuperabiles , ac verè , subitoque interimentes , sunt omnes morbi , qui ex insigni aliquo intrâ præcordia , cerebrum , vel abdomen sanguifero vase , spontè , aut violenter disrupto , originem habuerunt , quique ex discissâ quomodolibet in jugulo , vel in artubus arteriâ , per quam universus sanguis jam effluerit , dependent .

III. Invincibiles quoque sunt , qui ex ablatâ continuatione cerebri cum nervis , præsertim cum scissio nervorum jungitur vulneri , ac discissioni arteriarum , & viscerum . Unde inter genera mortium expeditissimum æquè , ac certissimum illud est , à quo nemo unquam evasit , capitis nimirum , vel trunci dissectio ; nisi per

*Subita mortis
causæ non om-
nes invincibi-
les.*

*Invincibiles
quæ.*

si per lusum excipere velimus illum , quem lepidissimus inter Hetruscos Poetas fabulatur , medium ense acutissimo diffusum , morte nondum cognitâ , quippe partibus adhuc hærentibus , arma tractare non destitisse.

a Bern. in suo
Poemat. ital.
Orlâd. innam.
lib. 2. cant. 24.
ottav. 60.

² *Così colui del colpo non accorto
Andava combattendo , E' era morto.*

*Fortis senum
apoplexia in-
vincibilis.*

IV. Inter subitaneos morbos , qui itidem sunt invincibiles , numeratur quoque fortis apoplexia ; quæ decrepitis accidit ob concursum duarum simul causarum , hebetudinem scilicet solidorum ad circumpellendum , ac defectum partium oleoso-volatilium , quæ ipsa solida , fluidaque mobilia reddunt.

*Syncope pariter , quæ ab
erosione , &c.
inducitur.*

V. Simile de illâ syncope iudicium ferendum erit , quæ ab inductis paulatim erosione , polypo , tuberculo , lapide , & consimilibus , in corde , ejusque vasis , motum sanguinis inhihentibus , proficiscitur ; de quibus aliqua etiam dicemus cap. XIX.

*In genere , quinam morbi in-
superabiles .*

VI. Denique paucis concludendo , causæ insuperabiles repentinæ mortis intrâ
vi-

vires naturæ, vel artis, sunt omnes jī morbi, qui valent inducere integrum defectum sanguinis, vel tollere continuitatem cerebri cum nervis, aut cordis, & insignium sanguiferorum cum cerebro, aliisque magni usus visceribus, aut aliæ hujus generis maximæ affectiones, quas sigillatim piget enarrare.

VII. Vincibiles verò appellamus improvisarum mortium causas, quæ, etiam si plerunque viæ sint ad interitum, aliquando tamen, vel extra humanam spem, ipsâ curantium audaciâ, sed non planè temeritate, imò ipsius (quod frequentius accidit) intromoventis naturæ energiâ, mirabiliter fugantur. Ad hujusmodi autem morbos jī præcipuè referuntur, qui à simplici, celeriterque factâ obstructione, pressione, aut convulsione instrumentorum, motui aeris, sanguinis, ac liquidi animalis inservientium, dependent. Ita correptos apoplexiâ ex solo infarctu vasorum, ut Timocratem in Helide, apud Hippocratem, interdum simplex curavit inedia, cujus beneficio, obstructo cerebro, non solùm nihil additur; imò verò per validiorem in-

Vincibiles à medentium audaciâ, & natura vi, quinam.

Apoplexia per inediam curata apud Hipp.

a v. epid. hist. 2.

Rei ratio as- figuratur.

L

du-

*Hystericarum
paroxyfmi cur
folâ temporis
ufurâ quando-
que superitur.*

*Medici ſper
bis in caſibus
qualis.*

ductam fanguinis subtiliationem, & motum, aliquid perpetuò detrahitur. Ita hystericas, & præfocatas, mortuis quantumvis adscriptas, per ipsam, quæ necem intulisse visa est, paroxyfmi diuturnitatem, aliquando revixisse, comperimus; scilicet usurâ temporis (cùm cætera sana sunt) subtilissimum illud miasma, quod, intrâ nervorum texturam interceptum, enormiter convellebat, sensim oleosis halitibus lævigatum, subtiliatum, ac circumpulsum, effluit, liberumque reddit corpus, quod mortali tensione riguerat. Unde prudens Medicus rarò tam abjectam de istiusmodi improvisò mortuis habere debet spem, ut sit omnino desperatissimus: nimirum boni Medici erit (dummodo internorum vasorum rupturæ, aut contumacissimæ obstructions, pressiones, aliæque prorsus invincibiles viscerum, nervorumque affectiones absuerint) subito fateri, quàm maximus timor, quàm minima sit spes, ut omnem absque famæ suæ detrimento movere lapidem, ægrumque, si adhuc vivit, ab orci faucibus possit eripere. Ita enim homo fit homini Deus, ut pulchrè ad-

advertit^a Tiraquellus, cùm Medicus morti proximos, ac veluti adjudicatos, atque etiam quosdam, qui mortui putabantur, reddidit sanitati.

^a De Nobil.
cap. 31. n. 434.
& 597.

De signis improvise mortis, & primò de simulatis, ac suppositis, seu supplantatis mortibus.

C A P U T XIV.

QUoniam hæcenus, quales improvisarum sint causæ mortium, ostendimus, exempla que ex parte cum fluidorum, tum solidorum, de quibus dicere oportebat, subjecimus; jam hinc, quibus signis non tam præfens, quàm imminens, ac futurus inopinatus interitus sit cognoscendus, breviter inquiramus.

II. Principiò itaque non sum ignarus, vaferrimos inveniri homines, qui, ut faciliùs ex commeritis evadant supplicii, macerato priùs per inedia corpore, eique inducto per sulphuris halitum squallore, injectis itidem validis ad brachia

L. 2 vin-

vinculis , tandemque blando epoto narcotico , aut spontè parumper coactâ respiratione , subitò mortuos se fingunt ; quod ut expeditiùs patrent , custodem , amicum , vel servum , quò ex pacto , & conventu rem agant , sibi adsciscunt . Sed istos , planè irridendos , ac peiori deinceps poenâ mulctandos , promptum est deprehendere , si eorundem denudata , atque excussa corpora , flagris , ferro , igneque , si opus est , tractentur . Arterias enim , solutis vinculis , rursus in carpis micare ; & respirationem , violenter coactam , in libertatè redire , sentiemus . Quod Judicium causâ monendum duximus , ut sint posthac , adversùs hujusmodi fallacias , cautiores .

*FiFlorim
mortuorū cal-
lūditas detegi-
tur .*

III. Deinde improbi scelerum machinatores proprios sæpe hostes , vel alios , lucri causâ , quantumvis planè innoxios , veneno , strangulatione , vel exili intrâ præcordia vulnere perimunt ; & mox ad veram necis causam occultandam , eosdem in flumen , aut puteum demergunt , vel per scalam præcipites agunt ; quò nimirum spontè , vel casu mortui palam judicentur . Nunc , si quis particularia si-
gna

gna ad has, vel illas effictas, aut veras subitaneas neces detegendas, pro relationibus, præsertim in fori usum, sedulus, atque curiosus exoptet; adeat ^a Fortunat. Fidel., & Quæstiones med. legal. Pauli Zacchiæ. Nos enim hîc causas, & signa potissimum naturalium affectionum quærimus, non forenses conjecturas.

^a Lib. 4. de
relat. medico-
rum per. to-
tum.

*Exponitur difficultas inveniendi certa signa,
quibus dignoscantur qui naturâ, non
arte pseudo-mortui occurrunt.*

C A P U T X V.

Illa utique nec præterire volumus, nec debemus, quibus non hominum docemur calliditatem, sed vitia, dixerim, an sÿvetos naturæ motus, quæ finit aliquando, ut ji, qui nondum mortui sunt, pro talibus habeantur.

II. Profectò non ex aliorum dumtaxat historiis nobis innotuit, multos, qui decessisse credebantur, vel prope sepulchra evigilasse; sed nostro etiam experimento id ipsum comprobatum recordamur

mur in Viro nobili, adhuc vivente, qui viginti ante annos, cum ei iusta perfolverentur in Templo, ad motuum, sensuumque munia, omnium cum terrore magis, quàm admiratione, redivit. Merito idcirco exclamat ^a Fabius — *Unde putatis inventos tardos funerum apparatus? Unde, quòd exequias planctibus, ploratu, magnoque semper inquietamus ululatu? quàm quòd vidimus frequenter post conclamata suprema redeuntes.* Prudenter igitur lege vetitum est quoscumque mortuos, & eos præsertim, qui repente decesserunt, statim sepelire.

^a Declamat.
8.

^b Ex Paræo
lib 23. cap 46.
*Turpis Vesalii
calamitas.*

III. Horret meminisse, ^b Vesalium, neglectæ olim Anatomes parentem, ad mulierem hysterica, quæ mortua credebatur, diffecandam accersitum, eò negligentia suâ fuisse perductum, ut vix alteram novaculæ impressionem adegerit, cum illa motu, & clamore se vivam ostendit, quæ sanè res Virum odiosum, ac detestabilem reddidit; idcirco nil prius sibi esse duxit, quàm se fugâ subtrahere. Sed ne sic quidem intestinum terrorem, ac carnificem, quo iudice, nemo nocens absolvitur, fugere potuit; mæstitiâ enim

con-

confectus, non multò post, magno rei & publicæ, & medicæ detrimento, interiit.

IV. Difficultas autem noscendi illos, qui, etiamsi mortui nondum sint, mortui tamen apparent, exindè oritur, quòd motus alternus aeris, sanguinis, & succi nervorum per organa majoris usus (in quo sanè motu omnem vitæ rationem consistere, dictum est) nostros aliquando sensus prope fugit, ut ferè soli naturæ innotescat. Vicissitudo namque motionis pectoris, docente potissimùm Gale-
no, tam minima esse potest, ut, dum costæ, ad sternum pertingentes, non moventur, sed solum diaphragmatis centrum tantisper trepidat, inermes oculos plerunque fallat. Sanguis itidem (integris cæteroquin existentibus vasis, proprioque oleoso-volatili sale fluens) ob solam contractionem summarum venarum, & auricularum, nudamque cordis, quasi dixerim, jectigationem, tacitè interdum per ventriculos urgeri, & per arterias, ut passim per venas, adeò leniter devolvi potest, ut vitalis hic motus pulsus in folis carpis exploranti penitus abscondatur. Idem planè de nervorum liqui-

*Cur pseudo-
mortui diffi-
culter à mor-
tuis distin-
guantur.*

*a 8. De ad-
ministr. anat.
& 4. de loc.
affect.*

*Illorum vibra-
tio, & dia-
phragmatis
motus, qualis.*

*Cordis motus,
quinam.*

*Pulsus cur
habeat tactus
imperceptibi-
lem.*

*Eorum liquidi
nervi motus.*

Menti, & sensibus non omnia innotescunt.

liquido sentiendum, quod, cum fluidissimum suapte naturâ sit, exiguis adeo undis per nervos præcordiorum nonnunquam agitari potest, ut reliquum illud minimum animalis vitæ igniculum, ferè nobis ignotum, conservet. Ut enim non omnia incorporea mentibus, ita nec semper sensibus omnia corporea manifestò patent.

Quomodo insecta decursu hyemis sine apparenti motu vivant.

V. Hoc sanè docent apertissimè animantia illa, quæ per totam hyemem sensu, motu, cæterisque vitæ indicibus destituta esse videntur, cum tamen profundo somno sepulta lateant; ac propterea tantillum præcordiorum, sanguinis, ac spirituum animalium motum superstitem conservent, qui certè motus si planè extinguatur, jam actum est de illorum vita. Exindè fit, ut post asperiores hyemes insecta, ac præsertim muscæ, magnâ ex parte, jis omnino sufflaminatis motionibus, pereant. Meritò idcirco scripsit ^a Paul. Zacch., nullum, quod aliquando non fefellerit, præsentis mortis signum inveniri, præter cadaveris livorem, æstuationem, ac foetorem.

^a Quæst. med. legal. præsertim conf. 79. n. 21
Inser signa mortis certissima cadaveris sictor, ex Zacchia.

VI. Sed quanquam qui de pseudo-

mor-

mortuis iudicare debet , obscuram provinciam suscipere cogatur , & quotidianum , ac frequentissimum sit , creditum vulgo mortuum , re ipsâ decessisse ; nihilominus tamen nonnulla indicia speculari operæ pretium erit , quibus eos discernamus , qui syncope , aut fortissimâ apoplexiâ detenti , occubuisse videntur .

De signis , quibus pseudo-mortui à verè mortuis distingui possunt .

C A P U T X V I .

Hoc ante omnia maximè advertendum censemus , non semper Artis defectui , sed artificum , atque assidentium incuriæ plerunque adscribi debuisse , quòd ægri , nondum verè mortui , derelicti fuerint , ac vespillonibus traditi , idque potissimum pestis tempore . Rogo itaque nedum Medicos , sed etiam pios illos Religiosos , qui Romæ , atque alibi , ex instituto , animam agentibus adsistunt , ut sequentibus indiciis diligenter utantur .

Autoris monitum .

M II.

*Mortuus à
pſeudo-mortuo
distinguitur
primò ex præ-
greſſis cauſis.*

II. Porrò , ut Medicus faciliùs judicet , an reverà quis vitâ functus fuerit , omnium primò necis cauſas exploret ; quæ ſi extiterint invincibiles , de quibus egimus cap. x i i i . , liberè decernat , ægrum jam è vivis exemptum fuiſſe , cum vocem , reſpirationem , ac pulſum , brevi etiamſi tempore , amiſerit . Quòd ſi contra cauſæ occurrant per ſe vincibiles , tunc acriori ſenſuum , rationiſque criterio ſibi opus erit .

*Secundo à ſe-
pulto reſpira-
tionis , & cor-
dis motu .*

III. Et quoniam abſque voce , uſuque internorum , externorumque ſenſuum , ac motuum , à voluntate pendentium , vitam aliquandiu protrahere poſſumus ; ſinè ſepultâ tamen , atque exili ſaltèm reſpiratione , cordiſque trepidatione non poſſumus ; hinc jure optimo Scriptores , daturi notas , quibus viventem à mortuo diſtinguamus , in ſuperioribus hiſce duobus maximè verſantur : quidquid in contrarium ſcribat Paul. ^a Zacch. qui exemplum adducit cujuſdam , quem graſſante peſte , dum veſpillones , ut mortuum , ad deſtinatum locum aſportabant , vitæ ſigna dediſſe , viderunt . Etenim quis ignorat , peſtis tempore omnem rem
non-

^a Loco cit.
n. 5.

nonnisi tumultuariè peragi ; ac proindè leve dumtaxat studium, ad fecernendum veros à pseudo-mortuis, adhiberi.

IV. Respirationem itaque sepultam, Respiratio sepulta quomodo excitanda. atque inconspicuam tentabimus primò sternutatoriis acribus, ac vehementibus, quibus maximè fidentes invenio ^a Holle- rium, & ^b Fort. Fidelem. Secundò ipsius ^c Galeni consilio, paleam, tenuemque lanam ægri naribus suspendendo. Si nam- que vivit homo, vicissitudine motus aeris, quantumvis lentissimi, lana movebitur. Quod profectò experimentum memorat ^d D. Gregor. olim susceptum fuisse in Præsbytero Ursino, cui, solutis membris, atque in morte distento, cum Præsbytera sua, si quid vitale spiramen inesset, naribus appositâ curasset arte dignoscere (magno certè ad honestatem tuendam argumento) sensit, se ab ægro, collectâ voce, vehementer objurgari: *discede à me mulier ; adhuc agriculus vivit ; paleam tolle.* Tertiò, alii cereum, exiguum- que lumen ori, ac naribus moribundi applicant, cujus flamma si à recto sursum tramite deflectat, ac tremula fiat, homo etiamnum vivit. Quartò, abster-

^a Primo de morb. inter. cap. 58.

^b De rela t. med. l. 4 c. 1. ^c Tertio de diff. resp. cap. 10.

Lana ægri naribus admo- vanda.

^d Dial. lib. 4. c. 11.

sum speculum ori apponunt , quod si paulò post maculis fœdetur , de vitâ spes est . Quo sanè speculo feliciter usus fuit ^a Albertinus Botton. ad explorandas vitæ reliquias in muliere Patavinâ , quæ , hysterico strangulatu correpta , adstantium omnium consensu , mortua existimabatur .

^a Lib. I. de morb. mul. c. 45.

Cyathus supra xiphoidæ cartilagineum locandus .

V. Tandem , cùm ad ipsius motum diaphragmatis , quantumvis minimum , efficiendum , costas spurias , quibus illud alligatur , moveri aliquo modo , necesse sit ; jure à Practicis proponitur , ut , supino firmiter locato ægro , cyathus aquâ plenus ad ima pectoris , supra cartilagineum ensiformem ad perpendiculum ponatur . Tunc si cyathus , contentumque fluidum vel minimum dimoveantur , in vivis est ; si secùs , jam mortuus æger .

Motus etiam non vitales aliquando in mortuis .

VI. At enim verò hujusmodi superstitis respirationis indicia non obiter , atque oscitanter , sed consultò , ac repetito periculo adamussim sunt expendenda , ut prudentes de vitâ , vel morte ægri , nunquam pœnitendum , judicium adhibeamus ; Contingit enim aliquando , ut certus motus tum abdominis , tum pect-

cto-

ctoris, etiam apud vitâ functos, excitari possit à naturali solidarum partium concidentiâ, vel à præternaturali contentorum fluidorum fermentatione, flatuumque præsertim elatere: quibus forsitan factum est, ut minùs in arte periti, vitam cadaveribus attribuentes, non solum falsi, atquì certè ridiculi interdum evaserint. Sed hæc omnia non tantùm præceptis, quantùm usu, ac diligentia docentur.

VII. Deindè ad lenem motum deprehendendum summarum venarum, auricularum, & cordis in pseudo-mortuis, longè majori afficimur difficultate, quàm sit ea, in quâ versatur quisquis notas exilis, ac sepultæ respirationis inquirat. Etenim thoracis machina, & circumfusus aer, qui alternè per tracheam in animalibus ducitur, reduciturque, nostris certè sensibus propinquiora sunt ipso corde, eidemque appensis arteriis, quæ, nonnisi tenuatæ, ad extrema corporis pertinent. Accedit ad rei momentum consuetudo explorandi pulsum in solis carpis; exindè namque fit, ut, deficiente arteriarum ictu priùs in carpis, quàm in
cor-

corde, aut in aortâ , majoribusque illius ramis, sæpe nonnulli de omnimodâ cefatione motus cordis judicium ferant ; cùm primùm in carpis pulsum desiderari, cognoverint. Quâ de re, ubi locus erit dubitationi, tunc motum cordis, & arteriarum non tantummodo in artubus quæremus, sed, inclinato languentis corpore in sinistrum latus, calidam manum regioni cordis admovebimus, exquisituri, an motus aliquis in corde supersit.

Cordis motus in pseudo-mortuis quomodo sit perquirendus.

Carotides arterie ad superficiem pulsam explorandum cur aptiores.

Deinde validâ etiam digitorum pressione tentabimus arterias carotides, quæ, cùm diametro majores sint jis, quæ ad manus sparguntur, nec obliquè, & per angulum in axillis, sed rectâ ferantur ab arcu arteriæ magnæ versùs caput, gradum impetus sanguinis, etiamsi tenuissimum, à corde acceptum, faciliùs excipere, & explorantibus ostendere possunt. Interim verò superstites apud præcordia vitæ scintillulæ omni arte, admotis quâ intrâ, quâ extra corpus cardiacis volatilibus, ac svaveolentibus, fovendæ, atque excitandæ erunt, ut in arteriarum pulsibus clariùs erumpant.

VIII. Enimverò, quemadmodum cav-

vendum nobis est, ne occultò viventem, propter imperitiam explorandæ reliquæ illius, quantumvis tenuissimæ, arteriarum pulsationis, inter mortuos reponamus; ita diligenter providendum, ne, vanâ opinione inventi pulsus, artem nostram in contemptum adducamus. Siquidem exemplum habemus cujusdam, quem prudens reticeo, qui, cùm uni ex summis Romanæ Aulæ Proceribus, repentè mortuo, & à nobis jam derelicto, adsisteret, totâ strepente domo, nobisque stoliditatem illius mirantibus, Procerem etiamnum vivere, contendebat. Cùmque nos credulitatis suæ causam sciscitaremur, pro signo adduxit superstitem adhuc pulsum. Neque sentiebat homo excors, pulsum, quem mortuo attribuebat, sensum esse arteriarum priorum digitorum (erat enim fervidâ fluidorum crasi donatus) quibus cùm arctissimè premeret cadaveris carpum, cæteroquin excarnem, & aridum, refluxum liberum ad venas proprii sanguinis impediēbat, ideoque, suis arteriis validiùs ad extrema pulsantibus, sibi, & domesticis errorem hunc ineptissimè objecerat.

Que vitanda, ne qui pulsum mortuo perperam attribuat.

IX.

Sopitas nervorum motiones excitantia.

IX. Porrò, ut redeamus ad pensum, nullus sapiens, sedulusque Medicus curam negliget animalium spirituum, ac nervorum, saltèm splanchnicorum, mediis clamoribus in aures, stimulis ad magis sensiles partes, odoramentis, & acribus volatilibus ori, ac naribus adhibitis, aliisque, quorum sylvam nemo Practicorum non novit, & de quibus plura dicemus in secundo libro, ubi de medicamentis, quæ hoc anno jis maximè profuisse visa sunt, qui, subitaneis morbis tentati, feliciter evaserunt.

De signis medicis, quibus repentina mors prænosci potest.

C A P U T XVII

NON utilis modò, sed maximè necessaria Medicis videtur scientia præcognitionis repentinæ mortium, cùm nostræ^a Præceptor Artis clarè ostendat, eum non solùm culpâ vacaturum, verùm etiam boni Medici nomen, atque ad-

^a Hipp. in vestib. lib. progn.

admirationem consecuturum, qui, cum omnes sanos facere non possit, futura saltèm præsentiat, atque prædicat. Hanc itaque spartam ornaturi, illud in primis cavendum ducimus, ne quis tanti putet notas, quas subnectimus, ut eas vel omnino certas, &, ut ajunt, pathognomonicas credat, vel sinè delectu, ac singillatim accipiat. Si quod enim in universâ Medicinâ difficile, arduumque negotium, hoc procul dubio in ferendis futurorum judiciis locatum est. Multa siquidem variis annitempestatibus, ægrorum continentîâ, vel incontinentîâ, lætis, aut tristibus animi pathematibus mutantur in melius, aut in deterius; ut proindè etiam ad rem Medicam pertinere, putaverim, quod in Juris doctrinâ passim usurpatur, nempe vel totam esse prudentiam, vel sinè prudentiâ exerceri non posse. Atque hinc ^a Hippocrates voluit Medicum tum in ceterâ Arte, tum in prædictionibus consultissimè se gerentem, ac probè intelligentem; eum, qui prædictionis successum consecutus sit, apud prudentem ægrum admirationi fore; qui verò deerraverit, præterquamquod odio gravabitur,

Summa prædicitia in Arte medica est necessaria.

^a Lib. 2. prædic. n. 3.

N

tur,

tur, cum ne insaniam quidem suspicionem ef-
fugere posse.

*Prudentia
quomodo ac-
quirenda.*

II. Ut igitur Medicus, præfagiturus
inopinatas mortes, in ipsâmet conjectu-
rali arte verax, ac prope securus evadat,
primò multis aliorum, & propriis ob-
servationibus diligenter studeat; deinde
ex totâ signorum messe manipulos qua-
si colligat, & ad suas quosque classes re-
ducat, ut postmodum, cùm occasio po-
stulat, maturè, ac studiosè recogitando,
& cogitata cum rebus conferendo, cau-
tus, ac prudens pronunciet.

*Interna va-
rices cognitu
difficiles.*

III. Nemo autem interea in spem eri-
gatur, dari signa, quibus omne genus
improvise mortis præsentiri, ac prænun-
ciari possit. Etenim quæ ab internis, sed
cæcis, nullaque indicia producentibus,
principiis veniunt, ut, inter alia, sepultæ
in ventribus, venarum varices existunt,
eæ quidem Medicis rarò innotescunt. Il-
læ dumtaxat nobis aliquatenus patuerint,
quæ fluunt à morbofis, & sensibilibus di-
spositionibus partium cum solidarum,
tum fluidarum majoris usus, à quibus ut,
munus ritè suum peragentibus, vita, &
salus, ita, deerrantibus, morbi paula-
tim

tim inducuntur , primo quidem aspectu leviores , sed qui tandem acervatim erumpendo , inopinatò solent interficere.

IV. De singulis suo tempore , nunc dicimus de universis ; unum postremò summæ necessitatis huic loco adjicientes , scilicet non quemcunque ægrum , cui subitanæ mortis periculum imminet , de eodem esse commonefaciendum .

*Cuiliber ægro-
tanti mortis
periculum non
est aperiendū.*

Etenim omnes quidem homines , etsi severioris virtutis , animi tamen affectionibus sunt obnoxii , eisdemque aliquatenus perturbantur ; ast ji maximè , qui vehementer timidi , atque imbecilles existunt , quos ipsamet mortis opinio aut in mortem , aut in mortis discrimen

adducit . Hinc rectè ^a Galenus , aliter cum sapientibus , aliter cum timidis , &

*a 6. epid. sect.
2. comm. 43.*

stultis agendum esse , consuluit ; & ^b Hippocrates multò priùs scriptum reliquit ,

*b De decent.
ornat. n. 9.*

pleraque futurorum ægroto occultanda esse . Sed interdum fit , ut , contrariâ penitus ratione , generosis Viris subitanæ mortis periculum sit enunciandum ; ut timore ad ea flectantur usurpanda remedia , quæ aliàs nimis fidenter spernere consueverunt .

N 2

V. Quo-

Mors repentina quibus potissimum accidat.

V. Quoniam verò repentinæ mortes jis potissimum solent accidere, qui morbos aliquos, vel propter symptomatum levitatem, vel propter assuetudinem, sibi familiares redditos, facilè despiciunt, sperantes, se aut solâ naturæ ope convalituros, aut nonnisi præviâ longi agonis admonitione fore decessuros; idcirco unumquodque futuræ mortis indicium, ex unoquoque genere hujusmodi malorum erit depromendum.

Ejus signa ex quibus fontibus bauriend.

VI. Itaque eodem planè ordine, quo repentinæ mortis causas persecuti fuimus, utemur etiam in examine signorum, quæ easdem neces nobis portentant. Ratum enim, certumque apud Practicos illud est, omnia signa ex morbis, morborum causis, ac symptomatibus, tanquam ex fontibus, fluere. Distinguemus verò hujusmodi notas primò in eas, quæ colliguntur ex læsis instrumentis respirationis, & aere; secundò in illas, quæ veniunt ex affecto corde, magnis vasis, & contento sanguine; tertio in reliquas, quæ proficiscuntur ex morbis cerebri, nervorum, atque liquidi eorundem.

Agi-

*Agitur de signis futuræ mortis repentinæ, pe-
titis ex læsione instrumentorum, respi-
rationi famulantium.*

CAPUT XVIII.

Inter notas, quibus repentè futurus indicatur interitus, non ultimum locum tenent illæ, quæ ex læsione pectoris, & pulmonum deducuntur.

II. Primò sanè orthopnoea cum tussi apud Senes, si diù humida persistens, statim mutetur in siccam, morbo interim de suâ vi nihil remittente, improvisam necem, ut plurimum, præfagit: scilicet quòd lymphæ copia, quæ, suppressâ anacatharsi, in pulmone, jam languido, atque obstructo, subsistit, facilè parit suffocationem, præsertim, si æger intemperantiùs, aut incontinentiùs vixerit.

*Diuturna
tussi humida
in siccam con-
versa, quando
exitialis.*

III. Secundò tussis molesta, & suffocativa ex acri latice, per glandulas ary-
tænoidæas, tracheæ, & bronchiorum af-
fatim secreto, si magno cum impetu id-
entidem recurrat, mortem subitam por-
tendit, præcipuè si æger vel senex, vel
languidus, atque etiam in vitæ regimi-

*Suffocativa
quomoda.*

*Glandulas
arytænoidæas
primus Orbi
Medico dete-
xit Jo: Bapt.
Morgagnius
in suis Ad-
vert. Anat.
num. 2.*

ne

a 2. De morb.
n. 52.

ne fit aliquantò liberior: apoplexia namque pulmonum, quam suffocativum catarrrhum dicunt; ab irritantium serofitatum confluxu, & articulorum pulmonum convulsione, ut cum *a* Hippocrate loquamur, producitur. Quod fanè mortis genus nos frequenter vidimus, & primum quidem, supra viginti annos, in Carolo Petrazzino Aromatario ad Capitolii radices; is enim, cùm senex esset, atque hujusmodi tussim sperneret, mediâ tandem nocte, ut eidem prædictum fuit, suffocatus interiit. Simili planè modo Romanus Princeps, cùm podagrâ, atque hæmorrhoidibus vexatus, conuenisset; ob animi tamen pathemata, vitæque intemperantiam multis ante mensibus neque podagræ, neque mariscis amplius esset obnoxius; elapso anno repentinâ pulmonum, asperæ arteriæ, atque œsophagi convulsione correptus, brevè (ut prævisum) totius Urbis cum mœrore decessit.

Interni pectoris dolores animam terribiles.

IV. Tertio interni pectoris dolores, qui modò spirandi difficultatem, præsertim per acclivia, modò cordis angorem, sæpe pulsus inæqualitatem comites habent,

bent, quique non sinunt, ægrum in utrumque latus æquali facilitate decumbere, & corporis gracilitatem inducunt, ex tempore solent interficere, præcipuè si ægri subeant violentos aliquos corporis motus, parumque laudabili cibo sese ingurgitent. Gerunt enim sepultum plerunque in altero pulmonum lobo tuberculum, vel aliam congestionem, aut venæ pulmonicæ dilatationem, quorum, propter repentinam rupturam, aut propter inductam quaquaversum validissimam convulsionem, liber transitus per cor, & pulmones tam sanguini, quam aeri ocyssimè tollitur. Quam certè moriendi viam non pauci inierunt ex jis, quos novimus; atque horum numero adscribendus videtur Doctor Medicus Vinciguerra, qui elapso anno, cum diù levi anhelitu, sepultisque in pectore doloribus vexatus fuisset, tandem intempestâ nocte, domesticis, ac Sacerdote vix accersitis, è vivis sublatus fuit. Vide quæ scripsit Experientissimus ^a P. Poterius de jis, qui illico moriuntur ob rupturam venæ pulmonicæ juxta sinistrum cordis ventriculum; illi enim respirandi quâdam

*Ex jis, qualis
morbus latens
arguatur.*

^a Cent. 3. obs.
cap. 22.

*Vena pulmonicæ rupturam
quænam præcedant ex Poterio.*

dam difficultate, deambulantes, corripiuntur, & ob præcipitem virium lapsum, propinquis tenentur niti adminiculis.

*Ex pulmonum
vomicâ repent.
mortis prædi-
ctio.*

*a Lib. 2. obf.
cap. 10.
Quinam su-
perstites.*

*b De morb.
pect. sect. 1.
cap. 11.*

V. Quartò magis adhuc repentina mors prædici potest in consimilibus casibus, si id, quod in pulmone congeritur, fuerit de naturâ vomicæ, quæ potissimum cognoscitur ex siccâ tussi cum fœtore quasi cadaverico, quem ægri, aerem educendo, identidem sentiunt. Rumpitur enim incerto alicubi tempore, cum erosus, vel nimium distractus fuerit folliculus, & plerunque occiditur, dictum factum, homo, ut scripsit^a Tullius. At enim verò, si hujusmodi morbus hominem corripiat, qui se in cibo, potuque contineat, noxiumque aerem præcaveat, tunc neque magnam in molem augetur, neque semper ex tempore diffilit, aut, si diffiliat, subitam necem afferre solet. Quinimo nonnullos superstites, atque sanos, ut^b Willisio contigit, nos etiam vidimus. Secus atque, si æger Baccho, & genio indulgeat, tunc Medicus, ratione contrariâ, securius judicium de subitaneo interitu pronunciare poterit.

VI.

VI. Quintò cùm ad motum thoracis tantopere nervi concurrant, fit aliquando, ut convulsiva asthmata ad repentinam necem deducant ægros, qui, antiquato jam malo, putant, se miserè vivere, si medicè vivant, morbumque propterea novo morbo cumulantes, externâ plerunque accedente causâ, repentè moriuntur.

Asthma convulsivum aliquando mortiferum.

VII. Tandem cùm in respirationis materiem veniat aer, & quidquid in aere latitat, non immeritò inter subitanæ mortis signa reponendas esse, putaverim, particulares quasdam tempestatum, aerisque affectiones, quippe quæ multos, lentè cæteroquin ægrotantes, repentè solent occidere, & quidem non vi primarum tantùm, ut ajunt, qualitatum, sed pulsu, & variâ mixturâ particularum, quæ miris modis nostrarum partium officia variant, atque perturbant. Sagax itaque, & peritus Medicus utatur consilio Hippocr., qui sparsim docet, ex magnis temporum mutationibus mala præaffectis jam corporibus evenire. Sed clariùs de subitanis mortibus loqui videtur in libro de aere, aquis, &

Ex anni tempestatibus, quæ ad subitam mortem ducunt.

nam. 3.

O

locis,

Locus Hipp.

locis, cujus fanè integrum hïc textum, utpote plura docentem, transcribimus. — *Præcipuè verò maxima anni temporum mutationes observande sunt, ut neque medicamentum purgans jubenter exhibeamus, neque partes circa ventrem uramus, aut secemus, ante dies decem, aut etiam plures. Maxime tamen sufficient decem. Ac maximi periculi plena sunt ambo solstitia, præcipuèque æstivum. Periculosissima etiam ambo æquinoctia existimantur, maxime verò autumnale. Syderum quoque ortus observandi, præcipuèque canicula, deinde arcturi, & vergiliarum occasus. His enim potissimùm diebus morbi judicationem subeunt, & alii quidem perimunt, alii verò desinunt, alii que omnes in aliam formam, & statum transeunt. — Et reverà multos, ordinariò etiam rerum cursu, in æquinoctiis, & mediâ potissimùm æstate, summaque hyeme, repente mori, observamus.*

VIII. Quâ de re Medicus, junctis causarum, & signorum ideis, non admodum difficulter, aliquem inopinatò moriturum, poterit divinare, si illum, fractis viribus, ex diuturno morbo partium majoris usus, circa prædictas magnas tem-

temporum mutationes, deterius affici, animadverterit. Neque profectò aliter Probi aeris in deleterium mutatio mortis causa. iudicet de his, qui salubre cœlum mutant in pestiferum, cùm potissimùm ipsi valetudine non admodum prosperâ freti fuerint.

IX. Sed quoniam multa symptomata, quæ ad respirationem pertinere videntur, radicem omnino morbosam habent in ipso corde, eique appensis vasis; idcirco sequenti capite, acturi de signis, desumendis à corde, & sanguiferis, perstringemus nonnulla etiam indicia, quæ subitanam mortem præfagiunt, læsâ etiam respiratione.

De signis futuræ subitanæ mortis à corde, magnis vasis, & sanguine.

C A P U T XIX.

UT latam hanc, confusamque materiem certis capitibus distinguamus, placet hujusmodi notas deducere primò ex Ex cordis etc. affectionibus, plura subita mortis præludia. pulsuum vitiis, secundò ex palpitatione,

Q 2 aut

aut dolore cordis , tertio ex animi deliquis , quarto ex hæmorrhagiâ , atque aneurysmate , quinto ex habitu plethorico , & obeso , tandem ex quarundam suppressione evacuationum .

II. Illud verò ante omnia hîc advertimus , recensitas passiones tam cordis , & magnorum vasorum , quàm sanguinis , & omnium fluidorum , quæ cum sanguine circumferuntur , vel à sanguine separantur , subitaneum interitum vix unquam indicare posse , cùm eadem seorsum , & singulæ ægros divexaverint .

Signis non seorsim, sed col- lectivim stupis, rutiis repenti- na mors præ- dicitur.

Experimento enim docemur , has notas tunc improvisò morituros præmonstrare , cùm inter se variè permixtæ fuerint .

Unde diligens Medicus , rectè divinatorus , neutiquam celeriter pronuntiabit , sed maturè signa conjunget , ut nos cap. xvii. jam ostendimus ; id , quod pluries in lib. de progn. inculcavit Hippocrates , quando signum aliquod lethale esse , discernit , sæpe repetendo : *sed oportet alia signa contemplari.*

III. Et quidem primò quantum spectat ad pulsuum vitia , etiamsi apud aliquos inæqualitas , atque intermittentia

tan-

tanti fiat , ut indè ^a Gal. subitam mortem Antipatro prædixerit ; nos tamen signum hoc non solum in pueris , & senibus , ut idem asseruit Galenus , sed etiam in juvenibus , & robustis frequenter nullo modo funestum observavimus , cum scilicet ex levi connutrito organorum vitio , vel ex hypochondriorum irritatione procedit , cujus forsitan indolis extitit intermittens pulsus illius *Æconomii* , quem ipse ^b Gal. , tanquam famum , ad consveta negocia ingenuè remisit . Et enim si sola pulsus intermittens hominem , benè cæteroquin valentem , detineat , adèdè optimos Medicos à subitanæ mortis præfagio dehortatur , ut potiùs eos in spem adducat , leve illud malum , antequam gravius evaserit , opportunè medelâ fore tollendum . Hujus veritatis ex me met ipso experimentum promam , qui , cum tria ante lustra pertinaci , mihiq; sensibili cordis contractione , indèque ortâ pulsus intermittentiâ , ex hypochondriorum consensu , per sexennium laboraverim , plùs in aliis , quàm in me ipso , diligens , & attentus , usu tandem rhabbari , chalybis , & juris vi-

pe.

^a 4. De loc. affect. cap. ult. & 3. de præfag. ex puls. cap. 4.
Pulsus intermittens non semper funestus.

^b De præfag. ad posth. cap. ult.

Proprium experimentum.

Quando periculi.

perati, perfectè convalui. Ut igitur intermittentia pulsus improvisæ necis certius omen esse possit, necesse est, ut jungatur omni inæqualitatum generi, palpitationi, anhelitui, aliisque similibus pectoris passionibus, de quibus infra.

Pulsus tarditas quando exitialis.

IV. Pulsus utique tarditas, si eadem, singulis ictibus languidè recurrens, alterius pulsationis intermedium tempus ferè totum pertinaciter absumat; probabilius exhibet inopinatæ mortis indicium; præsertim si patiens debilis, ac senex fuerit, ut sæpe nos experti sumus. Etenim quæcumque sit causa, scilicet vel simplex (quod rarè evenit) ex defectu animalium spirituum, in præcordia descendentium, vel mixta ex sæculento, minùsque mobili per cordis ventriculos sanguine; semper talis pulsus integram, firmamque ejusdem cordis paralytim, aliquando futuram, præmonstrare solet, maximè tempore somni, quo, instrumentis languidiùs pellentibus, idem sanguis (etiam subobscurè agnoscente^a Hippocr.) tardiùs movetur.

Indicium futuræ cordis paralytis.

^a De flat. nur. 20.

V. Secundò palpitatio cordis ipsa quoque subitæ mortis fit prænuncia, si fue-

fuerit frequens, si magna, si cum anhelitu, animi deliquis, omni genere inæqualitatum pulsus, tandem si æger congruâ vitæ ratione minimè utatur. Etenim, si hæc symptomata magnâ ex parte simul conspiraverint, significatur, magnum quoque dari vitium in corde, aut summis vasis, cui accedente aliquâ causâ procatarteticâ, nullo labore, motus ipsius cordis, & sanguinis ex tempore lethaliter sistitur. Quemadmodum verosimile est, Galenum, jis admonitum indicis, toties decantato Antipatro improvisam, quam postea subijt, mortem prædixisse.

*Cordis palpitatio pernicio-
sa, qua.*

VI. E contrario autem, si palpitatio oriatur ex causâ, cordi obstinatè nequam adjunctâ, sed cum fluidis circulante, ut plerunque esse solet acerrimus ichor, vel quidquid aliud, quod ad irritandas cordis fibras, planè fugitivum, pertingit; rarò abrumpendam illico vitam minitatur. Multos propterea novimus, qui à recurrentibus palpitationibus, evacuatâ copiâ stranguriosæ urinæ, penitus liberati fuerunt; è quibus Illustris. Præsul Bonaventura, SANC-
CTISS.

*Quænam vi-
ni periculo-
sa.*

*In his urina
stranguriosa
salutaris.*

CTISS. D. NOSTRI intimus Cubicularius, & Eleemosynarius, splendore Generis, & propriis virtutibus, laudatissimus. Latex porrò salino-acer; ab hypochondriis maximè redux, ita interdum cordis musculos convellit, ut strangiosum veluti transitum sanguinis per ejusdem ventriculos cum palpitatione producat. Multos itidem vidimus, quos prævus ad podicem decubitus, vel gravis podagra à lethali cordis palpitatione vindicarunt.

Abscessus ad podicem, & podagra liberant à palpitatione.

Diuturnus cordis dolor in senibus subitâ mortem significat ex Hipp.

VII. Dolor similiter cordis, præsertim in senibus, sæpiùs recurrens, inopinatam necem solet indicare, juxta illud Hippocratis in Coacis: *Cordis dolor, seniori sæpius consuescens, repentinam mortem significat.* Vel enim fumatur hæc passio pro molestâ ipsius cordis, & orificiorum ejus sensatione, vel pro affectione ventriculi, quæ secum trahat ipsum cor, & Græcis cardiogmos vocatur; utroque sanè modo res est subitanei periculi plena, præsertim apud senes. Invisimus olim Virum, cui, cedente jam podagrâ, atrox cordis dolor identidem recurrebat; is repentè, abortâ suffocatione, circa
aqui-

æquinoctium , sublatus est . Similem offendimus historiam apud ^a Hollerium cujusdam septuagenarii , cui dolor iste coepit esse frequens cum angustia spiritus , & suffocationis periculo ; is etiam , domum rediens , repente obijt .

VIII. Neque dubitandum , quin dolor ventriculi , cardiogmos dictus , sæpeque rediens , si ex summopere pravis humoribus , in ægro delitescentibus ; oriatur , inopinatae mortis unà simul causa , & signum esse possit : rectè siquidem admonebat ^b Hippocrates jis verbis : *Oris ventriculi dolor cum præcordio distento , & capitis dolore , malignum , & quidpiam anhelosum . Nam ji repente moriuntur , velut in Dysode .* Significatur enim , in eo corpore liquida eousque acria redundare , ut veneficam naturam induerint . Etenim , quemadmodum arsenicum , sublimatum , aliaque hujus generis venena , villos , & fibras erodendo , convellunt ventriculum , & cor , ac propterea citam necem inferre solent ; ita multò faciliùs , ac celerius ingenita ista venena aliquando interimunt ; nimirum quia , interiùs collecta , & naturalibus

^a In Comm.
1. lib. 3. coac.
sect. a. coac.
17.

^{Idem porren-}
^{dis cardiog-}
^{mos .}

^b lib. 1. præ-
dict. n. 9.

^{Hipp. aucto-}
^{ritas , & ra-}
^{tiones addu-}
^{cuntur .}

P

flui-

fluidis recenter admixta , expeditiùs per canales quaquaversum feruntur . Quorum fanè veneficorum succorum præ-nuncia signa existunt dolor ventriculi , ad præcordia propagatus , cum distensione , & anhelitu , pertinaciter , atque identidem recurrens . Confer huc quæ scripsimus cap. v i i . hujus libri .

IX. Tertio , inter signa futuræ mortis improvisæ , illud nostris , aliorumque experimentis magis certum , comprobatumque est prælagium , quod Hippocrates in hanc sententiam exponit . *Qui*

a 2. aph. 41.

In animi deliquio, ut subita mortis sit prælagium, tria requiruntur.

frequenter, ac fortiter, sinè causâ manifestâ, delinquant animo, repentiè moriuntur. Ubi una est omnium Commentatorum , ad usque Clarissimum Lucam Tozzium , sententia , ut , pro veraci hujus prognoseos exitu , tria simul jungantur ; primò , ut frequenter ; non enim satis est , aliquem semel dumtaxat in anno viribus cecidisse ; secundò , ut fortiter , nempe usque ad syncopis confinium ; denique , ut id absque causâ manifestâ , hoc est obviâ , & externâ , contingat . Ita enim significatur , magnum , fixumque aut cordi , aut finitimis partibus hærerè

ma-

malum , quod , motum præcordiorum , & sanguinis penitus tollens , subitam necem aliquando sit illaturum . Etenim non rarò in corde , quod passim etiam in reliquis muscularibus partibus , accidit , ut modò pauciores , & laxæ , modò numero , ac vi majores fibræ , vasaque influentia , & refluentia cum congruâ proportione , aut sinè eâ ad suam integrandam structuram concurrant ; profectò in istis casibus , fortissimus musculorum (ut cor ab ^a Hippocrate appellatur) ad naturales systoles minori , vel ^{n.4} majori , quàm par est , vi erigitur ; unde talis orta imbecillitas , vel extraordinarium robur , non solùm tempore contrahit morbos , quibus ad frequentes , fortesque animi defectiones , subitæ mortis prænuncias , deducitur ; sed homines vel nimium timidus , vel nimium audaces potissimum constituit : quorum sanè priores , utpote maximè pusillanimes , improvifum , ac vehemens pathema sæpe dejicit , ac prosternit ; eò quidem facilius , quò animi passio inceptum , occultumque in præcordiis malum , veluti pessimam interitus radicem , inveniat .

*Cordis robur ,
aut imbecillitas sæpe timoris , aut audacia causa .*

X. Quartò cùm nulla frequentior sit via, per quam repentè de medio tollantur homines, quàm larga profusio sanguinis intrâ, vel extra corpus; idcirco secura etiam, & certa repentinæ mortis indicia à Medico peti poterunt ex signis, quibus docemur, imminere rupturam summorum vasorum in thorace, utero, intestinis, hæmorrhoidibus, aliisque internis sedibus. Sed inter signa non dubia properæ mortis in hæmorrhagiis, illud sanè est, quod tradidit Hippocrates in Coacis, inquit: *Si quibus sanguis effluxit; rigor superveniat, & ulcera maligna sint; ji, vel loquentes, inopinanter moriuntur*. Hoc passim in vulneribus capitis, in carcinomatibus sanguifluis, aut malignis aliis ulceribus usu venit, scilicet ut, cùm ægri, post hæmorrhagias, rigore corripuntur (dissipatâ dulci, ac volatili sanguinis parte, & fermento quodam acri, ac penè venefico ad præcordia, & cerebrum reassumpto) subitò vitam deserant.

In hæmorrhagii mori inopinata quando, ex Hipp. a. Juxta divisionem. Holler. lib. 4. sect. 2. coac. 3.

Frequens cadaveri scellio ignotas aliquor subita mortis causas detexit.

XI. Enimverò, postquam frequentiora reddita sunt humanorum corporum extispicia, quibus Antiqui, præ horrore, par-

parciùs utebantur, nobis clarè innotuit; multos, qui ex tempore moriuntur, internis aneurysmatibus, aut varicibus laborasse. Certissimum propterea follicitæ necis signum deducemus ex semejotica varicum, atque aneurysmatum, quæ paulatim ad talem, tantamque exilitatem sanguinea vasa redigunt, ut aliquando, momento temporis, disrumpant. Et quidem hîc loci dissimulare non possum, sæpe experimentis comperisse, aneurysmata illos potissimum ægros inopinatò interficere, qui minùs continentem, frugalemque vitam ducunt: eos verò, qui parcè, sobriè, continenterque vivunt, aliud morbi genus, ac lentus, ut plurimum, subortus hydrops, longo cum agone, solet interimere. Quare Medicus, etiam, juxta ægrorum mores, ac vivendi consuetudines, judicia sua prudenter disponat, & proferat.

Interna aneurysmata ut incontinentes subitò, ita sobrios lentè interficiunt.

XII. Quintò, ex habitu athletico, nulli dubium erit, quin repentinæ quoque mortis indicia defumi debeant, quoties athletæ, non solum bonum habitum finè morâ, juxta^a Hippocratis præceptum, minimè solverint, anticipantes humo-
rum

Athletis quâdo idem eveniat.

^a p. aph. 3.

rum diminutione discrimen ; verùm etiam lautâ mensâ , somno , atque otio pleniùs saginentur : quem sanè pleniorẽ , & coloratiorem corporis habitum jure suspectum bonum appellavit ^a Celsus. Etenim athletarum plenitudo , cùm ad summum devenerit bonitatis , duplici viâ citam mortem minatur , tum quia vasa intus , forisque infarcit , ac premit , spatiumque propterea fluidorum motui , ac miscellæ aliquando penitus aufert ; tum vel maximè , quia eadem sanguinea vasa dirumpit , ubi minor illorum resistentia , vel major sanguinis impetus occurrit . Unde ad rem scripsit ^b Hippocrates : *compressus sanguis suâ copiâ , quâ maximè compressionem fecerit , venas perumpit .*

XIII. Ad hoc ipsum genus signorum refertur etiam obesus , ac nimium pinguis habitus , de quo sanè idem locutus est ^c Hippocr. , dum inquit : *qui naturâ admodum crassi sunt , citiùs intereunt , quàm graciles .* Si enim vasa omnia , propter nimiam pinguedinem , ita habent compressa , atque exilia , sanguinemque propter volatiliũ spirituum penuriam , ad eò lentescentem , ut ejusdem circulatio , mini-

^a Lib. 3. c. 3.

Duplex mali
eventus cau-
sa.

^b lib. de flat.
n. 17.

^c 2. aphor. 4.

Obesi cur re-
pentinam mor-
tem præ graci-
libus incur-
rant.

nimo interdum negotio, repentè interceptiatur. Quorum exempla nemo Medicorum propriis experimentis plura non congeffit, præter innumera, quæ passim à nostris Collectoribus referuntur; ut in jis commemorandis tempusterendum non sit. Illud tamen prætereundum nobis minimè videtur, in hujusmodi athletorum, pinguiumque habitu, tunc præcipuè subitam mortem à sedulo, doctoque Medico divinari posse, cum apparuerint faciei, & oculorum color mutatus in lividum, respirationis difficultas, cordis angor, motuumque impotentia, veternus, aut vertigo. Si plura circa signa repletionis habere cupis, adire poteris ^a Marsil. Cagnat.

*His imminens
mors unde di-
gnoscatur.*

XIV. Tandem non aspernanda venturæ ex abrupto mortis indicia colliguntur ex suppressis criticis evacuationibus, aut decubitibus tum sanguinis, tum fluidorum quorumcunque à sanguine secedentium. Etenim sæpe accidit, ut vitiosa fluida, vel reassumpta, vel non ultra propulsa, lethaliter subsistant in cerebro, & præcordiis. Pauca hinc sub exemplo sumamus.

^a Lib. 1. de
sanit. tuen.
cap. xx.

*Crisis suppressa
ubi subita
mortis prænu-
cia.*

XV.

XV. Puerperam improvise decessuram penè tutò poteris pronunciare, si, pravis humoribus redundans, interdum præfocetur, lochiaque, odorum olfactu, continvò introrsum revocentur; ad cor enim subitò resiliunt, & ad cerebrum ascendunt; atque utrobique lethiferam stationem inducunt.

*Hæmorrhoides
item sensu sup-
pressa.*

XVI. Simili prognosi uti poteris in suppressis hæmorrhoidibus apud senes, qui illarum fluxui assveverunt, si capitis gravitate, ac vertigine, vel cordis oppressione, aut lipothymiis post siccitas mariscas diù tentati fuerint, eoque maxime, si vini, lactisque abusus ad necis causam accedat.

*Phtisici
quale æquino-
ctium lethife-
rum.
a 3.aph.10.*

XVII. Improvise pariter moriuntur phtisici, quoties circa æquinoctium, præsertim ^a autumnale, pus per anacatharsim non amplius excernant.

*Variolarum
retrocesso quæ-
do mortalis.*

XVIII. Si variolæ, ac morbilli, cum inter secundum, ac tertium stadium versantur, pertinaciter retrocedant, ægerque in lecto jactetur; illum inexpectatò moriturum poteris prædicere. Non absimili quidem præfagio utere, cum in ægro, cæteroquin languido, & cholera hu-

que machina, de suo sensim robore remittens, omnia œconomix animalis, ac potissimum secretionum munera languidè exercet, quibus penitus deficientibus, tandem mors obrepit. Unde non ineptè^a Roder. Castren. — *Clauditur fonticulus, quia homo est morti proximus; non est homo morti proximus, quia fonticulus clauditur.*

^a In suo syn-
tag. prædici.
part. I. cap. 6.
particul. 4.

*Interdum sunt
causæ simul,
& signum.*

XX. Sunt verò causa simul, & signum propter necis suppressæ illæ evacuationes, quæ non copiâ tantum, sed deleteriâ mixturâ egerebantur: hæc namque, cum intrâ corpus subsistunt, in aliquam, jam ante debilitatam, partem majoris usus decumbunt, ocysimumque exitium plerunque portendunt. Neque interim Lectores tædeat, nos adeò inculcare, ne Medici ex tempore præsagia sua effutiant; non enim semper, ubi consuetæ restiterint evacuationes, subitus morbus ingruit; interdum lentus inducitur, qui longo etiam cum agone viam sternit ad interitum.

De

*De signis improvise mortis à cerebro , nervis ,
& liquido animali.*

C A P U T XX.

ETiamsi supra meminerimus multorum signorum , quæ ex peperam operantibus instrumentis facultatis animalis improvise mortem præmonstrant ; de his tamen plura nunc , & apertius dicere constituimus ; cum clarius ea doceri , atque intelligi soleant , quæ suo stant ordine distributa , quo confuso , etiam disciplinarum peritura sint omnia.

Ordo est anima disciplinarum.

II. Primum itaque capitis , & nervorum affectiones , quæ fortem apoplexiam minantur , clandestinam etiam necem plerunque prænunciant . Hæc tamen præfagia , ut exitu comprobentur , non quibuslibet levissimis etiam cerebri symptomatibus niti debent , sed valide fundari in cumulo , & congestu causarum , passionum , & circumstantiarum , quæ omnia syndromen signorum constituunt . Aggregatur verò ista syndrome primò ex ætate ipsius ægri , quæ à qua-

Ad improvise mortem ex cerebro præfagiendam signorum syndrome requiritur .

1. ex Ætate.

^a 3. aph. 31.
& 6. aph. 57.

2. Ex alicujus
evacuatiōnis
suppressione.
^b 6. epid. sect.
3.

dragesimo quinto per totum ^a senium excipiendis syderationibus aptior esse solet. Secundò ex suppressâ evacuatione hæmorrhoidum, ^b fistularum, herpetis, mucinarium, & consimilium: quæ quidem evacuationes, ac decubitus, sicuti cum vigent, multorum sunt medelæ morborum, ita cum spontè, vel arte in senibus potissimum sanantur, facili negotio fortem inducunt apoplexiam, quoties in cerebro talem vasorum, ac fibrarum imbecillitatem inveniunt, per quam plus liquidorum accipiat, quam remittatur.

*Exemplum
fortis apople-
xiæ, orta ex
suppressione hæ-
morrhoidibus,
& herpete.*

III. Hujus rei evidens habuimus exemplum initio Novembris 1707. in Illustriss. Præsule Josepho de Totis R. Fabricæ S. Petri Œconomo, sexagenario majori, hypochondriaco – melancholicis affectionibus à prima juventute vexato; qui, cum militari circa regionem ossis sacri herpete, atque ichoroso hæmorrhoidum fluxu diù juvatus fuisset, ætate magis declivi; primùm herpete, deinde hæmorrhoidibus destitui cœpit, sensimque deterius habuit; ita ut, decursu postremæ ætatis supra modum sitiens, immodicè

dicè biberit , simulque propter nocturnum æstum , nisi planè nudus , somnum capere non potuerit . Deinceps circa æquinoctium autumnale intensioribus studiis exagitatus , multas noctes vigil transegit , indèque , pravo vultus colore contracto , animi deliquiis (quibus aliquando etiam antea correptus fuerat) identidem per inæqualia intervalla , ac tunc præcipuè , cùm vel minimum in incessu ascenderet , anhelans tentabatur . Tandem in febrim , specie rheumaticam , quam tamen prava comitabantur symptomata , incidit ; aderat enim lingua subobscura , atque arida cum sapore austero amaricanti ; aderat coryza , fitis , hypochondriorum tensio , vigilia . Sed aderat præ cæteris tum assidua pulsatio intrà cranium sub lævo osse petroso , cum recurrentibus infernorum artuum doloribus , injussisque contractionibus , tum revertens lipothymia , cùm primùm supra cubile sedere vellet . Urinæ interim erant claræ , & solito pauciores . Cùm verò ita se res haberent , jubet à SACRATISS. PONTIFICE illum invisere ; apud quem inito consilio

filiò cum Excellentiss. D. D. de Paulis , & Saxio , de futurâ , præcocique morte statim dubitavi . Quod sanè circa XXI. diem à principio febris eventu comprobatum vidimus ; Præsul enim , fortissimâ correptus apoplexiâ , brevè decessit .

Diffusio cadaveris .

IV. In ejus mox cadavere decem lapides intrâ cystim felleam fusci coloris , & figuræ pyramidalis detecti fuerunt , qui aquæ , & vino subsidebant , aceto innatabant . Pylorus contractus . Cor mole magnum , & nigro cruore plenum tam in auriculis , & ventriculis , quàm in summis venis , & arteriis . Pulmones admodum infarcti . Secto cranio , tendines laterales sinuum duræ matris in quatuor ossa induruerant , quorum duo asurgebant figuræ triangularis , reliqua ovalis ; singula verò instar ossis cribri-formis foraminibus referta occurrerunt . Pia mater crassa , & concretæ lymphæ copiâ admodum gravata . Cerebri cortex solito pallidior . Prominentiæ tertii ventriculi aliquantò solidiores . Plexus choroides mirè adhærebant anterioribus ventriculis , ut indè non nisi magnâ adhibitâ vi divelli potuerint . Denique copio-

piofæ suffufio lymphæ circum glandulam pinealem, & cerebellum.

V. Hinc verò non ægrè deduci potest, impurum illud sulphur, & fal acre, quæ olim phlegmate diffoluta, vigentibus in Præsule, quâ solidorum, quâ liquidorum viribus, utiliter cuneabant, diducebantque loca prope coccygem, sensim detrudi, ac veluti despumari prohibita fuisse propter vitium tum sanguinis, suo paulatim oleoso-volatili spiritu depauperati, tum ipsorum canalium, peristalticis motibus minùs, quàm par est, polentium. Retenta verò, & multiplicata in vasis impura ista corpora, primùm, irritando, sitim, æstum, & vigilias, deinde, inducendo in fluido universali fermentationem, & vitiando liquidi nervorum crasim, febrim specie rheumaticam, sed indole penitus malignam, cum nervorum contractionibus, excitarunt; donec tum lymphæ, tum sanguis ex crasso sulphure, & auctis exoticis salibus densiora facta, in cerebro, & præcordiis repente substiterunt, fortissimamque induxerunt apoplexiam.

VI. Sed ad rem nostram redeamus.

Ter-

*Etiologia morbi, & mor-
iii.*

3. Ex præviis
capitis, &c.
affectionibus.

Tertiò ex præviis capitis, & nervorum affectionibus apoplexiarum prognoses sunt desumendæ; rarò enim fortè apoplexiâ quisprehenditur, nisi horum præludia symptomatum præcesserint. Hæc autem sunt dolor, gravitas, atque imbecillitas capitis, memoriæ jactura, in somnum proclivitas, vertigo, cœcitas, membrorum torpor, & præ omnibus, leves, quæ antevenerint, apoplexiæ: eæ namque in fortem, ac subitò interimentem tandem desinunt.

Exitiose apo-
plexia quo sty-
pore potiss.
mùm contin-
gans.

VII. Et quoniam Hippocrates vult Medicum adèò in divinando peritum, ut non solum ipsam mortem, sed illius etiam tempus prælagire noverit: idcirco sciamus, oportet, apoplexias, ocysimè interimentes, non tantum circa æquinoctia, sed etiam circa solstitia frequentissimè contingere, ut aliàs monuimus. Quare per hæc tempora eas divinare poterimus, ubi signa præcurrant; & constitutio aeris fuerit inæqualis, pluvia, aquilonaris, & australis; aut æger utatur parùm laudabili vivendi normâ, ac præcipuè insalubrium ciborum, & vini sit appetentior. Atque hinc senes utriusque se.

fexus, quoties ex cerebri, nervorumque decubitu cœci evaserint, & post hyemale solstitium, inter ipsas noctistenebras, sibi ignem, aut splendorem identidem videre videantur; ji quidem facilè, cùm sol in taurum ingreditur, forti apoplexiâ correpti, repenti decedunt. Significatur enim, magnum jam tremorem, pressionemque ad thalamos nervorum opticorum, & partem medullæ cerebri post illud solstitium inductos fuisse, quibus ob respondentem quadraturam, longè major, immo maxima, & violentissima distractio, & pressio succedere solent, quæ, præsertim ad cerebri circumferentiam simul, & centrum in senibus factæ, brevissimè necant. Hujusmodi verò prædictiones, ex observationibus medico-astronomicis deductæ, non Artem modò, sed ipsos etiam Artifices illustrent. Vide hujusmodi splendores tanquam malum omen apud ^a Hip., & ^b Hollerium.

VIII. Secundò, qui jam diù epileptici recursibus tentati fuerunt, indèque immemorem, languidam, ac melancholicam ducunt vitam, hanc sanè re-

R pen-

Senes quando evadant apoplectici, postquam noctu splendoris visse sibi videantur.

Medico-astronomica observatio ad præfugiendâ proficua.

^a v. epid. tex. 79.

^b Tom. 2. in 2. sect. coac. Hip. pag. m. 1094.

Ex epilepticis qui repenti pereant.

pentinâ morte claudere solent , rupto plerunque intrâ cranium vase sanguifero , post inductam supra cerebrum congestionem . Quare prudens , & sciens Medicus in jis casibus tutò fatalem improvisò diem prædicere poterit .

Capitis vulnera , &c. inopinatio enecantia , que .

IX. Tertiò , qui ex capitis vulneribus , aut contusionibus laborant (etiamsi in tuto esse imprudentioribus viderentur) si rigore corripiantur , brevi tempore decedunt . Significatur enim , factam fuisse sub cranio vasculorum rupturam , unde effusa liquida , dissipato per moram volatili , eâque ratione eversâ crassi , in acerrimam , & veneno similem naturam abjerunt , quæ tandem quaquaversum in nervorum principium , ac fines repentiè diffunduntur , mortiferamque convulsionem inducunt , in quorum cadaveribus ferè semper invenitur abscessus in hepate , cujus ætiologiam exhibemus in nostro ad Hip. Lib. de vulner. capitis Commentario .

In jis plerunque abscessus in hepate .

X. Hæc fanè , quæ tribus capitibus improvisæ mortis signa perstringimus , cæterorum indiciorum , etiam illorum , quæ ex animo veniunt , exemplar esse pos-

possunt , ac documentum , rati , oportere , Medicum ita prudenter in hoc negotio se gerere , ut , si non semper verè divinet , saltèm non sæpe fallat . *Certitudinem namque exactam in Medico* , ut ait ^{Medici prudentia in ferèdâ prognos.} Hipp. , *rarò videre contingit* . Unde laudaverim , ut quis potiùs à prædicendo se abstineat , quàm imperitiam suam palam ostendat . Turpe siquidem est , illum , quem improvisò moriturum pronunciamus , vel evasisse , vel lento morbo decessisse .

^a de vet. med. n. 16.

Agitur in genere de metodo præservandi à subitaneis mortibus .

C A P U T XXI.

Post signa proximum censemus de præservativâ methodo subitanæ mortis verba facere . Etenim , ut homo graviùs ; ac frequentius brutis animalibus ægrotat , atque idcirco , pluribus inventis , excogitatisque pharmacis , huic infortunio medetur ; ita , cùm crebriùs quoque improvisæ ne-

R 2 ci,

ci, ex internis causis ortæ, sit obnoxius, rationi consonum est, ut subitaneum diem aut penitus declinare, aut saltèm pro viribus studeat retardare.

II. Scio, apud Ethnicos antiquissimum fuisse problema, quodnam genus mortis, lentæ ne, an verò subitæ hominibus fuerit exoptandum? ac proinde ^a Jul. Cæsarem pridie ante mortem, cùm apud Marcum Lepidum cœnaret, hoc moto sermone, omnes antivertisse exclamantem, *inopinatum*. Sed o fallacia hominum desideria! o votum inane, & punitum! Ipse siquidem Cæsar proprio didicit experimento, omnium pessimam esse necem inopinatam, quippe quæ neque ipsi cum indolentiâ contigit, ut fortè putabat, neque sinè contumeliâ. Nos verò, quorum mentibus in tantâ causarum obscuritate Deus Opt. Max. altum, æternumque Fidei lumen immisit, illam multò magis mortem tum optimam opinari, tum salutarem optare debemus, in quâ (ut insignis pietate, ac judicio Vir Cardinalis Commendonus ^b ex D. Augustini sententiâ, dicere solebat) animum sensibus integrum morti com-

po-

^a Apud Plut. in Cæsare.

Inopinata mors à probo, et prudenti viro haud exoptanda.

^b Ex Gratian. in ejus vitâ lib. 4 cap. ult.

ponere , & Deum nobis per Christianæ
Disciplinæ sacra , piaculaque possumus
propitiare .

III. Quid ? quòd , si de folis humanis
foret consulendum , nobis certè nunquam
subitum , atque inconsideratum è vitâ
discessum concupiscere oporteret . Quis
namque adeò ferox inter commercia ho-
minum adolevit , qui acerbè , penitus-
que & suos , & sua oderit , ut ante mor-
tem testamenta conscribere , mutare ,
obsignare , dicere aliquid , aut reddere ,
si cui debet , ad patriæ , ad affinium , ad
sui denique tranquillitatem , pertinaciter
nolit ? Qui liberis consilia , amicis , ut
fecit Socrates , dare oscula negligat ? Ti-
meamus itaque , quantum humana ,
quantum sunt æterna æstimanda , timea-
mus , inquam , inopinatam , subitamque
mortem ; Deumque propterea Univer-
salis Ecclesiæ vocibus enixè precemur ,
ut nos ab eâdem pro immensâ suâ beni-
gnitate tueatur .

IV. At nostri suscepti memores insti-
tuti partem esse , putamus , diligenter ex-
pendere , quâ methodo à causis hujusmo-
di interitus solerter declinemus .

V. Enim-

V. Enimverò daturi methodum præservandis improvisis mortibus, quæ ab internis causis dependent, initio admonemus, hanc normam per Medicos unicè derivandam esse ab hygiene, & therapeiâ illarum affectionum, quæ in aliquem ex subitaneis morbis possunt transire, unde ægri repenti decedant: propterea quicumque studiosè legerit Capita superiora de signis, certè non obscurum tenebit principium, à quo hujusmodi præcautionis discrimina desumenda veniunt. At quoniam innumeræ, ut exposuimus, existunt nostrorum corporum affectiones, quæ subitam mortem inferre valent; idcirco sapiens, oportet, expertusque sit Medicus, ut consilium, unicuique congruum, adhibeat. Sed cum adhuc nonnulla in genere demonstrari possint, ea nunc summatim exponere non omittemus.

Corpora improviso fato subjecta nunc tanquam sana; nunc velut ægra consideranda.

VI. Corpora, improvisis hisce casibus subjecta, vel sunt aspectu sana, vel evidenter ægra. Ab hac verò universalissimâ divisione mihi petenda videtur præcipua partitio methodi præservativæ. Et quidem, ut de utroque membro divisio-

fionis absque ullâ confusione differamus; Sit

*Quâ methodo præservanda sint corpora
aspectu sana.*

C A P U T XXII.

Corpora, quæ tanquam sana nostros incurrunt in oculos, & summâ nihilominus cautione egent, ne inopinatò diem suum obeant, tripliciter considerari possunt; primò cum nimiâ plethorâ, seu cum athletico habitu; secundò cum nimiâ obesitate, & corpulentâ; tertio cum nimiâ animi imbecillitate.

II. Primò corpora athletica, cùm ad summum bonitatis devenerint, juxta ^{a a p. aph. 3.} Hippocr. effatum, statim solvenda sunt, celeri adhibitâ phlebotomiâ, dietâ, vini ^{Athletica quomodo præserventur.} abstinentiâ, atque corporis exercitatione. Etenim athletæ (ut Plinius ajebat de Lunâ, quæ orbe pleno, repentè per eclipsem est nulla) propter nimiam partium foris, intrâque canales plenitudinem,

*Hi quando
imperanda ex-
ercitatio.*

nem , repentinâ interdum morte eclip-
fantur ; ac proindè solâ juvantur dimi-
nutione quantitatis sanguinis, ac subtra-
ctione molis, qualitatisque alimentorum,
& potuum , ut hâc ratione , si quid re-
liquum extremis vasis hæret impactum,
motu corporis dissolvatur, remisceatur,
atque, in gyrum actum, majori denique
parte transpiret. Neque porrò apud istos
exercitatio procuranda est priùs , quàm
vasa depleta sint, & diminutum alimen-
tum ; ne illud idem , quod in præcautio-
nis auxilium inducitur , improvisam
mortem disruptione vasorum acceleret.

*Stomachus
validus mor-
bosâ plethorâ
fomes.*

III. Sed omnis certè prophylaxis hi-
sce in corporibus inutilis evadet, nisi al-
tior quædam plethoræ radix optimè co-
gnoscat, & parumper debilitetur. Hæc
autem illa est , quâ sani homines tanto-
pere gaudent , stomachi nimirum vali-
ditas ; unde non levis apud eosdem pec-
candi in ratione victus fiducia, atque in-
citatio proficiscitur. Ji enim cibos non
modò nimios, sed absque ullo delectu in-
gerunt, citòque in chylum conversos in-
trâ sanguiferos ductus transducunt. Sed,
cùm non æquali proportione transpi-
rent,

rent, necesse est, ut illorum vasa impleantur, dissilitura plerunque, cum plus æquo distracta fuerint. Sciant igitur qui bono, validoque sunt stomacho, præfertim si, extra adolescentiam positi, studiis incumbant, hostem intrâ se gerere, qui, nisi accuratè caverint, improvisæ morti causam aliquando præbebit. Etenim si, quoties se motibus non exercent (hoc autem diligenter notandum) modico egent cibo, tanto scilicet, quanto dumtaxat opus est ad reparanda fluidorum dispendia, quæ non multa impenduntur in illorum transpiratu solidorum, quæ motui aeris, sanguinis, & liquidi nervorum tantummodo inserviunt: minimum enim est, quod à penè quiescentibus istorum artuum musculis, & succutaneo organo insensibiliter perspirat.

*Ab exercitio,
& ætate cibi
indigentia de-
finienda.*

*Quanam par-
tes, & cur mi-
nis perspirent
in seffilem vi-
râ ducentibus.*

IV. Neque verò in alimentorum, potuumque genere ulla unquam securior, pro tuendâ valetudine, inveniri potest via, quàm quæ indicatur à ^a Sanctorio, & sequenti aphorismo perstringitur. —

*a In sua Sta-
tica sect. 3.
aph. 35.*

Illa cibi quantitas est saluberrima, dum à cibo corpus suis negociis eadem agilitate vacat,

*saluberrimum
Sanctorii præ-
ceptum.*

S

ac si

ac si esset jejunum. — Hoc autem consilium opportunum est non pro solis plethoricis, sed pro alio quovis habitu, qui sanus, atque incolumis servari cupiat. Falsò propterea homines de naturâ suâ vulgò queruntur, quòd ventriculi languore, atque imbecillitate afficiantur. His enim ipsemet morbus tum peccandi, tum se se interficiendi facultatem adimit; cùm, si semel horum quis cibo sive pravo, sive copiosiori, usus fuerit, statim erroris admoneatur. Hinc stomacho debiliores plerunque evadunt longævi. Ut præ cæteris insigne, ac vulgatum habemus exemplum in Celeberrimo Ludov. Cornaro, qui, solius adminiculo sobrietatis, prosperâ valetudine vixit ultra sæculum. Verùm longiùs fortasse progredimur, fallente nos cupiditate plethoricos habitus præservandi.

Debiliore stomacho cur plerunque longævi.

a In ejus vitâ à semetipso descriptâ.

V. Deinde obesa nimium, & pingua corpora à repentino mortis periculo tuentur primò ea omnia, quæ tollunt plenitudinem lymphatico-pinguem viscerum, vasorum, & carniùm; cujusmodi sunt epicraticæ purgationes cum pilul. tartar., aloeticis, de ammoniaco, & simi-

Epicratica purgatio quam plenitudinem adimat.

milibus ; secundò , quæ benignè dissolvunt residuam mucosam , viscidulamque fluidorum partem , eamque potissimum per urinam derivant ; nimirum terebinthinata , oxymel. scill. , acidulæ etiam Plura obesi proficua remedia. aluminosæ ; dummodo tamen homo ætate sit vigenti , ac juvenili , quem in senium accipiendus est ^a Timæus , cùm in obeso corpore hujusmodi aquam proficua observavit ; tertio parca victus ratio , quæ partem detrahat ciborum , præfertim humidorum , eisque substituat mediocriter exiccantia , atque aromatica ; quartò ea , quæ ab ipsis carnibus perpetuò demulgent ichores viscidos , ut frictions , & fonticuli ; tandem accurata , & nunquam intermissa corporis exercitatio , per quam fibræ musculares , supra vasa , & supra glandulas validè nitentes , humores urgent , comminuunt , volatilizant , aptosque reddunt ad diuresim , ac diaphoresim , quæ quidem sunt viæ , per quas sanis in corporibus ea recrementa secedunt , quibus collectis , præcoces morbi , mortefque sæpe accersuntur .

VI. Denique illi homines , qui , quan-

S 2 tum-

Timidi quomodo præcauendi.

tumvis corpore fani videantur , animo tamen ægrotant , cujusmodi sunt extra modum timidi , ac pusillanimes , saluberrimum præcautionis consilium inuenient , si ipsi se , & alii illos tueantur à subitis , atque improvisis gaudii , aut timoris occasionibus . Etenim cum hujusmodi corpora fortita sint cerebri , & præcordiorum fibras cum tono minimè resistenti , seu maximè languido ; idcirco prudenter fugere debent ea omnia pathemata , quæ improvisam , validamque in cerebro excitant ideam lætitiæ , vel timoris , propter quam alterantur diametri vasorum , perturbatur motus sanguinis , nec non rhythmus undarum fluidi animalis per nervos , præsertim in præcordia ; ac proindè subvertitur motus cordis , & totius sanguinis , non sinè evidenti discrimine integræ dissolutionis ipsius vitæ , quæ cum perenni , ac regulari motu istorum præcipuè fluidorum per corpus circumagitur .

De

De methodo præservandi à subitaneo interitu corpora valetudinaria.

C A P U T XXIII

NON arbitror in id mihi studium incumbendum, ut sub isto capite exponam singulas præservandi rationes, petitas ab omnibus singillatim morbis, qui ægros in subitas neces possunt adducere; immensam enim, ac penè infinitam rem imprudens tentarem: cùm quilibet Medicus ex particulari uniuscujusque morbi pathologiâ, ac therapeiâ (ut cap. XXI. inuimus) methodum, ac remedia præservativa ex se ipso copiosè ducere valeat. Quæ enim factum jam morbum tollunt, plerunque antefacta prohibent. Hinc factis scitè scripsit ^a Hip. *Decubitus quidem, in quibus facta tollit, hæc ante facta prohibet.* Dicemus itaque breviter, ac veluti per genera, ut, signatis quibusdam quasi sedibus, Practicorum memoriam juvemus.

II. Et quidem, ut hîc etiam loci congruum ordinem sequamur, considerabimus, ex hujusmodi valetudinariis cor-

po-

^a 6. epid. sect. 3. tex. 36.

Ex valetudinariis alii interitum, alii ex-teritum agrotant.

poribus alia interiùs, alia exteriùs ægro-
tare, juxta quam divisionem prophyla-
cticas medelas apertiùs inveniemus.

III. Inchoantes verò ab internis mor-
bis, quanquam isti variis modis invicem
permisceantur; immo rarò malum ul-
lum sinè complicatione prorogetur; at-
tamen quò clariùs, ac firmiùs medela-
rum notiones Curantium animis hæ-
reant, operæ pretium censemus in re
præsenti generales tum ipsarum ægritu-
dinum, tum remediorum ideas omnino
distinctas tradere, quas Medicus pro suâ
deinde prudentiâ in particularibus casi-
bus facilè componet.

*Triplex affe-
ctionum genus
valetudina-
rios ad subitû
interitum di-
sponit.*

IV. Præternaturales affectiones par-
tium majoris usus, quæ homines valetu-
dinariorum detinent, tandemque repenti-
mè possunt occidere, ad tria præsertim ge-
nera reducuntur; primò ad lentas corro-
siones; secundò ad pertinaces convulsio-
nes; tertio ad congestiones. De singulis
seorsum agemus, etiamsi corrosio spas-
mum, spasmus congestionem, & è con-
trario, vel perturbato ordine, singulæ
singulas inducant.

V. Lenta corrosio internorum sangui-
fe-

ferorum, sive aneurysma sit, sive varix, utpote frequens causa inopinatæ mortis, meritò omnium prima se nobis offert perpendenda: utra enim sit, cùm alicubi integrum tollit membranarum repagulum, illico transversam, deterrimamque sanguini viam intrà cavitates aperit, morteque perimit improvisâ.

Primum est internorli sanguiferorli septa corroso.

VI. At verò, ut plura simul completamur, illud, præ omnibus, hisce in casibus valere, censemus, quod proponit ^a Hipp. in pectoris, ac pulmonum varicibus, quarum sub nomine aneurysmata comprehendere videtur; inquit sanè. *His confert, si circa exordia curandos susceperis, ut manuum venæ relaxentur, Et victus ratione utatur, ex quâ siccissimus, Et maxime exanguis evadat.* Neque certè diuturna praxis ullam tutiorem præservandi methodum nos edocuit, quàm si hujusmodi ægri, post parcas inter initia phlebotomias, in vivendo sint continentes, abstinentesque. Plures idcirco novimus religiosos Viros, qui præcordiorum aneurysmatibus correpti (^b ut superius obscurè indicavimus) propter accuratum vitæ regimen ad ultimum usque se-

^a Lib. I. de morb. n. 10.

Varices pro aneurysmatib; accipit Hipp.

Horum prophylaxis ex eodem.

Autoris exempla.

^b Cap. 19. n.

4. Sobrietas, & moderatum exercitium jisdem prodest.

fenium pervenerunt , ac nonnisi ex lentâ tabe , vel hydrope paulatim decesserunt . Contra verò quotquot istiusmodi mali genere divexati , genio , & gulæ indulserunt , vel immoderatis motibus corpus exercuerunt , omnes repentinâ morte ad sepulchrum festinasse , recordamur .

*Experimenta
ratione com-
probantur .*

VII. Nostris porrò experimentis ratio non dubia suffragatur . Etenim is , qui varietate utitur , ac multitudine ciborum , potuumque , necesse est , ut multum indè sanguinem , variis etiam acredine pol- lentibus particulis refertum , ingerat . Is pariter , qui vehementibus tam aeris , quàm exercitationum motibus sese objicit (quoniam solida contra fluida , & vicissim fluida contra solida majori nisu impellit , & urget) necessariò , inceptam jam , vasorum corrosionem , ac distractio- nem promptiùs auget , ac perrumpit , quàm qui rectâ utitur , ac moderatissi- mâ ratione sex rerum nonnaturalium , & præsertim diætâ , quam tantopere lau- dat ^a Hipp. in ulceribus . Evidens sanè , si ab animantibus etiam discedamus , exem- plum præbent flumina , quæ , licèt ripam pluribus locis perruptam habeant , tamen

^a de Fract.
n. 29.

cx-

extra illam non diffluunt , neque in vicinos campos evagantur ; nisi cùm nova , magnaue accedat recentium aquarum copia , vel adversus ventus profluentibus undis vehementissimè obsistat , ac renitatur.

VIII. Quod de solis sanguineis vasibus hucusque protulimus , ad lymphaticorum quoque texturam debilitatam referri posse , non dubitamus . Etenim , si hujusmodi lymphaticorum vitium , in præcordiis , vel cerebro existens , teneat hominem , qui modicum cibum , & parcio-rem potum unà cum benignis vulnerariis usurpet , is plerunque consenescit , ac lentè quoque cum ipsâ vasorum ægri- tudine commoritur . Contra verò , si homo iste helluo fuerit , & bibax , magnâ , ocys- simâque subortâ feri intrâ ventres effusione , aliis etiam concurrentibus cau- sis , interdum occidit inopinatò .

IX. Pauca nunc addenda putamus de vulnerariis decoctionibus , quæ , cùm fati- tis , superque apud Medicos innotescant , longo sermone non indigent . Dicemus dumtaxat , illas , si temperatæ , nec admodum resinosæ fuerint , acre , quod in

*Quomodo lym-
phatica in præ-
cordiis , vel ce-
rebro debilita-
ta , ne brevè
disrumphantur ,
præcavenda .*

*Ex vulnera-
riis decoctio-
nibus quales
ad usum revo-
cande .*

T flu-

fluidis dominatur , facilè absumere , talemque sanguini crasim conciliare posse , per quam fibræ discissæ aut planè coalescunt , aut saltèm ab ulteriori plerunque vindicantur erosione . Quinimo quoties impendit periculum effluxuri è vasis magnâ copiâ sanguinis , ad fauciatorum , ut ajunt , anchoram erit confugiendum , scilicet ad opium ustum , ad fungum Melitensem , ad medicamenta ex vitriolo præparata , aliaque hujus generis , quæ , & sanguinis impetum , & vasorum laxitatem coercendo , futuram ex nimiâ hæmorrhagiâ improvisam mortem saltèm suspendunt . Sed Lectorem velim esse memorem illorum , quæ fusè disseruimus de non citò sistendis hæmorrhagiis cap. VI II. hujus Libri num. XI.

X. Rationem deinde præservandi à subitâ nece illos homines , qui pertinacibus convulsionibus detinentur (quam secundo loco tradendam posuimus) nemo proximè attingere , multò minùs complecti poterit , nisi priùs loca , & causas convulsionum accuratè distinguat . Etenim , si spasmodicæ passiones fuerint in stomacho , hypochondriis , vel

ute-

utero, pendentque à succis, ad subtile, & sulphureum acre exaltatis, eo in casu conducunt aquea, subacida, emplastica, balnea, ducchiæ, ferum, & lac. Quinimo ad antidota etiam recurrendum erit, ubi venenorum sit metus; quemadmodum, si dolores urgeant, ad moderata quoque narcotica, sulphur vitrioli, ens veneris, aut bezoarticum joviale. Si verò viscidulum sit fermentum, sed absque sup-
Ratio præservandi in spasmi, à materiâ subtili productis.
Ex materiâ viscida aliter tractandi.
 puratione, tunc oleosa cum fluidis, martialia, amara, myrrhata, & præsertim rhabarbarum, & cortex Peruvianus, cum specificis anthystericis, & antispasmodicis, mirè conferunt; eoque magis si vermes in discriminis causam venire cognoscantur; quo in casu etiam ad mercurialia tutò deveniemus.

XI. Inter specifica verò quisque Medicus ea deligit, diligitque, quæ sibi longus usus commendavit. Nostris tamen partibus hîc defecisse videremur, si, de antepilepticis, atque antiapoplecticis dicturi, id taceremus, quod non multos ante dies nobis rescire contigit.

XII. Eruditos serebamus sermones in Bibliothecâ Vaticanâ cum Doctissimis

T 2. æquè,

æquè , atque Humanissimis Viris D. D. Custodibus Abbatibus Zaccagnio , & del Miro , qui tunc fideliter describi curabant antiquos M. S. Codices Biblioth. Palatinæ , apud quos descripta servantur secretiora quædam medicamenta . Sciscitanti autem mihi , cujus essent , responderunt , Variorum Authorum ; sed hæc inter , celebrem audivi aquam contra epilepsiam , & apoplexiam . Aderat verò Interpres , qui ex germanicâ , quâ scripta sunt , in linguam Latinam , vel Italicam traducit . Hic itaque retulit , eam aquam esse Celeberrimi Jo: Langii , qui illam , dum viveret , Principibus Palatinis secretò communicavit . Nos itaque primùm considerantes , mox conferentes formulam istius cum formulis , quas Sennertus , Etmullerus , Jungken , aliique describunt , utique parum diversam , quantum spectat ad componentia , dissimilem verò comperimus , in quantum ad artificium , quod certè , cum sit admodum elegans , nos cogit , ut eam hîc transcribamus .

XIII. Præmitto tamen , hanc aquam multùm juvare posse præcavendis epilepticis ,

*Vera formula
Aque Antiepi-
leptica Jo:
Langii apud
Biblot. Vatic.*

pticis, atque apoplecticis infultibus apud eos solummodo, qui crassâ, ac frigidâ, Quos epilepticos juvat. ut vocant, lymphâ abundant; apud alios verò, qui penè igneâ sanguinis plenitudine, aut varicibus, vel aneurysmatibus in cerebro laborant, noxiam futuram.

XIV. Neque interim aliquis miretur, nos laudare aquam, paratam ex vino, quod in hujusmodi morbis tantopere damnavimus: Etenim vinum hîc loci est Cur profici, esse ex vino parata. solummodo menstruum specierum componentium; unde novam ex oleoso-volatilium corporum mixturâ indolem acquirit.

XV. Formula est sequens, eaque in Italiâ mense Majo paranda. Ejusdem formula.

℞ Vini malvatici, vel alterius boni, & odorati ℞. iiii.

Pone in vase vitreo, addendo singulis diebus per v. dies M. j. flor. lilior. convall., & vas exponatur radiis solaribus. Deinde suis organis destilla. Mox sume

Cinnam. elect.

Flor. lavendul.

Sem. fœnicul. an. ʒ. j.

Nucis mosch.

Caryophyllor.

Flor.

Flor. ror. marin.
stœchad.

Cubebæ. *an. ʒ. j. s.*

Ligni visc. querc.

Rad. pœon. ma.

dictamn. alb. *an. ʒ. v.*

M. Contundantur crasso modo, & ponantur omnia in suprad. spiritu destillato, rursusque per triduum soli exponantur, ac destillentur.

*Quomodo, &
quando propi-
netur.*

XVI. Usus est, sumendi cochleare istius aquæ, quoties de vertigine, vel apoplexiâ timeatur. Cùm verò epilepticum paroxysmum præcavere quis velit, monet Author, ut de hac hauriatur cochleare ante novilunium.

*In peiloris
convulsionibus
pari affeâta
diligenter per-
quirenda.*

XVII. Si convulsiones observentur in pectore, videndum, utrùm in pulmonibus, an etiam in corde, & magnis vasibus; & tunc maximè ad causas respicere oportebit, & potissimùm cognoscere, utrùm de sepulto tuberculo, vel aneurysmate sit dubitandum: ad quorum malorum discrimina prophylaxis quoque erit dirigenda. Porrò, si solitarius fuerit, aut cum simplici lymphæ congestione thoracis spasmus, tunc usurpanda erunt,
judi-

judicio Curantis, oleosa, sulphurata, te-
 rebinthinata, succinata, camphorata,
 emulsiones, aliaque multi generis aquea,
 & diluta. Si, præter spasmodicas contra-
 ctiones, dolores, & febres urgeant, lau-
 dantur juxta doloris gradum, ægrique
 vires, etiam phlebotomiæ, & mitissima
 paregorica, de quibus prudens, ac sciens
 Medicus opportunè decernet.

*His phleboto-
 mia quando
 conveniat.*

XVIII. Licet verò hic loci de convul-
 sionibus partium, in thorace contenta-
 rum, summatim dumtaxat dicere con-
 stituerimus; incongruum tamen mini-
 mè arbitramur, particulatim etiam me-
 minisse subitæ, miræque cordis convul-
 sionis, quam Celeberrimus nostri Rom.
 Archilycei Mathefos Professor Vitalis
 Jordanus mense Aprili anni 1692. cum
 evidenti vitæ discrimine passus fuit. Is
 tunc erat ferè sexagenarius, & jam ex
 diuturno brachii dolore speciem torpo-
 ris contraxerat. At, cum in Epistolas
 Hydrostaticas Clarissimi Gulielmini non
 minùs celeriter, quàm validè, cunctos
 ingenii (quod ei acerrimum inest) ner-
 vos intendisset, statim sensit, brachii mo-
 lestiam sibi evanuisse, eamque capitis in-
 gra-

*Historia mira
 cordis convul-
 sionis.*

gravedinem conversam , indèque repente in corde urentem quasi clavum infixum , ut viscus illud vehementer convulsus experiretur . Interim accersor ipse , qui advolo ad Amicum , meumque olim in Mathematicis Præceptorem , quem invenio facie Hippocraticâ , gelidis , sudoreque perfusis artibus , denique pulsu penitus myuro , ut non simplicem ægrum , sed planè moribundum videre mihi visus fuerim . Exaggerabat tamen , ut poterat , Vir ille magnanimus , mortiferum cordis angorem , strangulationem , & illud veluti vulnus exurens .

Felix curatio.

Statim verò exhibeo uncias quatuor olei amygdalarum dulcium rec. tracti cum aliquot granis camphoræ , & guttis olei Matthioli ; quo , & aquâ Reginæ Hungariæ regionem cordis , nares , & artus liniari , jubeo . Mirum sanè dictu est , sed longè mirabilius tactu , visuque fuit , pulsus illico majores , citatioresque redditos , mox artus recaluisse , faciemque coloratiorem factam , ut , magnâ subortâ febrî , clavum illum quasi avulsam Patiens persenserit . Unde continvatis quâ fluidis , quâ oleosis , quâ diaphoreticis , brevè

vì

vì depuratum vidimus nervosum , ac sanguineum liquidum partim per sudorem , partim per diuresim . Vivit autem nunc Senex , æquè valens corporis , atque animi viribus .

XIX. Hæc autem historia apertè nos Ætiologia. admonet , convulsiones cordis oleosis , cardiacis , ac diaphoreticis statim esse curandas . Laxatis enim olei ope nervorum , fibrarumque crispaturis , acre liquidum , cardiacorum usu mobilius , ac volatilius redditum , facilè à locis , ubi interceptum est , potest refluere , ac circulanti sanguini ita remisceri , ut tandem , excitatâ feбри , extra corpus detru-di possit ; cùm verum sit , quod scriptum nobis reliquit ^a Hipp. — *melius esse convulsioni febrem , quàm feбри convulsionem supervenire* — . Sed rursus ad institutum .

XX. In reliquis , ubi malum hæret præcordiis , & erosionis metus longissimè fuerit , identidem sunt præscribenda Cardiaca præscribendi ratio. cardiaca , atque etiam , si opus fuerit , quæ ex stibio , viperâ , mumiâ , & myrrhâ conflantur .

XXI. Deinde , si convulsiones existant epilepticæ , vel ad epilepticam indolem

tendentes, perpendendum erit, num affectio sympathica sit, ex infernorum scilicet viscerum, totiusque corporis consensu, an idiopathica ex peculiari cerebri passione. Etenim juxta hanc divisionem præservatorias curationes inter se admodum diversas instituemus. Siquidem, si fuerit vitio stomachi, & succorum intestinalium, omni alio pharmaco melior est vomitio, & alvi dejectio, per epicrasim instituta. Hinc passim Romæ occurrunt multi, qui, licet scotomiis, aliisque capitis affectionibus, fortes apoplexias, subitasque neces minitantibus, jamdiu tentati fuerint, senes adhuc decrepiti, ope Pil. de succin. Craton., de spumâ chalybis, vel alterius benigni solventis, identidem intrâ annum repetitorum, servantur incolumes.

*Sympathica
epilepsia vomitum,
& epicrasia
purgatio
proficua.*

*Hæc Romæ
præsertim ab
apoplexiâ præ-
servat.*

*Phlebotomia
quando cele-
branda.*

XXII. Si verò hujusmodi affectiones à recurrente vasorum sanguineorum plenitudine, aut suppressis hæmorrhagiis dependeant; tunc phlebotomiæ interdum instituendæ, ac fonticuli etiam admovendi erunt. Atque hinc rectè Hippocrates in Coac. scripsit. — *Fluxiones ex naribus largæ, per vim suppressæ, quan-*

quandoque convulsionem provocant : Venæ sectio solvit.

XXIII. Quòd si tandem eadem mala, ob inductam in cerebro labem, idiopathica etiam evaserint; nullo certiùs remedio extra limites inferendæ subitæ mortis contineri possunt, quàm, si æger, abstemius spontè factus, specifica antiepileptica, sale præsertim volatili animali constantia, ac laudabile vitæ regimen perpetuò adhibuerit. Nec meditata solum, sed diù etiam experta in præsens referimus: quibus sanè observationibus ipsius quoque ^a Hippocratis consilium accedit; is enim agens de insomniis, comitiales morbum, aut insaniam significantibus, monet, ut *ægri cibis paucis utantur; ita namque integram valetudinem sibi totâ vitâ comparabunt*. Idemque Hipp. in contumaci capitis dolore, ac vertigine laudat victum fluidum, & potum aquæ.

In epilepsiâ idiopathicâ abstinere à vino magnum re. medium.

a Lib. de insomn. n. ult. de affect. n. 2.

XXIV. Denique circa congestiones nonnulla breviter differemus; eæ namque, cùm nimio, varioque inter se discriminantur intervallo, Medentium ingenia, usu firmata, ad capiendum consilium in arenâ dumtaxat movere possunt.

In congestionibus curandis Medici sunt prudentes.

sunt . Prudens itaque Medicus in horum morborum curatione ita se exerceat juxta ^a Hippocratis oraculum , *ut proficit , aut non noceat* .

^a 1. epid.
sect. 2.

Juxta congestæ materiei indolem prophylaxis dirigenda .

XXV. Cùm verò congestiones modò imò in ventre , modò in medio , modò in capite fieri , contingat , nunc ab humoribus lentis , & crassis , nunc à salinis , & acribus , nunc demum à mixtis , & sulphureis , sive cum suppuratione , sive finè eâ ; equidem arbitror , summo Curantium judicio , atque experimento opus esse , ut hisce in casibus recta præservandi ratio instituatür . Illud solummodo in genere admonemus , scilicet ubi viscidum , ac salinum phlegma in aliquo ventre peccaverit ; conducere rhabarbarata , aloetica , chalybeata , stibiata , potum Thè , vel Coffè , therebinthinata , aliæque gummosa , tenacitatem solventia : ubi salinum , & acre ; juvare aquea , fucos herbarum epicerafticarum , diluta , lactiginosa , oleosa , & alkalica , partim fixa , ut stibium diaph. , partim benignè volatilia : ubi tandem vitium est in sulphureis , mixtisque principiis ; mixta remedia utilia fore , præsertim si de ocul-

cultâ dubitetur suppuratione, quo in casu, post phlebothomiam, initio morbi, si res postulat, institutam, ea usurpanda, quæ pus, ac faniem dulcificare, quæ sphacelum arcere, quæ demum, rupto abscessu, ulcus abstergere, & consolidare valent. Eligat itaque peritus Medicus ex omnibus optima, & unicuique adhibeat in re tunc præsentî, quæ magis congruunt, illius apud ^a Celsum consilii perpetuò memor, nempe — *nulla re magis laborantem juvari, quàm tempestivâ abstinentiâ: — semper quærentes, non quid Medico liceat, sed quid ægro salutare sit, cui vehementer nocet, quoties in ejus, quod assumitur, vel tempore, vel modo, vel genere peccatur.*

^a Lib. 2. cap. 16.

Opportunum
Celsi consilii.

XXVI. Sed, stante eâ divisione, quam circa initia hujus capituli posuimus, superest, ut agamus etiam de methodo prophylacticâ dirigendâ ad homines externis morbis valetudinarios. Cùm verò certum sit, apud ista corpora idcirco factam, tectamque internorum viscerum texturam servari, quia pravi humores ad artus cum podagrâ, aut quovis tumore, vel ad superficiem corporis cum ulcere, fistulâ, scabie, vel alio morbo

de-

Externi morbi
diuturni valetudinarii potissimum uti-
li, & cur.

*Quomodo tra-
ctandi, ne su-
bitò periant.*

decumbunt; profectò univèrsa ratio præ-
servationis à subitis malis, subitas neces-
inferre valentibus, versari videtur circa
auxilia, quæ primò servare possunt fir-
mum, validumque fibrosum rete inter-
norum viscerum, & vasorum, unàque
simul congruam fluxilitatem, & crasim
liquidis conciliare; unde quidquid intus
redundat incongruum, atque impermi-
scibile, excitato confestim stimulo, fo-
ràs utiliter propellatur, ac veluti despu-
metur; deinde, quæ simul tollere valent
in affectis externis locis ea impedimen-
ta, quæ aliquando objici possunt ipsis
salutaribus fluidorum propulsionibus,
remoris, ac secretionibus.

*Methodus ge-
neralis præser-
vativa.*

XXVII. In genere itaque juvabunt
alimenta optimi succi, jura interdum
viperata, serum cum infusione rad. chi-
næ, & alia ejusmodi, quæ robur solidis
partibus, benignamque volatilitatem,
ac fluxilitatem humoribus tribuunt; si-
mulque ea omnia, quæ partes externas
ita tuentur, ac disponunt, ut nullo callo,
nullâve, etsi minimâ, constipatione la-
borent, per quam internis nisibus reni-
tantur. Nunc ad Artis Magistros, non
ad

ad solos Candidatos scribimus ; ea propter non pudet brevia tantum medendi monstrare compendia . Illud tamen docuisse , nunquam satis contenti erimus , frustra nempe præservandi rationes à subito interitu illum foris quærere ex medicaminibus , qui domi spreverit diætam . Diaeta cæteris remediis præstantior . Cætera Medicinæ præsidia interdum fallunt ; unum nullo unquam tempore fefellerisse , comperimus , rectum scilicet vitæ regimen , ac tranquillum , infractumque in bene , vel malè valentibus animum : jis enim duobus veluti axibus univ ersus ferè præservationis orbis à subitaneâ morte , circumagitur . Neque profectò hâc super re decipi nos patitur Divinum illud Monitum apud ^a Lucam , ^a cap. 21. 34. ubi Christus Discipulos admonet , ut sobriè vivant , & à gravibus temperent Mundi curis ; ne subitis mortibus causas exhibeant . — *Attendite vobis , ne fortè graventur corda vestra in crapulâ , & ebrietate , & curis hujus vitæ , & superveniat in vos repentina illa dies : tanquam laqueus enim superveniet in omnes , qui sedent super faciem omnis terræ .* Reslo vivendi regimini animorum tranquillitas jungenda , ex Divino etiam Oraculo . Sileat igitur Medicus , ubi Deus ipse loquitur : & quidem sinè parabo-

rabilis certiores prophylaxis rationes nos edocet, quas certè, annuâ calamitate docti, ut mox videbimus, vivâ deinceps memoriâ retinere debebimus.

XXVIII. Sed hujus firmum calamitatis finem Romæ nondum videmus. Et enim, cùm à primâ nostrorum Librorum editione usque ad tertiam, quæ nunc paratur, integer jam fluxerit annus, funestâ rursus, plurimâque repentinæ mortis imagine perterritos populos cernimus, qui mala sua interim dolent, lugentque, sed causas, palam à SALVATORE nostro propositas, nec agnoscunt, nec vitant.

Finis Primi Libri.

D E
S U B I T A N E I S
M O R T I B U S

In particulari.

LIBER SECUNDUS.

D E

SUBITANEIS MORTIBUS,

ILLARUMQUE CAUSIS,

Quæ decursu annorum

1705. & 1706.

ROMÆ CONTIGERUNT.


LIBER SECUNDUS.



*Quoniam Libro præcedenti qua-
situm est in genere, quid su-
bita mors? quales sint ejus
causæ? quæ etiam signa,
quæque ad illam avertendam
remedia, ut vires nostræ tu-
lerunt, ostendimus; jam hinc superest,
ut secundo Libro agamus in particulari de
jis subitaneis interitibus, qui Romæ per hæc
tempora crudeliter desævierunt; daturi et-
iam exempla tum subitarum ægritudinum,
quæ vagabantur, tum nonnullorum, qui
eisdem correpti vel evaserint, vel deceffe-
rint; admonentes interea, ut ad memo-*

X 2. riam.

riam revocentur ea, quæ in limine prioris Libri Benigno Lectori proposuimus circa rationem, propter quam de Subitaneis Mortibus scribere decrevimus.



Quæ-

*Queritur, an causa repentinorum mortuum,
quæ Romæ per hæc tempora grassatæ
sunt, fuerit universalis, & simplex,
an verò particularis, & mixta.*

C A P U T I.



Acturi nunc de mortibus, quibus hoc anno tot Romani Cives, atque Incolæ repenti sublati sunt, investigabimus primo loco, communis ne, an particularis earundem causa latuerit in singulis.

II. Nos minimè fugit, Libitinam certis annis, annorumve tempestatibus, non modò in hominibus, ex pestilenti aeris constitutione proficiscentem, sed vel in brutis animalibus, pecudibus nempe, capris, aliisque, ex certâ aeris labe, vel aquarum, & pascuorum defectu, vitiove natam, improvisò debacchari. Unde aureis versibus cecinit * Fracastorius noster:

Mors repentina quandoque grassatur in homines, & bruta ex causis universalibus.

* In syphil.

Inter-

*Interdum pœnas animalia sola dedere ,
 Aut multa , aut certa ex ipsis : memini
 ipse malignam
 Luxuriam vidisse anni , multoque maden-
 tem
 Autumnum perflatum austro , quo pro-
 tinus omne
 Caprigenum pecus , è cunctis animanti-
 bus unum ,
 Corruit :*

*Repentina
 mortis , Roma
 nunc grassan-
 tis , causa non
 fuit universa-
 lis ; sed cui-
 cumq; morien-
 ti particula-
 ri , & propria.*

^a 1. de diat.
 n 3.

III. In nostrâ tamen hypothefi probabilius ducimus, causam improvifarum mortium non unam omnibus absolutè communem, sed singulis morientibus majori ex parte propriam extitiffè. Quod sanè tametsi præ me ratiocinando ex signis facilè fuerim affecutus; tum verò mihi tandem placui, cùm internum animi sensum externo ipsius rei testimonio, atque certâ experimentorum fide comprobatum intellexi. Ex sequentibus enim apparebit, peculiare, suasque præcipuas cuique causas, seu immaturæ dissolutionis, ut ita dicam, semina paulatim genita, denique confestim ad actum fuisse revocata, juxta illud ^a Hippocratis: *non enim*

enim repente morbi hominibus accidunt ; sed , paulatim collecti , acervatim apparent .

IV. Quidenim tabacum incusabimus ; Hujus discriminis causa non fuit usus tabaci . cum nonnulli , quorum nares nunquam pulvis iste inquinaverat , ex tempore viderint occasum ? Quid veneficas ex terræ motibus exhalationes ; Non exhalationes ex terræ motibus . cum ji præcipuè à subitaneis tum morbis , tum moribus se feliciter vindicaverint , qui diruta ex soli convulsionibus loca potissimum incoluerunt ? Quid chocolatæ abusum ; Non chocolata , que potio est salubris , dummodo quis vino non abutatur . cum qui à triginta jam annis nunquam non semel , sæpe bis in die (quos inter Cl. D. Placentius Medicorum Urbis Senior , & octogenario major , ut & ipse ego , quinquaginta tres annos natus , cætera cauti , præsertim in vini usu , numeramur) hoc potu usi sunt , nullo , vel minimo , per hæc tempora symptomate laboraverint ; contra inter eos , qui nunquam illam degustarunt , multi subito interierint ? Quid tandem ignotum aeris venenum culpabimus ; Neque venefica vis aeris . cum extispicia varias , notissimasque causas rerum naturam diligenter quærentibus apertissime detexerint ?

V. Firmant verò sententiam de partitu-

Autoris experimēta de cautâ particulari in singulis morientibus.

particulari in singulis caufarum concursu præteriti etiam eventus illorum , quos vitam cum improvīsâ morte commutasse , novimus , priusquam à SUMMO PONTIFICE imperatum nobis fuisset , ut anatomico cultro sepulta veritas erueretur . Etenim nonnulli sublati fuerunt cum indiciis subitò disrupti sanguiferi canalis , quem jam varix , aut aneurysma intrâ thoracem , vel abdomen debilitaverat ; Multi per fortissimam apoplexiam , ob interceptum , effusumque sanguinem intrâ cerebrum ; Alii demum ex magno , ac pertinaci præcordiorum spasmo , aut paralyfi , vel ex obstructiōne viarum cordis , magnorumque vasorum ; unde , impeditâ sanguinis trajectione à corde tum in pulmones , tum in cerebrum , vitale illud , ac reciprocum istorum viscerum commercium ex tempore interciderit . Hoc verò perpetuò est observatum , ultimum nempe diem repenti à nemine , quod sciam , visum fuisse , qui labe aliquâ fluidorum , viscerum , aut saltèm canalium à multo tempore non laboraverit , quique simul non fuerit stationarius miles in castris Bacchi ,
aut

Nemo , nisi valetudinarius & intemperans , repenti perit .

aut Veneris. Quibus fit, ut ipse crediderim, repentinos hosce casus non sanorum plerunque mortes, sed quamdam veluti humanæ naturæ despumationem, feu malam crîsim extitisse apud illos, qui jamdiu palam, vel secretò, infirmâ, atque ægrâ valetudine fuerunt: crîsis enim apud Theoricos definitur, subita mutatio in morbis ad salutem, vel ad mortem.

*Subita mors
in jis ad ma-
lam crîsim re-
ferenda.*

*Demonstratur, inæqualem aeris constitutionem
fuisse etiam inter causas vagantium re-
pentinarum mortium.*

C A P U T II.

Licet dubitationi non sit locus, quin celeres interitus, Romæ hoc præsertim tempore contingentes, magnâ ex parte prædispositis vitio aliquo corporibus debeantur; negare tamen non ausim, universalem aliquem cœlestium, terrestriumque causarum concursum ad hunc producendum effectum convenire potuisse, sine

Y quo

*Constitutiones
aeris quomodo
subitam mor-
tem sollicita-
vant.*

quo forsitan , nec adeò numerosa , nec
adeò subita morientium clades contigif-
set . Hic autem concursus , ut mea fert
opinio , acceptus potissimum referendus
esse videtur præteritarum indoli tempe-
statum , quas nemo , vel lippus , non vidit
excessu quodam intemperierum insidias
ægris jam corporibus facilè paravisse .
Præcessit enim æstas fervida , atque ad-
modum sicca ; deinceps autumnus au-
stro plerunque comitante , pluvio-
sus ; tandem hyems viguit inæquali-
ter borealis , & australis . Unde nil mi-
rum , si tum solida fuerint enervata , tum
sales acres , partesque sulphuræ à præ-
fervidâ elapsi anni æstate (balsamico-
oleosa , aquosaque , & dulcia sanguinis
componentia plus justo dissipante) in-
trâ Romanorum corpora prædominium
acceperint ; indèque propter novos mo-
tus , & aculeos , periculum valetudina-
riis struxerint improvisum . Nihil enim
tam promptè subitanam mortem solet
inferre , quàm si momentum impetus ,
adauctum in fluidis , debilitatam alicubi
resistentiam solidarum partium majoris
usus constanter urgeat , superetque .

*Impetus liqui-
di auctus in-
trâ solidum
minds vestiens
sepe funestissi-
mus .*

II.

II. Quæ autem, & quot sint mala, quæ nobis obveniunt ex austro, & aquilone, clarè, ac sapienter edixit ^a Hippocrates per hæc verba:— *Cerebrum ab austris quidem solvi, & humectari, & venas laxiores reddi. Ab aquilonis verò flatibus, quod sanissimum est in cerebro, compingi, quod verò morbosissimum, ac humidissimum est, excerni, & forinsecus circumvalluere.*

^a De morb. sacr. n. 15.

^{Auster, & aquilo noxii ex Hipp.}

III. Cùm verò experiamur, fermentativas particulas, ex Africâ per austrum advectas, deteriores reddi exoticorum quorundam miscellâ principiorum, quæ ex Romano solo passim elevantur; exindè facile est causam invenire, cur multigeni, intrâ prædispositam Civium corpora collecti, erodentes humores, certo quodam tempore delitescere, sensimque vires, per aeris pabula captare poterint; ut denique, accedente novissimâ quâcunque causâ, necem subitò intulerint, inductâ, post novum, extraneumque motum, sanguinis plerunque coagulatione, quam serositatum defluxio, atque exundatio consequitur, & de quâ, coacti exemplo lactis, egregiè idem locutus est ^b Hippocrates, cùm modum ex-

^{Roma auster deterior.}

^{Sanguinis coagulationem serositatum exundantia consequitur.}

^{Hipp. de lacte coactio exemplum.}

^b 4. De morb. n. 26.

ponit , quo ea operantur , quæ ex cœlo nobis obveniunt , si ad ea , quæ in corpore genita sunt , corrigenda inepta fiant . Sales enim acres , ab autumnii pluviis in fluorem nostris in corporibus evecti , nunc per aquilonares ventos perspirare impediuntur , nunc verò ab austro ulterius fusi , transversim aguntur .

IV. Interim , si cupis modum , quo aer extraneis , atque humanæ naturæ infensis particulis imbuitur , & quomodo interdum per ventos huc , illucque transferatur , plenè id habebis à ^a Franc. de le Boe Sylvio .

^a In append.
ad prax. tract.
10. n. 124. &
seq.

Adducuntur quedam argumenta ad confirmandum , non ex universali solùm causâ tot hominum discrimina Romæ contigisse , sed ob morbosas eorundem corporum dispositiones , ac potissimùm intemperantiam .

C A P U T III.

TRia hîc observatione digna ulterius occurrunt , quæ veris , obscurisque detegendis subitaneorum interituum hujus anni causis novam lucem afferre possunt . Primum

num

mum illud esse videtur, quòd nemo fortè Nobilium, aut eorum, qui frugi vitâ utuntur, utcunque subitaneis morbis correptus, vitam subitò deferuerit: certissimo quidem argumento, non à solo aeris vitio vagantes Romæ morbos, mortesque ortum habuisse; cùm affectus olim apud Leidenfes epidemicus, quem tantâ fedulitate describit ^a Sylvius, & cujus omnem causam ex aere, tunc plurimum à statu naturali recedente, derivandam putat, priùs & graviùs in opulentiores, ac delicatiòres; ferius, & quodammodo leviùs in plebem sævierit.

Nobiles, & temperati repentinam mortem non subje-runt.

^a loc. sup. cit.

Contrarium accidit, ubi ex causâ universali, refertur Sylvio.

II. Et quanquam hisce temporibus nonnulli ex divitibus apoplexiâ tentati fuerint, adhibitâ tamen opportunâ medelâ, vel ipsi utcunque convaluerunt, vel syderationes in paralyfes concesserunt. Scilicet quia illi, qui euchymis cibis nutriuntur, qui ab aeris inclementiâ se se tueri magis valent, quique tandem, quoties morborum prodromis pulsantur, statim ad remedia confugiunt, vel certè cautiùs deinceps in vivendo se gerunt, talem vitiosorum fluidorum cumulum in se minimè congerunt, qui subitam

ne-

Divites, utcuque repentinis morbis correpti, præ pauperibus feliciter liberati sunt, & cur.

necem afferre possit . Contra verò pauperes , quemadmodum facultate destituuntur deligendi cibum , & potum , cæteraque ad valetudinis tutelam necessaria , ita passim ad vulgaria , minùsque plerunque salubria , sunt incontinentiores divitibus ; quinimo , quoties alicujus morbi præludiis tentari incipiunt , curationes vel nullas suscipere , vel prorogare solent ; idcirco in jis tum solida , præcordia præfertim , ac cerebrum , sensim labefactantur , tum fluida ad morbos inferendos , ac prædictis in partibus manifestandos , magis exacuuntur .

*Ex hâc
labe. mares
potius inuasi,
quàm femi-
næ.*

III. Alterum deinde , quod accuratè pariter , diligenterque considerandum venit , versatur circa sexum , in quem istarum decursu tempestatum mors furere visa est ; hæc enim , ut contra masculinum hostiliter agere , ita sequiorem sexum ferè intactum relinquere consuevit ; ut vix paucas fœminas subitò mortuas ad hunc usque diem numerare poterimus . Conditio sanè morbosæ constitutionis , persimilis alteri , quæ Justiniani tempore observata fuit Constanti-nopoli , ubi popularis quidam morbus

*Apuđ Sigo-
nium de oc-
cidēt. imper.
lib. 20.*

ma-

mares magis, quàm fœminas, absumebat. An quia mulieres, catameniis repurgatæ, morbificum apparatus ad irritativam, ac suffocativam plenitudinem colligere, ut plurimum prohibentur? An satius, quia fœminæ, etiam plebejæ, temperantiùs vitam plerunque ducentes, minus pravorum succorum solent congerere?

IV. At illud certè ex duabus hisce observationibus præcipuè constare videtur, continentiores in cibo, potu, ac Venere à subitaneis mortibus se huc usque opportunè vindicasse; incautos verò, luxuriosos, vinososque improvisis faciliè mortibus concidissè.

V. Postremum sedulò animadvertendum illud sanè est, quòd morbi, unde subitæ mortes ortæ sunt, non semper jisdem signis, ac symptomatibus stipantur. Etenim aliquibus, per aliquot ante mortem dies, efflorescentia ad cutem apparuit, quâ repulsâ, fortissima supervenit apoplexia: ut contigit in primo casu illorum, quos post repentinam mortem dissecuimus. Nonnulli verò diu ante necem, anhelitu, palpitatione, vertigi-

Unde hoc.

*Non unicum
signorum genus
improvisò mor-
ientibus præ-
iit.*

tigine , atque animi deliquio sæpiùs correpti , morte tandem occubuerunt ; ut in V. casu observatum . Vidimus etiam non paucos , qui , præcurrente thoracis , totiusque corporis convulsione , sublati fuerunt , quorum numero quartus casus accensendus . Nec defuerunt qui , ex affectione ferè scorbuticâ diù valetudinarii degentes , propter improvissam tandem choleram , subito conciderunt : quemadmodum accidit cuidam Sacerdoti Societ. Jesu . Denique , ut paucis concludamus , non eadem omnibus communia signa mortem præcesserunt , & comitata sunt : ut jure optimo fateri possumus , Libitinam ex peculiari uniuscujusque corporis dispositione , magnâ ex parte , in Romanos grassatam fuisse . Contra verò fit , cùm ex principio dumtaxat universali frequentes interitus in genus aliquot animalium debacchantur ; tunc enim eadem semper indicia , actionumque læsiones , mortem præcurrunt . Hinc legitur apud ^a Sylv. , anxietates , nauseam , ac vomitum suos in primis ægros invalisse , & apud ^b Fracast. , de caprigenâ clade canentem , signa futuræ mortis tuffi-

Si ab universali causâ eadem continuo signa adjunt.

^a loc. sup. cit. n. 4 , & seq.

^b In syphil.

tussiculam semper præcessisse ; quemadmodum anthraces , & bubones pestem comitantur , & prodromi necem plerunque denunciant .

VI. Accedit etiam, morbos, qui elapsis mensibus ad mortem iter fecerunt, nullâ contagione in affines, necessarios, aut in cadaverum sectores migrare observatos fuisse ; indicio fanè non obscuro, nullum in jis viguisse virus, per quod de ullo epidemico, aut pestilenti morbo fuerit metuendum .

VII. Novum fanè non est, per intervalla, incertis reditibus, hâc illic subitaneas mortes ex sporadicis morbis in terris apparere . Etenim non solùm Venetiis, sed & Romæ, aliisque Italiæ Civitatibus id contigit circa initium præteriti sæculi, ut narrat^a Dom. Tirillus in tractatu, quem de hoc eodem argumento illâ occasione satis diligenter conscripsit. Pariter Romæ sub Alexandro VII. cadavera quàmplurima repente mortuorum adaperata fuerunt à Joh. Trullio Chirurgo Pontificio, qui, ferè in omnibus, vaporum vel intrâ pectus, vel intrâ cranium rupturas comperit . Novimus etiam,

*Plures Italia
Urbes hac peste
aliis cor-
repta .*

*a De caus.
sub. mort. c.
1.*

Z

iam,

a In dissert.
epill. de ce-
reb.

iam, ante multos annos in Hetruriâ crebrò homines ex tempore mortuos, quorum causæ modò in cerebro, modò in thorace deprehendebantur, de quorum fanè casibus locutum fuisse, arbitramur Doctissimum Carolum ^a Fracassati. Ut proindè seriò quidem de ipsâ morte cogitare, sed mirari minimè debeamus, eandem non rarò, nostris præsertim ab erratis, & pathematibus accersitam, clanculum, ac festinanter ad nos venire.

Numerus morientium in Urbe forsitan hoc tempore minor extitit, licèt major visus sit, ex quo consueti, & exitiales Romæ morbi nequaquam vagati sunt.

C A P U T IV.

IN admirationem certè nullam peritiores Medici hoc anno duci deberent ex paulò frequentiori subitò morientium numero in Urbe, si adverterint, decursu superiorum temporum, æstatis nempe, autumnii, atque hyemis, in quibus crebrò repentini homi-

*Grassantibus
repentinis mor-
tibus, ceteri
morbi, & mor-
tes Romæ mi-
nis frequētes.*

minum interitus contigerunt , morbos Romæ consvetos, malignas nimirum febres, pectoris inflammationes, aut pravas dysenterias, ex quibus multi solent decedere, rarissimè invaluisse; ita ut in hanc nostram temporis constitutionem illud aptè quadrare videatur, quod^a Hippocrates ætate suâ observavit, — *Resolutiones* nimirum *cœpisse ex syderatione*; *Et quidem multos ex ipsis subitò mortuos fuisse, cùm morbus esset sat̃s popularis. Ceterà incolumes debebant.* Unde, si subitanæ hujus anni mortes, quæ ferè solæ contigerunt, conferantur cum vulgaribus mortibus singulorum ex superioribus annis; credimus, hosce interitus longè pauciores inventum iri. Quid igitur erit causæ, cur nunc miremur, ploremusque (animarum excepto periculo) fortè non adèò magnum numerum acutissimorum morborum, repentè interimentium, cùm plures mortes ex aliis, ac potissimùm acutis, ægritudinibus, elapsis annis, impavidi, siccisque oculis spectaverimus? Ille siquidem pravorum humorum appa-

^a T. epid.
 conslit. 3.

Ratio adducitur.

^a De vet.
Med.

paulatim colligi , & vi cujusdam fermentationis , ac penè putrescentis liquidi , ægros longiori viâ de medio tollere consuevit ; hoc anno in se ipso magis existens , ut ^a Hippocr. dicto utar , promptior ad motum , & potentior hîc ad solida irritandum , scindendumque , illic verò ad fluida coagulandum , aut dissolvendum , redditus fuit , proindèque adeò præcipites mortes valuit inducere. Exindè animos ad spem ereximus , transacto verno æquinoctio currentis anni 1706. , per novam aeris , ac terraquei orbis re-fermentationem , perque ventorum permutationem , morbosum istum particularum concursum , & commixtionem variatum iri : unde lethalis , ac mortifera constitutio de suâ remitteret sævitie , Deoque omnium bonorum largitori debitas laudes sospites , hilaresque redderemus . Quod sanè præfagium exitu maximè comprobatum nunc cernimus , cùm opus hoc , in lucem edituri , expolimus . Sed quoniam nullum in terris bonum absque mixturâ mali hominibus accidit ; indè fit , ut , dum de felici , faustâque repentinarum cessatione mortium jure gaude-

Cessatis repentinis moribus , consueti morbi , & lethales recrudere .

demus , & gratulamur , sub fœnore beneficium nos accepisse , præsentiamus . Nunc enim , vel decursu æstatis , acutas febres , lethalesque peripneumonias sævire , passim intuemur , dolemusque .

Quæ remedia hoc anno jis maximè profuerint , qui à subitaneis morbis , repentinas mortes minitantibus , evaserunt .

C A P U T V .

CŪm satis pateat ex antedictis , Nobiles , ac divites , immo , ut postea rescivimus , nonnullos etiam pauperes , subitaneis morbis tentatos , hoc anno convaluisse ; non dubitamus , quin pius , utilisque noster futurus sit labor in jis diligenter recensendis , quibus jidem ex repentinis moribus evaserunt . Ita Medici , recurrentibus aliquando confimilibus anni constitutionibus , firmata novis experimentis invenient præsidia , quorum ministerio ægri vel à morte penitus vindicari , vel saltèm tantum temporis lucrari valeant ,
ut

ut anteactæ crimina vitæ (quod cardo rei est) sacrâ exomologesi expiare , seque Numini commendare possint .

II. Et quoniam ægri , qui morbi vim superarunt , quantum nobis innotuit , apoplexiis cum epilepticis , vel syncopalibus affectionibus , absque ullâ tamen vasorum scissione , aut rupturâ , potissimum tentati fuerunt ; idcirco rationi consonum ducimus , ea nunc remedia indicare , quæ in hac temporis constitutione plerunque utilia deprehendimus .

*Sanguinis
missio variè
administrata
utilis fuit .*

*Eadem in sy-
deratâ parte
proficua .*

III. Inter ea verò , quæ maximè proficere visa sunt , primas tenuit sanguinis missio ab jis , vel illis venis , juxta ægrorum vires , consuetudines , aut suppressas evacuationes celebrata , & præsertim in viris plethoricis , nunc ex brachio , nunc ex pede . Ubi advertimus in affectionibus apoplecticis , cum resolutione alterius cruris , nos proficua expertos fuisse venæ sectionem ex syderato talo institutam ; fluente enim ex affecto membro sanguine (quemadmodum in coxendicis doloribus apertâ sub eodem poplite , vel in crure , quam ischiadem vocant , venâ , feliciter contingere , ob-

ser-

fervamus) faciliùs, ac fortiùs dimoveri possunt obstacula convulsionum, & obstructionum, quæ in vasis læsæ partis spinalis medullæ, vel cerebri basis pertinaciter hærent. Quibus autem hæmorrhoides, aut menstrua restitissent, juvit ex pede, atque ex podice. Tandem jis, in quos vel ob provectiorem ætatem nulla inferiorum venarum sectio cadebat, vel post alias phlebotomias contumax adhuc strangulatio sanguiferorum cerebri, & sinuum duræ matris perseverabat, miram opem tulit aperire venas frontis, nasi, & præsertim jugulares, ex quarum profectò sectione, quanquam ferò, & citra prævias dispositiones tentatâ, aliquam tamen utilitatem reportavit Illustrissimus Præsul Rota, qui, cum acutâ feбри, & suffocativâ pulmonum plenitudine correptus esset, indicatæ missioni sanguinis ex cubiti flexurâ (dolente nobiscum D. D. Bernabeo diligenti ejusdem Physico) omnino repugnavit: perperam enim hâc de re astra sibi familiaria consuluerat: factâ postmodum ad cerebrum metastasi, in apoplexiam incidit, & cum minùs speraretur, ut

*Jugulares,
nasi, &c. ve-
na quando a-
perienda.*

ut resiperet , incisâ jugulari , statim ad sensuum officia rediit , & suæ compositionis multas horas pro salute animæ consecutus fuit ; licèt , eâdem pulmonum affectione redeunte , tandem decesserit .

*Quare utile sit
per hæc vasa
sanguinè mis-
tere .*

IV. Rationes verò , ob quas phlebotomia venarum frontis , nasi , ac potissimum jugularium in calidis , & sanguineis cerebri affectionibus juvare plurimum solet , petendæ forent ex Prodromo nostro , quem Anteproximum Morborum Cerebri inscribimus ; ubi solidè agimus de peculiari sanguinis itu , redituque per cerebri vasa , ac de sublimi artificio , quo instrumenta respirationis , juxta indigentias œconomix animalis , augent , vel minuunt impetum , ac proinde molem ejusdem sanguinis , tum propellendi per arterias carotides , quæ non rectâ , sed obliquâ , atque inflexâ viâ cranium perforant , tum reducendi à jugularibus , quæ non sparguntur per cerebri superficiem , sed mediis duræ matris sinibus sanguinem hauriunt . At enim verò , cùm hîc versetur intrâ limites propositi thematis , satis erit indicare , prædictas venas , cùm per lanceolam scindun-

duntur, affatim illum, vel illi proximum sanguinem profundere, quo intercepto, sinus tument, cerebrum, ac nervi irritantur, ac premuntur; & quo expedite recirculante, cor, & pulmo ultro gravarentur. Unde nil mirum, si, hoc particulari detracto cruore, liberior redditur sanguinis fluxus in cerebro, & præcordiis, ac pro ratione virium causæ morbificæ, atque ægrorum tollerantiæ, istorum viscerum convulsiones, ac sanguinis quoque moræ impediuntur.

Sublingualium incisio cerebri, & præcordiorum levamen.

V. Similiter incisio venarum sublingualium in aphonis, detrahens ex affectâ parte sanguinem, ea vasorum tollit impedimenta, quæ nervos, inductâ pressione, aut convulsione, suo privabant officio.

Sublingualium in aphonis utilis.

VI. Sed, redeundo ad hypothesim, contulit porrò, meâ sententiâ, in constitutione istâ repentinorum morborum sanguinis missio, quia ægri, quorum mala inducias pro tentandis remediis Medico præbuerunt, inter illos numerabantur, qui ut plurimum probis alimentis, vino, & chocolatâ usi fuerunt. Deinde verò, quia illorum non aspernanda, inter

Hæc nutrita corpora feliciter sanguinis missionem sunt experta; & cur.

A a

ex-

externas, causa fuit præservida, & sicca æstatis constitutio, quâ partes sulphureæ, salesque maximè acres intrâ optimè sagineatam sanguinis massam exaltari solent, qui sales, cùm solito majori momento motus quaquaversum per corpus ferantur, minimo negotio intrâ tendineo-musculares membranas sinuum duræ matris, ac magnorum vasorum cerebri, aut præcordiorum impingunt, easque rigidas faciunt, & crispant; exinde, angustatis sanguiferorum finibus, & caudicibus, libera tollitur, apud hujusmodi viscera, ipsius sanguinis circulatio, quam, vasorum interceptionem, vocavit Hippocrates, qui sanè primus hæc in casibus phlebotomiam laudavit. Et quidem hujusmodi affectiones, si rupturâ vasis caruerint, remittunt, missò sanguine; quia nempe, scissâ venâ, simul cum ipso cruore, quâ data porta, illud effluit acre-volatile, quo detractò, statim enervatur, ac debilitatur excessus momenti ejusdem sanguinis contra vasa, quæ propterea excessu tensionis, & crispaturæ contra sanguinem nitebantur. Insuper, inducto per phlebotomiam no-

*Hippocrati-
ca vasorum
interceptionis
modus exponi-
tur.*

*Hanc phlebo-
tomia tollit,
teste Hippocr.*

vo in sanguiferis spatio , fluidorum motus , & remixtio liberior redditur , indèque , si quæ alicubi urget canalium convulsio , vel obstructio , rapiditate introfluentis liquidi remittit , ac cedit.

VII. Hic serìò advertendum putamus, nos missionem sanguinis non semper in epilepticis , apoplecticis , ac suffocativis affectionibus Romæ proficua[m] expertos fuisse . Idcirco , cùm in subitis casibus nostræ confusio mentis pronum faciat iter ad errorem , caveant Medici , ne ad hujusmodi , quod tantopere apud aliquos laudatum , expeditumque est , remedium , inconsultò descendant ; cupientes enim sanare ægrum , ut Celsi dicto utamur , ex tempore jugulabunt . Sedulò itaque videant , quæ scripsit^a Hippocrates , circa indicationes , ac signa promittendo in jis casibus sanguine ; & de tempore quoque , in quo convenit (quod circa mali principia esse solet) consulant Doctissimos Viros^b Ballonium , &^c Martianum .

*Sanguinis
missio Romæ
non semper
proficua .*

^a De vict. rat. in morb. acut. n. 37. & seq.

^b Lib. 2. consil. in com. ad histor. I.
^c In com. ad suprad. Hipp. textum .

VIII. Quid ? quòd Romæ rariùs , quàm in montanis regionibus , venas incidere convenit , præsertim cùm vel corpora

A a 2 in-

ingluviei multigenæ, & impuræ sunt af-
 fvetæ, vel æstas viget pluvia, fructus-
 que ad perfectam maturitatem non per-
 venerint; quibus de causis Incolæ, ac Ci-
 ves apparatus cumulans humorum, ex
 quibus plus impuri, quàm balsamici sul-
 phuris, plus lixivialium, quàm conve-
 niat, salium redundat, & proindè laxa-
 ta fluidorum compages ad eam prona fit
 crasim, quam Scholæ fati barbarè pu-
 tredinosam, ac malignam appellant, in
 quâ quidem, propter volatiliam partium
 penuriam, instar toxici esse solet Phle-
 botomi lanceola. E contrario, cùm op-
 tima præcessit victus ratio, atque æstas
 pertinaciter fervet, ac sicca permanet,
 fructusque abundant maturi; Romano-
 rum in corporibus sulphur, salesque, et-
 iam acres, volatiles tamen, ut superiùs
 monuimus, evehuntur, & subserviunt
 utilitati, ex ipsâ sanguinis missione ca-
 piundæ; quemadmodum contigit hoc
 anno, quo etiam in senibus benè nutritis
 mirum, vel ipsâ docente naturâ, ha-
 buimus experimentum. Dominicus Vec-
 chiottus septuagenario minor, habitus
 plethorici, ac pinguis, fessili vitæ dedi-
 tus,

*In malis nutri-
 tis corporibus
 sanguinis mis-
 sio cur. perni-
 ciosa.*

*In bene nutritis,
 quamvis seni-
 bus, eadem sa-
 lutaris.*

*Mira ad hanc
 rem Dominici
 Vecchiotti ki-
 storia.*

tus, & carnivorus, cùm per mensent circiter capitis gravitate, ac somnolentiâ adeò premeretur, ut in ipso telonio, pecunias numerando, cedulasque scribendo, dormitaret; unde jam in limine apparens timebatur apoplexia; nocte quadam improvisò largâ è naribus correptus fuit hæmorrhagiâ undecim librarum pondere, quâ sanè non modò nullam ipse passus est sensibilem virium jacturam, sed ab illo capitis veterno, se valde levatum sensit; immo post 15. dies, aliis quatuor libris effluentibus, omnino vindicatum. Magnum profectò docilibus Erasistrateis lumen, atque exemplum; ita ut Clarissimus, parique doctrinâ, & facundiâ præditus, Jacobus Sinibaldus, in consilium vocatus, visâ integrâ judicatione, nihil innovandum censuerit, solâ admonitione contentus in diætæ regimine, & præmaturâ deinceps phlebotomiâ, cùm primùm turgentix signa fuerint apparitura.

IX. At enim verò, dum novam hujus libri editionem adornamus, est, ut pleniori diligentia studiosos Lectores demereamur, certiores ipsos facientes de
su-

*Prædictus
Vecchiottus
repentè subla-
tus.*

subitâ præfati Vecchiotti morte , quæ contigit circa solstitium hyemale 1707. cum nullam post gravissimum morbum temperantiam adhibuerit.

*Laudantur
Revellentia.*

X. Secundò , ea pariter omnia in corporibus bene nutritis juvamen attulerunt , quæ ad superficiem , atque ad extremas corporis partes illam revellere potuerunt irritationem , quam in præcordiis , aut cerebro , sub formâ strangulationis canalium , tanto cum ægrorum discrimine incuneatus subtilis ichor moliebatur . Immo hoc remedii genus eò securiùs opem tulit, quò magis irritatio evacuationi ferositatum salino-acrium , tanquam causæ morbificæ , jungebatur . Idcirco ex usu fuerunt non solùm frictiones , & cucurbitulæ , sed phœnygmi quoque , & vesicantia , plantis pedum , artibus , & occipiti statim admota .

*Vesicantia op-
portuna, si va-
sorum ruptura
non adfit .*

XI. Neque porrò dubitamus , quin vesicantibus opus sit in curatione hujusmodi subitaneorum morborum , dummodo à vasorum rupturis non proficiantur . Etenim , cum istorum plerunque causæ malorum sint succi , ex omnino præternaturalibus particulis coalescen-

scientes, motuque penitus inordinato præditi, qui non continvò congruunt cum fecerniculis naturalibus, ad naturales, & consvetos recrementitios humores excipiendos comparatis; necesse profectò est in repentinis hisce affectionibus ad artificialia, & morbosa emissaria recurrere; ut ægri, apertâ per artem viâ, statim id assequantur, quod vix serò, & difficulter naturæ beneficio impetrarent, quæ & ipsa, ubi viribus magis valet, nixu suo, nonnisi novis patefactis viis, nempe per abscessus, laboranti succurrit.

XII. Silentio deinde minimè prætereundum videtur, quod à D. Doctore Mistichello non aspernandum accepimus, nimirum à se observatum fuisse in Xenodochio Insulæ Tyberinæ, ubi curandis ægrotis præpositus est, aliquos de plebe, quos nullum, quantumvis validum, atroxque, remedium à fortibus apoplexiis excitaverat, per admota plantis pedum ignita ferramenta ad vitæ officia subitò revocatos. Scilicet, quemadmodum ^a Claudinus consulit in apoplexiâ, & syncope punctiones volis manuum, & post ^b Fort. Fidel., ^c Henricus

*Eadem sunt
emissaria ar-
tificialia ad
supplementum
nature, &
imitationem.*

Ignita ferramenta, plantis pedum admota.

^a Empyric. Ration. lib. 3. cap. 17.

Punctiones item volis manuum.

^b De relat. Med. lib. 4. cap. 1.

^c Obs. 21.

ab

*Acicula sub
pollice pedis
adaesta.*

*Ignis vis quã-
do à cerebro,
nervisque im-
pactum excu-
sant.*

*Lamina igni-
ta in forti a-
poplexiã com-
mendata.*

*In curatione
coactã valida
non damnanda
remedia.*

ab Heers narrat, se aciculam prælongam inter pollicem pedis sub ungue cujusdam apoplecticæ, nullum vitæ signum præbentis, adegisse, illamque momento citiùs excitasse; ita certò credimus, multò efficacius præsentem ignem, validissimè irritando fines nervorum, maximum in jisdem tremorem, & subtilissimarum partium excursum per eorundem filamenta inducere posse, qui, ad usque principium propagatus, fortiter etiam excutiat quidquid cerebro, & nervorum ostioliis pertinaciter hæret, & per talem dumtaxat maximam nervorum succussionem, & particularum ignearum penetrationem amoveri potest. Quo fit, ut omnes ferè Practici in curatione fortis apoplexiæ meminerint, non tantùm fonticulorum, occipiti, sed etiam laminarum ignitarum, ipsis futuris admovendarum. Ac propterea anilem censemus metum nonnullorum, qui, ne morbi causam, forsitan igneam, excuant, à vesicantium, ignisque usu, in hujusmodi malis, omnino abhorrent. Aliud enim est methodicas, regulares, aut præservativas, aliud coactas,

ctas , ac repentinas morborum curatio-
nes instituere.

XIII. Tertiò levamen pariter non le-
ve porrexerunt jis , qui , post sanguinis
missionem , vel sinè illâ , deglutiendi po-
testatem recuperarunt , ea , quæ alvum
laxare , ac mox validius movere potue-
runt . Atque hinc , si quando infimi ten-
sio , ac renixus ventris (quod sæpe ac-
cidit) occurrebat , statim exhibuimus
oleum amygd. dulcium , & injicienda cu-
ravimus clysmata emollientia , simulque
irritantia . Ubi verò ventris durities aut
minimè deprehendebatur , aut mox per
oleosa cedebat , maximè etiam profuit
pul. Cornacchini , vel aliud validissimum
solvens , cum superhaustu copiosi diluti
ex jure , vel aquâ hordei , ad tollendam
scilicet siccitatem , ac stimulum , qui à
forti cathartico induci solet . Neque sa-
nè de hujus quoque pharmaci utilitate
ambigendum nobis fuisse , visum est per
hæc tempora , in quibus non massa dum-
taxat sanguinis , sed ipsa quoque hypo-
chondria apud ægros multitudine bilio-
so-acrium particularum redundabant .
Quinimo profecit etiam vomitus apud
Bb illos ,

*In abdominis
tensione emol-
lientia irritan-
tibus miscen-
da.*

*Vomitus ali-
quibus profu-
cui.*

illos, qui vel huic affveti fuerunt egestioni, vel ex crudioris adhuc cœnæ pondere laborabant.

XIV. Quartò non leviter juvarunt in curationum progressu ea omnia, quæ aquoso fluido laxante, ac temperato redundant, cujus generis extiterunt potus aquæ, jura simplicia, destillata magistralia, succi herbarum epicerastrarum, emulsiones amygdal. dulc., gelat. C. C., & similia, quæ nimirum tum sales acres, & sulphureos temperare, diluere, atque irretire, tum vel maximè convulsas alicubi vasorum fibras laxare valent. Hæc quidem apprimè congruunt cum jis, quæ, tanquam salutaria experta, proponit ^a Hippocrates in curatione Androthalis, quem, cum aphonîâ, rerum oblivione, ac delirio per intervalla detineretur, levabat post sanguinis missionem aquæ potus, & aqua mulsa; nimirum quia causa morbi erat humor biliosus, & atrabilarius, qui temperantibus mitescit, ut exponit ^b Vallesius. Quâ fanè in re laudarem, ut Clinici sæpe manibus tererent notationes Prosperi Martiani ad Hipp. textum 2. de ^c morbis, ubi per hæc verba ad-

^a 7. epid. n. 83.

*Diluentia r̄.
perata, &c. ab
Hippoc. etiam
laudata.*

^b In com. præd. hist.

Martiani præceptum in aëroplethiciis curandis.

^c Verf. 64.

adversus eos, qui in apoplexiæ curatione calefacientibus utuntur, exclamat: – Videant posteriores, quantum à Preceptoris doctrinâ, & ex consequenti à veritate recedant, dum cujuslibet apoplexiæ causam, aut saltèm pro majori parte, in pituitam frigidam, & humidam referentes, curationem perpetuò calefacientibus, & exiccantibus instituunt; quandoquidem, factâ totius corporis purgatione, si morbus præbet inducias, ad vulgata sua decocta ex guajaco, sassafras, aliisque similibus, tanquam ad columnas Herculis, confugiunt; cum animadvertere deberent, ex tribus apoplexiæ speciebus unicam tantùm, Apoplexia in frigidis succos raro referenda ex Hippocr. & rarò contingentem, in frigidos succos, Hippocratis consilio, referendam esse.

XV. Tandem non tenuem opem tulerunt ea, quæ benignè discutunt, mitesque spiritus refocillant, & expediunt, Multi generis volatilia, & cordialia in usum vocanda. cujus ordinis sunt tincturæ ex confect. de Hyac. & Alchermes; guttulæ aliquot spiritus ceras. nigr., vel mannæ, quem vitæ appellant; itidem tinctura auri, absque menstruo corrosivo parata; ut etiam sales volatiles cornu cervi, cranii humani, succini, & similium, quæ sanè largo semper haustu fluidi aquei

miscabantur . Profuerunt pariter theriaca, castor., & spirit. salis armoniac., naribus, ac temporibus admota ; ita tamen, ut perpetuò caverimus à volatilibus purè vinosis, aliisque sincerè, hoc est absque copiosi fluidi admixtione, per os exhibitis.

*Non tamen
vinsa.*



OB-

OBSERVATIONES

Physico—Medicæ

NONNULLORUM,

Qui, cùm primùm istiusmodi re-
pentinis morbis tentati fue-
rint, feliciter evaserunt.



*ED jam observationes aliquot
adjiciamus, & summatim
describamus historias nonnul-
lorum, qui Medicæ Artis mi-
nisterio à gravissimis hujusmo-
di morbis vindicati fuerunt,
quorum curationibus unà cum Præstantissimis
Urbis Physicis interfuimus, & ex quibus ad
consimiles casus exempla, & documenta pe-
tantur.*

OB-

OBSERVATIO I.

*Apoplexia cum aphoniâ , & paralyfi dexterâ
corporis medietatis , pblebotomiâ ; ca-
tharticis , ac diaphoreticis soluta .*



PRimus , vel certè dignior , maximèque suspiciendus , qui , inter Nobiles , elapso anno , vim mortis evasit , fuit Illustrissimus , ac Reverendissimus Archiepiscopus Bottinus , Vir octuagenario major , probitate , ac doctrinâ insignis , habitus sanguineo-carnosi , miræque morum sva- vitatis . Hic , post gravia animi pathemata , quæ in sublimioribus ingeniis non raro effervescent , mediâ æstate anni 1705. , subijt intensiora quædam studia , indè que passus fuit capitis excalefactionem , & suppressionem consvetæ per os matutinae evacuationis viscidulæ lymphæ .

II. Tandem circa initium Augusti , post capitis gravitatem cum levi manuum tremore , apoplexiâ correptus fuit , à qua evasit , succedente paralyfi totius dex-

dexteræ medietatis, ac persistente aphoniâ, quam sanè cum injecti clysteres, exhibiti sales volatiles, admotaque femoribus, brachiis, & nuchæ vesicantia tollere nequirent, profectò mirabiliter, quòd repentè acciderit, una solvere potuit missio sanguinis ex sublingualibus venis. Et quoniam supervenit ab initio febris, plura exhibita fuerunt pharmaca, partim alvum moventia, partim diluentia, ac benignè dissolventia, inter quæ postrema primas tenuerunt stibium diaphoreticum, ad viginti dies continuatum cum jure ex herbis alkalicis; nec non guttulæ spiritus, quem vocant vitæ, ex mannâ sublimatum; & quædam oris ablutiones actu calidæ ex decocto emollienti, & cephalico, additis nunc sale prunellæ, nunc spiritu salis armoniaci. Quibus remediis & multa per alvum biliosa recrementa, & copiosi sudores eruperunt. Sed, quod maximi interfuit, antiqua revocata est tenacis lymphæ per os excretio; sicque Æger, qui nunc sextum supra octogesimum implet annum, simplici falsæ infusione tractatus, edufque meliùs paulatim processit, ut spatio quin-

Aphonia sublingualis venarum incisione curata.

Oris collusiones in aphonia.

Muris montani adeps ad paralyſim.

quinquaginta dierum è lecto furrexerit; illo etiam crure, quod ſyderatum ab initio fuerat, ad ambulandum ſoluto. Deinceps verò, cùm affectum brachium fricari cœpiſſet manibus, inunctis adipe muris montani, quem Matthiolus italicè vocat *marmontana*, tantùm profecit, ut modò epistolâ ſuâ manu ſubſcribere, & Miſſæ Sacrificium ritè poſſit celebrare.

III. Simile commodum per hæc tempora ex eodem montani muris adipe (quantùm ex aliorum relatione novimus) reportavit dives etiam in Urbe Senex, qui poſt præteritam apoplexiam, atque aphoniam, contumaciſſimâ paralyſi detinebatur. Hic enim adeps mirè valet ad ſolvendum quidquid extremis tubulis, ac villorum poris hæret impactum, ſimulque ad emolliendas muſculares artuum fibras.

IV. In hac verò Præfulis medelâ, quam in ultimo ſenio fuiſſet conſtitutus, diligenter obſervavimus utilitatem ex phlebotomiâ, & prodigio ſimilis nobis occurrit linguæ ad loquendum ſolutio, eo ferè momento temporis contingens, quo ſanguis ex venis raninis affatim fluebat;

bat ; indicio certè admodum evidenti ,
 morbum ex interceptione vasorum sanguinis ad cerebri potissimùm basim , &
 ad linguæ radicem , adglutinante mucosum ortum habuisse , quâ solutâ interceptione ,
 contiguum , & continvorum nervorum libertas emicuit , quam ex earundem sectione venarum videtur spondere * Simon Paulli in quodam Consilio ad aphoniam .

Raninis incisissimis , cur statim loquela redierit .

** adnex. ad calcem tract. de feb. malig.*

V. Huic verò curationi interfuerunt Viri Clarissimi DD. DD. Placentius , Manfredus , Bernardini , & ipse ego , jussu CLEMENTISSIMI PONTIFICIS , qui egregii hujus Præsulis jacturam gravissimè ferebat .

VI. Hic fortasse non incongruum alicui videbitur inquirere , quid fiat , ut crura , & pedes , paralyti tentata , solvantur faciliùs , quàm brachia , & manus , quam hæc tum cordi , tum cerebro proximiora sint illis ? Qui hujusmodi problema ad eruditionis pompam excitatum velint , consulant ^b Schneiderum . At nos , compendii , & veritatis pro viribus amatores , arbitramur , potissimam causam facilioris solutionis paralytis in cruribus

Cur crura , & pedes , paralyti tentata , faciliùs solvantur , quàm brachia .

b De paraly. cap. 8.

*Prima ratio
ex perpendiculari
vasorum
directione.*

esse directionem vasorum tum sanguinis, tum spiritus animalis, proximè ad perpendicularum positorum; contra verò causam curationis difficilioris in brachiis esse positionem vasorum transversalem, per quam eadem constituuntur ad rectos, vel rectis proximos angulos cum arteriâ magnâ, venâ cavâ, & spinali medullâ. Liquida enim, quæ per directionem, perpendiculari proximam, fluunt, expeditius moventur, & impedimenta, quæ ipsis objiciuntur, promptius amovent, quàm eadem liquida, si flexuoso, atque angulari itinere devolvantur. Hoc sanè ante oculos positum est in scrobiculis, atque hydraulicis canalibus, quos cœnosarum aquarum remora penè interclusit. Etenim illi, qui in directum cum ipso immissario positi sunt, sensim ad auctâ influentium lympharum copiâ, citò, ac facilè referantur; secus aut tardè, aut nunquam ab infarctu liberantur, qui transversim, & obliquè ad angulos vel rectos, vel rectis proximos positi sunt. Nimirum quia in illis fluidum, quod excurrit, majori velocitatis momento instructum, seu minori obstaculo-

lorum occurſu retardatum, quidquid lateribus canalium adhæret, validius abſtergit, & abripit.

VII. Ad hanc fanè vaſorum rectitudinem reſpexiſſe viſus eſt ^a Hipp., cùm ſcripſit, torporem tibiærum, & crurum, ^{lib. de morb. Virg. n. 2.} in quem incurrunť qui, longo tempore deſidentes, fluxum ſanguinis ex coxis, ^{Utilitas ex vaſorum rectitudine, Hipp. cognita.} ac femoribus intercipiunt, facilè ſolvi, *cùm ſanguis ad ſe ipſum redierit: citò verò propter venarum rectitudinem refluit.*

VIII. Accedit etiam ad faciliorem ſolutionem, quòd arteriarum, & nervorum, qui ad infernos artus deferuntur, ^{Altera ratio ex majori diametro canalium.} trunci, diametro majores ſunt iſis, qui ad ſupernos artus diſtribuuntur: quo fit, ut tum major influentium liquidorum copia, tum validior viſ contractiõnis, ſeu periltalticæ motionis vigeat in illis, quàm in iſtis, ac proindè partes illæ aptiores ſint diſſolvendis, propulſandisque craſſis, atque hærentibus ſuccis.

OBSERVATIO II.

Fortis Apoplexia cum relicta paralysi feliciter curata in Matronâ sexagenariâ.



Matrona quædam nomine Cherubina Leopardi, corpore subpingui, sexaginta annos nata, ob suorum probitatem morum, eximiasque virtutes, annis profectò digna Nestoreis. Hæc diù spasmodicis circa collum, & pectus doloribus, levique vertigine divexata, meliùs interdum se habebat, cùm sanguis flueret ex hæmorrhoidibus, quibus restitantiis, & præcurrentibus alvi torminibus, ac fluxu, deinde verò sinistrorum artuum contractionibus, pridie Kalendas Decembris 1705. in subitam incurrit apoplexiam, quæ externos, internosque sensus proprio usu, partesque omnes motu privavit; sed, adhibitis illico cucurbitulis, ustione, suppositoriis, vesicantibus dexteris artubus, & cervici, admo-
toque naribus spiritu falis armoniaci, bal-

Suppressis hæmorrhoidibus, fortis apoplexia.

balbutiens respuit Matrōna , quæ fequenti mane , hausto syrupo persico , laudabiliter purgata est . At verò , cùm adhuc gravi sopore detineretur , etiam post paralyseos decubitus ad sinistras corporis partes , accersor ipse , & facti conscius , non dubitavi cum Solertibus Physicis curantibus D. D. Pierleono , & de Rubeis , quin ex hæmorrhoidali restitante hæmorrhagiâ , atque ex acri , sulphureâque hypochondriorum saburrâ atrox malum magnâ ex parte penderet . Quoniam verò sales volatiles viper. , succin. , cornu cervi , cranii humani , aliaque cephalica calida minimè conducerent ; propterea mariscas aperiri , iussimus : quæ phlebotomia utilitatem attulit , cùm indè , amotis imi ventris repagulis , sanguis liberiùs per vasa moveri cœperit , unde febris non sinè magno levamine excitata fuit . Ægra enim , quæ priùs ferè muta , obtusa , inersque sensibus fuerat , loquacissima evasit . Sed cùm facilè in soporem recideret , idcirco syderatis etiam artibus , nova admotâ sunt vesicantia , quæ affluenter , & commodè viscidulâ lymphâ per octiduum man-

*Isidem arte
revocatis, mor.
bi diminutio.*

*Vesicantium
utilitas etiam
syderatis ar-
tibus .*

na-

narunt. Interea temporis, cùm nondum cerebrum integrè, extranea sibi, fluida remisisset, juvit præbere pilulas de succino Cratonis, atque adjicere frequentes clysteres: cùmque sitis urgeret, largas potiones hausit ex jure cornucervino, & aquis cephalicis. Demum transactâ trigessimâ die, & repetitis pilulis de succino cum flor. cassiæ, tantùm solâ infusione eboris, & salsæ processit, ut mitiori superveniente veris tempestate, ac proinde, liberiori succedente transpiratione, ad consuetum civilis vitæ usum, propriis innixa pedibus, redierit.

Salsæ infusio.

II. In hac profectò Matronâ vim humoris penè furentis, quem Prisci vocant melancholicum, atque atrabilarium, apertè observavimus. Acre enim, ac sulphureum fermentum, ab hypochondriis per venas ad præcordia, & cerebrum exaltatum, loca omnia, per quæ gradiebatur, & in quæ decumbebat, miris modis, doloribus videlicet, vertigine, convulsionibus, apoplexiâ, sopore, & febribus affecit; ut nullum fuerit dubium, quin Oraculum Hippocratis novam semper veritatis lucem ab experimentis mu-

*lib. de flat.
n. 4.*

mutuetur, morborum nempe omnium unum, eundemque modum esse, ipsum verò locum illorum differentiam facere. Etenim, quam colli, & pectoris dolores, vertigines, alvi fluxus, motus convulsivi, apoplexia, & paralysis, propter locorum diversitatem, nihil inter se simile habere videantur; una tamen sæpe, eademque est, ut idem subdit Hippocrates, illorum species, & causa.

Morbi ex loco tantum differunt juxta Hipp.

III. Illud insuper circa vesicantia ad memoriam hîc revocandum censemus, quod postremo hujus lib. cap. monuimus, scilicet magnam ex jis utilitatem evacuatione viscidulæ, acerrimæque lymphæ in hujusmodi casibus præstari posse; quia nimirum validius est remedium, ad omnino præternaturalem humorem extrahendum, morbosa emissaria subito artificio aperire, quàm, inani spe, illius concredere evacuationem ordinariis secerniculis, quæ, cùm consveta sint non nisi sensim congruere cum fluidis, mixturâ, ac motu naturali gaudentibus, nec subitò, nec tutò præternaturalibus excipiendis liquidis aptari possunt: parandumque propterea est jis Clarissimis

Vesicantia secerniculum excitant, liquido præternaturali expurgando idoneum.

Solis secerniculis naturalibus cur non semper morbofi liquidi repurgatio concredenda.

Vi-

Viris, qui, in factitandâ Medicinâ nunquam vesicantibus utentes, illorum vim experiri, ac suspicere non possunt. Unde in subitaneis morbis sæpe accidit, ut, dum Medici solius consopitæ naturalis œconomix munera formidolosè promovere student, ægri properent ad interitum.

OBSERVATIO III.

Subita capitis occupatio cum aphonix ex affectione cerebri partim idiopathicâ, partim sympathicâ prosperè cedens.



Everendissimus Pater Alderanus Malaspina, Abbas Sancti Pauli ex Benedictinâ Familiâ, sexagenario major, corporis habitus mediocris, ingenio constanti, ferioque, cum ex variis per Italiam itineribus, curisque animi, malignam febrim Cæsenaë, ni fallor, ante annum contraxisset; indèque valetudinarius de hypochondriorum plenitudine, de stomachi cruditatibus, deque capitis dolore, Mu-
ti-

tinam profectus, quereretur; tandem summâ hyeme anni 1706. Romam venit, ubi, cum fortè paulò largiori uteretur victus ratione (quæ, tametsi plerisque Flaminia, & Gallia Cispalinæ Incolis ita sit innoxia, ut, propter subtilissimum illius cœli temperamentum, potiùs sit necessaria; in Urbetamen, potissimum apud illos, qui sessilem vitam in studiis plerunque ducunt, semper est periculosa) accidentibus etiam principio sui ministerii pluribus, tædioque plenis laboribus, incidit in comatis speciem cum aphoniâ, ad quam curandam accitus Eruditissimus Joh. Trullus, unâ cum aliis Cœnobii Physicis, statim catharticum, variaque cephalica, prudenter exhibuit. Cùmque postridie, ob mali momentum, ipse quoque in consilium adhibitus fuerim, non dubitavi, quin morbus partim esset sympathicus ex stomacho, & hypochondriis, partim idiopathicus, ex languidiori reddito membranarum, vasorumque capitulis tono, hærenteque crassiori lymphâ ad cerebri præsertim basim. Unde tria potissimum, pro abigendâ ægritudine, omnium consensu, decreta fuerunt re-

*Vicius plenus
Romæ quibus
præsertim no-
xius.*

*Curatio Co-
matis ex con-
sensu Stoma-
chi, & capitis.*

Dd me-

media, scilicet primò citissima phœnyg-
morum admotio femoribus, brachiis, &
cervici; secundò epicratica purgatio cum
pilul. ex rhabarb., pulv. stomach. Quer-
cet., & granis scam. sulphur., succini, &
castorei; tertio omnimoda vini subdu-
ctio: quibus sanè auxiliis, intrà trigin-
ta dies convaluit. Sed, cùm post vernum
æquinoctium ad Monasterii curas pro-
perè, atque adhuc impotens rediisset,
improvisò in aphoniam recidit, quæ, li-
cèt comati non jungeretur, adhuc tamen
futuræ apoplexiæ metum assidentibus in-
cussit. Sed, propinato statim pulvere
Cornacchini, novisque admotis femori-
bus, & occipiti vesicantibus, feliciter,
citiùsque revaluit. Et quoniam languor
stomachi pertinaciùs urgebat, idcirco
plùs viginti dies hausit magno cum fru-
ctu jus pipionis turratil., in cujus ventre
parum lignorum sassafras, & visci quer-
cini, cum rad. & herbis deobstruenti-
bus, stomachicis, & cephalicis inclusum
fuerat.

*Ad stomachi
languorem jus
appropriatum.*

*Pbleteromia
cur. cu. sic
causa*

II. In hoc sanè Præsule cùm subitus
capitis morbus vitio tum primæ digestio-
nis, tum collectæ in universo corpore,
sed

sed in cerebro præfertim, lentæ, ac viscidulæ lymphæ ortum habuerit; nullâ mentio de mittendo sanguine facta fuit, ac solerter utilitatem, ex alvum solventibus, atque ex vesicantibus reportandam, loco phlebotomiæ, constituimus, ut de Ægro nobis pollicebamur. Et quoniam religiosissimus Vir, congruâ deinceps corporis exercitatione, diætâ, atque purgatione per epicrasim usus fuit; idcirco firmiùs sanatus est.

OBSERVATIO IV.

*Apoplexia cum affectione epilepticâ, & synco-
pali in paralyfim dexteræ medietatis cor-
poris, salvâ tunc Ægri vi-
tâ, concedens.*

Illustrissimus, & Reverendiss: Bartholomæus Spada, Cam. Apost. Clericus, & Basilicæ Vaticanæ Vicarius, annorum 50., staturæ proceræ, habitus ad gracilem tendentis, moribus seriis, ac religiosis, lin-

guâ ab infantiâ paululùm tardus , ster-
no admodum depresso , convulsivoque
asthmâti per intervalla obnoxius , cui
fluida demulcentia semper profuerunt ,
cùm ferè ante annum ex duabus , sibi diù
consuetis , evacuationibus , sanguinis ni-
mirum hæmorrhoidalis , necnon acris
narium mucii , illam haberet , si non val-
de diminutam , saltèm non largè fluen-
tem , hanc verò penitus suppressam (for-
sitan ob inspirata recentis effluvia calcis,
ex novo , juxta quem incautè dormivit ,
muro) paulatim , præterito autumnò ,
fluxionem rheumaticam , erraticamque
febrim incurrit ; indèque , collectis apud
hypochondria , & præsertim lævum ,
tensivis obstructionibus , res eò devenit ,
ut febris , ac dolores contumacissimè re-
dierint . Sed Medici antiquæ memores
utilitatis , ex fluidis reportatæ , illum va-
riis temperantibus curarunt ; quinimo
usû etiam chinæ chinæ tum febris , tum
dolores penitus exularunt . At , cùm
Æger , pietate , ac lege sui muneris im-
pulsus , integram Sanctissimi Natalis no-
ctem anni 1705. in Basilicâ Divi Petri ,
frigore , atque inediâ tortus , pervigilaf-
set,

*Suppresso na-
rium mucii ex
recentis calcis
effluviis .*

set , postero die gravi febrî , cum acutissimo in coli flexurâ dolore , corripitur , cui licet oleum amygdalinum , externaque fomenta , & clysteres opportunè profuissent ; attamen vix hebdomadâ morbus quievit , quâ transactâ , atrox sub poplite dolor subitò invasit , qui pariter laxantibus cessit . Post hæc , secundo Februarii 1706. , dum , flante boreâ , valetudinarius publicè Sacris adesset , ob inopinatum animi deliquium , domum reducitur , & sequenti nocte immani tentatur dolore circùm dexteræ mandibulæ articulationem cum faucium phlogosî , à quo malo exemptus fuit cucurbitulis scarificatis , fomentis anodynis , injectisque clysteribus .

II. Sed , cùm Æger fortasse nunquam se meliùs , quàm die 18. ejusdem mensis , habuisse videretur , proximè cœnaturus , Vagi externorum partium dolores tandem in apoplexiam cedentes . apoplexiâ repentè corripitur , post irregularem totius corporis motum , cui dexteri brachii syderatio , oris tortura , auctaque linguæ hæsitatio illico successerunt . Accurrunt Medici , & prætumidam , ac subrubram illius faciem , confvetumque hæmorrhoidum fluxum perpen-

pendentes, jubent, mitti sanguinem ex talo : cùmque constaret, fluidum acre, olim per nares excerni solitum, hâc il- lac pererrasse; consultò admoventur ve- sicantia femoribus, & cruribus, nihil- que omiserunt, quod succorum acredi- nem mulcerè, tonumque cerebri firma- re potuisset. Neque verò ullum de ex- hibendo statim cathartico consilium fuit, cùm hypochondria subtenfa, atque irri- tata, benignam laxantis pharmaci facul- tatem subitò postularent. Hinc exhibi- tum oleum amygdalinum cum syrupo violato, indèque injectis fortibus clyste- ribus, copiosè fluxit alvus. Sed, cùm om- nia feliciter progredi videbantur, postri- die prætumida, ac subrubra recurrit fa- cies, turbatur mens, convelluntur labia, atque artus; mox in syncopem recidit Ægrotus, quem propterea sinè pulsu, re- spiratione, ac voce, lugent, ut mortuum. Recens hoc mali augmentum docuit, ex hypochondriis, per albas, rubrasque venas, liquida, fibras irritare, & con- vellere apta, in præcordia, atque in ce- rebrum, indèque per nervos in univer- sum corpus erroneo motu transduci : un- de,

*Hypochon-
driorum tenfio
sublata.*

*Synopsis, &
convulsionum
recursus unde.*

de , excitato priùs Ægro à paroxysmo cum spiritu falis armoniaci , & oleo Matthioli , omnium consensu Curantium , Horum curatio extra paroxysmum . propinatum fuit pharmacum ex infusione fennæ , & tartari cum syrupo violato , præmisso bolo ex stibio diaphor. , cui accesserunt antepileptica , ex cinabari nativâ , & succino , atque , ob gracilem Præsulis habitum , copiosa , ac temperata diluta .

III. Cùm verò in hac morbi recrudescentiâ oculi subtensi , ipsaque taciturnitas satis admonerent , cerebrum minùs per venas refudisse , quàm accepisse per arterias ; idcirco novum occipiti vesicans admovendum judicavimus , quibus remediis Æger circa mentis operationes meliùs se habuit , urinis redditis circa septimum copiosis , atque interdum etiam stranguriosis .

IV. Sed , quanquam serositates acres , Morbi ad exteriora converso . ex vesicantibus largè fluentes , unâ cum rubicundis quibusdam herpetibus sub affectâ scapulâ , & circa dexteram dorsi partem spontè abortis , multum de præcordiorum , & cerebri infarctu extra corpus derivasse visæ fuerint ; nihilominus

nus tamen recurrentes pulsus inæqualitates, urinæ stranguriosæ, rubor faciei, circumtensivus capitis dolor, oculorum immobilitas, splendor, ac strabismus, denique taciturnitas, ac subobscuræ motiones mentis non mediocrem incutiebant metum, ne acerrimi succi, qui in cerebro, & hypochondriis pertinaciter adhuc intercipiebantur, mortiferas syncopes, & epilepsias aliquando renovarent. Quâ de re ad istam causam magis diminuendam purgans benignum, duodecimâ die, repetitum fuit, & hirudines mariscis, præter solitum tumidioribus, ante 14. admotæ sunt; non omissis frictionibus, pediluviiis, & laxantibus, subtenso abdomini adhibitis.

*Synopsis, &
epilepsia peri-
culum detra-
ham.*

V. At verò, licet omnia sensibili fructu ad usum venerint, nondum tamen sævitia morbi pelli omnino potuit; etenim à die 13. usque ad 20. non semel syncopes, vaniloquia, & convulsivi motus redierunt; quorum sanè potior malorum causa, superatis tandem præcordiorum anfractibus, cerebrique flexibus, per nervos extra cranium fuit paulatim detrusa, atque in femore, & crure dextero

tero intercepta , quibus in locis paraly-
sim, tanquam opportunum decubitus, Ab his oppor-
tunus transi-
tus in paraly-
sim.
induxit.

VI. Interea temporis nulli non Curan-
tium perspicuum erat , mixtum hunc
morbum ex apoplecticâ , epilepticâ , &
syncopali affectione in Viro gravi , &
melancholico , à sanguine , miscellâ fa-
lium lixivialium , & impuri sulphuris
imbuto , atque infecto , potissimum pro-
duci , ideoque locum habere illud ^a Tral- a lib. r. c. 16.
liani, quo monitos vult Medicos, ne in
curatione paralyseos decipiantur, sumen-
tes (loquitur enim juxta vulgarem sui
temporis hypothesein) calidam causam
pro frigidâ . Idcirco unicè studuerunt di-
luere hujusmodi penè igneos sales, exhi-
bitâ aquâ Nucer. , nunc simplici , nunc
in speciem juris, aut emulsionis, nec non
tentatis balneis aquæ dulcis . Sed profe-
ctus nonnisi incerti , ac diarii usque ad
27. extiterunt . Quapropter ad deplenda
cerebri vasa , quæ splendidis , rubenti-
busque ex oculis tumentia perspiciebantur ,
applicitæ fuerunt hirudines ad ve- Hirudines na-
ridus applici-
ta salutarer .
nas narium ; indèque vaniloquium , at-
que infomnium magnâ parte remisit .

Ee

Cùm-

Cùmque persistens capitis gravitas , dolor , ac taciturnitas arguerent hærentem in membranis , & intrâ cerebrum acerriam lympham , quâ olim illius nares manabant , eâ ratione tunc nova dedimus antepileptica , partim ex *crystall. mont.* , *corall.* , & *rad. valer.* , partim ex *pane* , & *croco metallor.* , juxta *Quercet. normam* , parata ; & præcipuè setonem cervici admovimus , cujus ex ulceribus crassa , copiosa , & acris fluere cœpit fannies , ut brevè , depleto cerebro , graviora ejusdem symptomata mirabiliter cesserint .

*Seto cervici
utiliter admo-
tus .*

VII. His certè auxiliis , & omnimodâ vini abstinentiâ compefci , non planè profligari morbus passus est . Cùm enim fluida junguntur solidis ad maleficia , oporteret , Medicum permutare posse totum hominem , ut prudenter scripsit *Aretæus* , quod nec Diis suis facile fore , putavit . Itum igitur , nunc arefcentibus , nunc revirescentibus symptomatibus , usque ad 50. diem , quo tempore præcordiorum , & cerebri mala , aperto etiam spontè in coccyge tuberculo , majori parte sedata sunt .

*Medici labor
in solidorum
morbis .*

VIII.

VIII. At enim verò, post factas cum morbo multorum mensium inducias, urgebant tamen Ægrum primò invincibilis paralyfis dexteræ corporis medietatis; secundò summa gracilitas cum lentâ feбри, & pulsu frequenter inæquali, ad tabem festinans; tertio animi angor, in unâ præsertim cogitatione reassumendi publica sua officia defixus; quartò alvi stypticitas; quintò recurrentes interdum præcordiorum contractiones cum anhelitu; sextò voracitas, & impatientia ciborum, quibus, etiamsi affatim devoratis, Ægrotus nihil proficiebat: Alimenta enim, etsi copiosa, quæ ab ore in ventriculum, acris irritatione fermenti, jucundè descendebant, à ventriculo tamen, atque intestinis minùs defæcata, immo vitiatâ mixturâ, minori, quàm par est, mole per galaxiam, ad marasimum avertendum, ascendebant. Tandem ea etiam ulcerosa lassitudo, viriumque imbecillitas vexabat, quæ nullum corporis motum, nullam vel minimùm actuosam medicamentorum facultatem sustinere poterat.

IX. Quare, cùm mecum Optimi Ro-

Ee 2 mæ

mæ Medici rursus in consilium vocati fuerint DD. DD. Placentius, Sinibaldus, Saxus, & Gattuccius, quorum unanimi consensu, omnia etiam initio morbi decreta fuerunt; statuimus, Medicam Artem vehementes istius mali impetus obtundere potuisse, morbum tamen prorsus tollere nequivisse; atque idcirco Nobilem Virum jis adscripsimus, qui morbo succubuerunt, quorum integram curationem nemo sciens, ac prudens citra immaturum Ægri periculum, Artifque dedecus tentare audeat; propitio interim Numini tribuentes, subitaneum, semperque atrocius recurrens malum, quod Romæ tot, tantosque repente sustulerat, nostro adhuc Præsuli pepercisse.

Æ T I O L O G I A.

Nemo involuti hujus morbi ætiologiam apprimè poterit intelligere, quin attentè perpenderit, apud ^a Hipp., morbos in jis corporis partibus statui, atque firmari, quæ antea laboraverint; simulque adverterit ejusdem ^b Hippocratis monitum,

^a ex aph. 33.
lib. 4.

^b a. de morb.
popul. scēt. 1.

tum , occasiones nimirum , unde quis ægrotare cœpit , considerandas esse . Et enim cùm Illustrissimus Præsul ab incunabulis linguâ parumper hæsitaverit , sternoque depressus , convulsivo asthma- ti fuerit obnoxius ; proculdubio cerebri simul , & præcordiorum insito , atque innato structuræ vitio ipsum laborare , necesse fuit . Nil igitur mirum , si prædictis visceribus , jisque appensis vasis novissimè incubuerint morbi , quorum sanè causa petenda maximè videtur ab occasione suppressionis narium fluoris , qui , cùm copiâ , atque acredine suâ^a cerebrum , & massam sanguineam perpetuò defæcaret , statim atque ob haustos recentis calcis vapores substitit , easdem partes cœpit inquinare . Et quoniam ab initio quodcunque vigeat robur in vasculari , ac musculari texturâ præcordio- rum , & cerebri , simulque morbida fluida nondum ad summam plenitudinem , summamque acridinem evecta erant ; decubitus ad artus , atque ad imi viscera ventris solummodo contigerunt . Sed postquam præcordia , ac nervorum principium paulatim languidiora reddita ,

flui-

*Morborum oc-
casiones persi-
denda ex Hip.*

*Ingenitum or-
ganorum vitium
in Ægrotan-
te.*

*a Huc confer-
que scribit D.
Valsalva de
foraminibus
expellentibus
morbosa fluida
ex cranii
cavitate per
aures, nares,
& os, in tract.
de Aur. Hum.
cap. 5.*

*Vigentibus ce-
rebro, & præ-
cordiis, morbi
ad artus, &
abdomen de-
truso.*

*Jisdem lan-
guentibus, mor-
bose materiae
retrocesso.*

fluida verò copiosiora , & vitiosa magis fuerunt ; repentè epilepsia , atque apoplexia , deinde etiam syncope subortæ sunt : quarum certè affectionum generos modos is digito quasi tetigerit , qui magni textum Hippocratis lib. de ^a flatibus , tacitâ circulationis lege ibidem utentis , diligenter expenderit ; dummodo quod ipse aeri , tanquam istorum causæ morborum , adscribit , acerbis liquidis tribuendum didicerit . Sanguis enim , acerrimorum miscellâ salium foedatus , nativam volatilitatem , suamque dulcedinem amittit , & consistentiâ , ac superficie evadit inæqualis , ut demum vasa ipsa irritare , & corrugare sit potens ; atque ita duabus de causis , suâ nempe , ac vasorum , in præaffectis partibus sibi cursum perturbat . Unde *alio quidem loco* (sunt verba Hippocratis) *sanguis consistit , alio lentius penetrat , alicubi autem citius* . Quâ sanè factâ inæqualitate transitus sanguinis per cerebrum , & præcordia , omnigenæ inæqualitates , & ægriitudines artuum , pulsuum , respirationis , atque animorum in hominibus contingunt .

^a n. 21.

Sanguine vitioso, quomodo circulationis inæqualitas succedat.

Hippocr. testimonium.

II. Verùm , ubi contumax est inæquali-

litas motus sanguinis in cerebro, ac medullâ oblongatâ, sæpe partes aliquæ fluidorum minoris motus intrâ, & juxta horum, aut illorum nervorum texturam, aut motricium fibrarum utriculos, atque intermedia spatia vel urgentur, vel subsident, & impingunt, & tanquam capita mortua ferè indissolubiler figuntur; indè, juxta nervorum discrimina, varias paralysis species inducunt, quæ, in nostro casu, primùm brachii dexteri, deinde etiam femoris, & cruris ejusdem lateris extiterunt.

III. Sed, dum hæc scribebamus, quasi gratulantes, metum dissimulare minime potuimus, ne aliquando syncopis, vel epilepsiæ simul, atque apoplexiæ insultu correptus Æger, diem suum obiret ex tempore. Quod sanè prognosticum impletum vidimus die VII. Kalend. Octob. 1706. Etenim Pater post crescentem ulcerosam lassitudinem, ac sæpe recurrentem syncopem, vehementissimâ vexatus sinistra medietatis epilepsiâ, non sinè Amicorum lacrymis decessit. Ubi notandum, per octiduum ante mortem intenso crurum frigore, ab aliqua-

Quomodo paralysis in his contingat.

Æger hujus interitû quem præcesserint.

quali œdemate tumidorum , fuisse detentum; quo tempore lotium turbidum, crassiusculum , nec magnâ copiâ reddebatur; aderat inappetentia; & spirandi quædam difficultas identidem vexabat cum laryngis , & præcordiorum sensibili strangulatione . Quare ne ad plenam istius ægritudinis cognitionem quidquam desiderari possit , ea , quæ in cadavere observatu digniora comperimus , breviter subnectemus.



DIS-

DISSECTIO CADAVERIS

Illustrissimi Præsulis Spadæ

Sub die 26. Septembris 1706.

Coram Excellentissimis DD. Doctoribus Sini-
baldo, & Saxo, me quoque præfente,
ac omnia diligenter adnotante.



Inchoatâ itaque sectione à capite, quod malorum potissimum theatrum habebatur, vidimus duram matrem albam, contractam, atque in anteriori parte corrugatam, quâ deindè amotâ, occurrit pia solito crassior, flavoque hic illic muco foedata, cujus è vasis, plùs justo dilatatis, subobscurus magnâ copiâ exundaverat sanguis, qui, in grumos concretus, hærebat fulcis dexteri præsertim cerebri hemisphærii usque ad corpus callosum. Sinus interim duræ matris omnino vacui, multisque

*Morbosa dura
matris contra-
ctio.*

*Glandularum
racemi ad e-
jusdem sinus.*

sparsim racemis glandularum miliarium referti conspiciebantur. Substantia tam corticis, quàm medullæ cerebri, fluidior,

Ff &

*Dexterum cor-
ticis cerebri
hemisphaerium
sinistro minus,
& flaccidius.*

& , dexterâ præsertim , atque anteriori parte , minor , ac depressior erat . Diametri ventriculorum anteriorum aliquantò naturali statu majores occurrerunt . In dextero ventriculorum cruenta serositas continebatur . Nervi optici paulò graciliores . Cerebellum mollius pariter , ac flaccidius ; in cujus , atque in cerebri basi venulas aliquot varicosas offendimus .

II. Ad ventres mox inferiores descendentes , animadvertimus universum corpus insigni tabe consumptum cum pedibus œdemate affectis , & , reseratâ per cultrum intrâ abdomen viâ , gracilem ; ac nigram quandam membranam omenti vicem gerere ; stomachum , atque intestina optimi coloris , & substantiæ . Hepar neque mole , neque consistentiâ , aut colore à naturæ lege admodum devium ; bilis tamen cystica fluidissima , & subviridis occurrit . Pancreatis glandula mole major , ac durior . Lien parte , quâ maximè lymphatica excurrunt , duobus cinereis steatomatibus erat induratum , cæterâ sanus . Renes , omnium judicio , incolumes , excepto cortice , qui subobscuri coloris evaserat .

III.

III. Denique secto , atque elevato sterno , utraque thoracis cavitas cruento latice redundabat. Pulmones quædam subnigræ maculæ variegabant , quas , cum attentius observaremus , figurâ serpentinâ præditas aspeximus ; ac proinde non dubitavimus , quin illæ extrema essent vasa sanguinea , quæ in exiguas varices abjerant . Pericardium brevius undequaque superficiei cordis adhæserat , omni penitus lymphâ exinanitum ; in cuius sanè internâ facie , à corde per vim avulsâ , inæqualia , atque alicui nostrum duriuscula etiam corpora , obstructarum glandularum speciem referentia , visa sunt . Cor , quanquam exterius nihil spectabile patefaceret præter aridiusculas , & fulcis quibusdam per longum exaratas fibras ; interiùs tamen (etiamsi sanguine , ac polypis omnino vacuum) raram certè , ac memoriâ hominum æternum duraturam rem nobis exhibuit ; scilicet ad ostium arteriæ magnæ in singulis valvulis semilunaribus aderant inæqualia quædam , ac exigua sarcomata , quæ in fimbrias , ac lacinias , instar condylomatum protensa , intrâ aortam inclinabant ;

Pulmonum varices.

Cordis sarcomata in semilunaribus valvulis.

bant ; neque interim à valvulis , citra scissuram , se avelli , patiebantur ; ut nullum propterea fuerit dubium , quin ex productis valvularum fibris , vasisque nata , non verò per simplicem adhæSIONEM compacta , corpora illa penderent . Denique intrà aortam descendentem substantia inæqualis , ac rotunda , naturæ verò polypeæ , cavitatem ferè totam oplens , inventa fuit .

IV. Hæc fanè omnia clarè nos docuerunt , sedes , & causas atrocium cum præcordiorum , tam cerebri malorum , quæ Nobilem Ægrum lentâ tabe ad tumulum perduxerunt , omni humanâ ope fuisse majores .

S C H O L I U M .

Porrò , si quis diligenter ire cuperet per singulas præternaturales res , quæ in hoc extispicio observatæ fuerunt , provinciam fanè longè gravissimam , & simplici commentario majorem susciperet . Attamen , ut specimen aliquod nostrarum tradamus annotationum , censemus , non omnia ,
ut

*Non omne
morbofum in
cadavere re-
pertum mor-
bo synchronon
fuit .*

ut plerunque contingit, quæ hic rara, & præter naturæ ordinem detecta sunt, ab initio morbi extitisse; sed alia præcessisse, alia sensim, alia tandem excitata, prævisæ hujus mortis causam habenda esse.

II. Vitia, quæ præcesserunt epilepticam, apoplecticam, & paralyticam affectionem, nonnulla existimamus latuisse in fluidis, nonnulla in solidis. Fluidorum præexistens labes in lymphâ certè constituenda præ cæteris videbatur, quæ scilicet falsa, & acris, ex lixiviali plus justo bilis mixturâ orta, per nares olim utiliter excernebatur, quæque sanguini admixta, ferè menstruum hæmorrhoidum fluxum promovebat.

III. Nonnulla pariter solidorum vitia cognata, indèque adulta fuisse, arbitramur. Hæc autem extiterunt sterni depressio, pericardium minus, quàm par est, amplum, extremorum vasorum in corde, pulmone, ac cerebro talis laxitas, per quam in varices facilè dilatari potuerunt.

IV. Vitia verò, quæ decursu morbi accesserunt, putamus, fuisse in fluidis

cra-

crasim, seu mixturam longè magis acrem, pungentem, ac ferè veneficam, ex ipsâ suppressione mucii narium, simulque ex influxu particularum recentis calcis inductam, quæ, fieri non potuit, quin cum liquido etiam nervorum, aliisque fluidis secundariis paulatim communicaretur. Etenim posthac febres, dolores, & vigiliæ, tandem epilepsia, paralyfis, ac syncope ingruerunt. Hæc autem fluidorum labes in præaffectis potissimum structurâ locis, cerebro nimirum, & præcordiis, morbosos tandem decubitus induxit: interceptâ enim, ob recurrentes identidem convulsiones, circulatione sanguinis, necessariò ichores erosivi, utpote perniciores, subterfugendi tempus, ac modum ipsâ ex morâ hac illuc invenerunt; itaut minima vasa, villorumque extremitates elimare potuerint. Unde postmodum cætera intercurrentia liquida, pro varietate suorum motuum, & mixturarum, alteri parti aliquid affinxerunt, de alterâ verò aliquid semper detraxerunt; affinxerunt quidem lieni, valvulis femilunaribus, pericardio, renibus, cortici, pedum intercapedinibus, aliisque membris,

in

*Ichorum vis
penetrativa.*

in quibus, vel propter pororum angustias, vel propter exilitatem impetus, semel interclusa viscidula fluida pertinaciter adhæserunt. Detraxerunt verò de dextero cerebri cortice, de omento, de universo corporis habitu, deque aliis locis, quibus intercurrentes corrosivi ichores, non modò novam non addidere, immo compactam jam pinguedinem eliquare, atque abradere, corpusque tabidum reddere potuerunt.

V. Tandem eò ventum fuit, ut sanguinea tum piæ matris, tum pulmonum vasa, ad extremum exilitatis attenuata, propter diuturnam introfluentis liquidi acredinem, distrahentemque vim, ob circuli interceptionem, ex convulsionibus ortam, postremâ excitatâ epilepsiâ, diffilirent, sanguinemque supra, & intrâ cerebrum, necnon cruentum serum intrâ thoracem effuderint; unde subita mors. Adquam tamen inferendam, suspicor, unâ simul conspirasse interruptam sanguinis continuationem per ipsa vasa cordis; inventa quippe ventriculorum exinanitio certè arguit, à violentissimis præcordiorum strangulationibus præ-

*Unde subita
mors in hoc
Ægrotante.*

præcisum fuisse vitæ tramitem, qui cum sanguine per cor in pulmones, & à pulmonibus per cor in arterias, ac venas circumducitur.

¶ VI. Quod verò spectat ad duplex cordis vitium, adhæsiōnem nempe pericardii, & sarcomata valvularum, non admodum in prioris examine immorabor.

*Pericardii cū
corde adhæso
cur tabidis,
& asthmaticis
familiaris.*

Ut enim illud frequentius est malum apud tabidos, ac præsertim asthmate vexatos; ita longâ disquisitione non indiget; nam satis est notare, obstructis ostioliis, unde intrâ pericardium liquor depluit, ac deficiente prorsus omni humiditate, quæ ambas cordis, ejusque capsulæ superficies ab adhæsiōne disjungit, illas inter se necessariò cohærere, atque conjungi; præcipuè si pericardium breviori orbe (naturâ, vel sæpiusculis contractionibus factum) contineatur, ex quo fiat, ut sit cordi propinquius.

VII. Igitur, ad posterioris animadversionem transeuntes, ingenuè fatemur, hoc sarcomatum vitium in tot observatis cadaveribus nunquam aliàs nobis fuisse compertum, nec adhuc ex aliorum lectione cognitum; utcunque viderimus hu-

*Valvularum
cordis. s. sar
comata à veni
ne icterata.*

hujusmodi valvulas cartilagineas, offeas, exesas, phlogosi affectas, aut cum sanguiferis varicosis.

VIII. Nota pluribus est illa per^a Harveum memorata observatio de carne fungosâ, externo cordis cono accretâ. Nec ignoramus aliam Joh. Jacob.^b Martini de exiccato corde, quod centum tuberculis totâ externâ superficie obsitum erat. Similiter notatu dignam censemus eam, quam refert Joh. Conrad.^c Peyer. de corde, cujus inæqualem superficiem carni veluti lemnisci externè cingebant. Sed qualis hujusmodi interna, nulla, quòd sciam, refertur; concretiones namque à^d River., aliisque caruncularum in modum intrâ cordis ventriculos inventas, polypeam tantùm substantiam, non verò sarcoma, cum ejusdem cordis carne continuum, redoluisse, arbitror: ex quo fanè evenit, ut apertè doceamur, quidquid in physicis possibile est, aliquando contingere. Atque in hoc^e Plinius erroris non temerè redarguitur, cum scriptum reliquerit, *solum cor vitiis non macerari, nec supplicia vitæ trahere, læsumque mortem illico afferre.*

^a exerc. 52. de gen. animalium.

^b apud Miscell. n. c. decad. 2. obser. 204.

^c Meth. hist. anat. med. in schol. cap. 6.

^d cent. 4. obs. 21.

^e lib. 11. c. 42.

Gg

IX.

Hecum farcomata, generosus modus.

IX. Excitata verò juxta cor putamus farcomata ista ex eâdem causâ, eodemque modo, quò ea fiunt, quæ exterius, ac præcipuè in podice, apparent; scilicet ab inductis omnium primò levibus ulcusculis, aut rhagadibus, paulatim discissa valvularum vasa, ob viscidulorum liquorum interceptionem, elongari, ac luxuriare cœpisse, varièque invicem complicata, in morbosa tubera adolevisse. Neque forsitan ambigendum de tempore, quo ulcuscula, ac rhagades excitari eo loco potuerint, cùm principio morbi cor, diù humiliter, atque inæqualiter, pulsans, facultatem faciliè dederit sanguini, erodentibus particulis referto, ut morâ suâ labia valvularum exederet. Quid? quòd ipsæ quoque viscerum, artuumque convulsiones, decursu morbi sæpè recurrentes, liberum sanguinis fluxum à sinistro cordis ventriculo per aortam (præcipuè descendentem, polypo ferè obstructam) in singulas partes adeò interturbare potuerunt, ut, validiùs repercussis cruoris undis contra prædictas valvulas, fortè suâpte naturâ graciliores, istæ tandem alicubi findi coactæ fuerint.

X. Quòd

X. Quòd verò pulsus, vel cum enormi vitio prædictarum valvularum, ut plurimum in Ægro æquales observati fuerint, hoc factum puto, quia istiusmodi sarcomata, utpote mollia, tunc facilè locum sanguini cedebant, cum pleno impetu à corde propellebatur; unde minùs resistentes mediam viam omnino liberam aperiebant in aortâ. Secus atque accidit, ubi cartilagineæ, & multò magis, ubi ossæ occurrunt valvulæ, quæ, cum ordinariis impetibus sanguinis validè plerunque renitantur (non enim semper, scilicet cum major viget in sanguine vis, ut in acutâ feбри, renitantur) illius per arteriam cursum, cum pulsus inæqualitate, retardant.

Durantibus valvulari sarcomatibus, cur pulsus plerumque æquales persisterint.

XI. Illud utique huiusmodi spongioso-carnei valvularum lemnisci, mole aucti, patrare in Ægroto forsitan potuerunt, ut postremis vitæ diebus, dum propter expositam strangulationem præcordia contrahebantur, mutuò admoti, atque implicati, quasi aggerem excitarent contra cominus locata orificia arteriarum coronalium, sanguinemque ad cordis fibras per id temporis derivari, prohibuerint. Unde lipothymias, ac syncopes,

Quomodo sarcomata a producenda syncopi cõspiraverint.

G g 2 pes,

pes, si non primùm, ac principaliter inducere, saltèm eousque producere valuerunt, donec, cessante spasmo, recenter excussa sarcomata, ad factum spatium, proprio potissimùm pondere, à prædictis orificiis recederent, liberumque sanguini iter per cordis substantiam rursus permetterent, atque ad syncopis cessationem contrariâ prorsus ratione conferrent.

XII. Neque hîc tacebimus, polypeam substantiam, quæ intrâ descendenti aortæ cavitatem, ex sæpiusculis illius tubi contractionibus, & morâ sanguinis, concreverat, pedum frigiditatem, atque œdemata, diminuto sanguinis ad extremas partes influxu, peperisse.

XIII. Dicendum aliquid superesset de dextero cerebri cortice, qui flaccidior, depressior, ac sanguine etiam exundante, & concreto gravatus occurrit; nimirum epilepticæ ne, an paralyticæ medietati corporis responderet? Et quamquam res, sub calvariâ latens, summam obscuritatem, ac difficultatem involvat; tamen, cùm, præter Hippocratis, Balionii, Martiani, Malpighii, Valsalvæ, alio-

aliorumque eximiorum Virorum auctoritatem; nostra quoque succurrant experimenta, meam sententiam interponam; probabile scilicet fuisse, dexterum cerebri hemisphærium sinistrae corporis medietati, & sinistrum dexteræ respondisse: ita ut ea corticis pars, quæ gravior, quæque, effuso pressa sanguine, inventa fuit, commercium habuerit cum sinistris artubus, motu, sensuque præditis; altera verò, quæ penè nullam, oculorum judicio, labem in se continere videbatur, cum paralyfi jam tentatis.

Dexterum cerebri hemisphærium sinistrae, & sinistrum dexteræ corporis medietati respondit.

XIV. Ad hujus verò asserti probabilitatem duo præcipuè argumenta nos adducunt. Prius est, quod passim experimento docemur, percussos nempe, vulneratos, vel abscessu aliquo tentatos in dextero, aut sinistro cerebri cortice, plerunque convulsionem, aut paralyfim in oppositis artubus perpeti. Posterius verò ex hâc eâdemmet hypothesi deduci posse videtur. Etenim, cum Æger diù lassitudine quâdam ulcerosâ, ac postremò epilepticis quoque artuum medietatis sinistrae succussionibus affectus fuerit, verosimile est, illam cerebri partem, quæ prin-

Hujus experimento Ægri confirmatur.

principium, ac fons erat istorum nervorum, tempore mortis, magis in eodem laceffitam fuisse, quàm alteram, à quâ nervi penè mortui propagabantur in dexteram, paralyfi detentam. Atquè dexterum cerebri hemisphærium pessimè affectum, ac laceffitum, sinistrum verò nudis oculis ferè incolume inventum est. Idcirco dexterum cerebri hemisphærium dolentibus, & convulsis; sinistrum verò paralyfi tentatis artubus convenisse, ac respondisse, dicendum est.

XV. Nec movet, quòd dexterum cerebri hemisphærium, tabe consumptum, cum dexterâ medietate, paralyfi affectâ, congruere magis videretur, quàm cum sinistrâ, alioquin sensu, motuque præditâ. Etenim, præterquamquod in præfenti casu (utcunque ab initio discrimen aliquod gracilitatis dexteris inter, ac sinistros artus interfuerit) membra omnia pari tabe paulatim aruerant; illud maximè advertendum, in glandulis, ad quarum ordinem cerebrum refertur, eas graciliores evadere, atque inveniri solere, per quas fluida uberius secernuntur; eas è contrario pleniores, saturatioresque fer-

Glandule, uberiori liquida dum secernentes, evadunt graciliores, & e converso.

servari, quæ diù à secretionis officio vacaverint. Exemplo sint (præter thymum, & hepar in foetu) mammæ, & renes, quarum sanè adenarum si altera ab usu defecerit, major, & crassior, non minor, & gracilior, deprehenditur. Cùm igitur dexterum cerebri hemisphærium sinistro magis depressum, seu gracilius offenderimus, perspicuum nobis præbuit indicium ad probandum, illius glandulas semel admissam secretionem liquidi nervorum, alioquin acris, usque ad extremum vitæ diem, quâ sinistrum longo jam tempore caruerat, constanter retinuisse.



OB-

OBSERVATIONES

Physico-Anatomicæ

NONNULLORUM,

Qui primo impetu morbi repenti
per hæc tempora perierunt .



Post Capita præliminaria de improvisis mortibus , earumque causis , quæ istorum potissimum decursu annorum nobiscum ad eò sæviter egerunt , Et post descriptos casus aliquorum , qui , subitaneis cerebri , ac præcordiorum morbis tentati , per hæc tempora evaserunt ; opportunum certè erit , ut descendamus ad observationes illorum , qui , primo impetu morbi , vitam repenti cum morte commutarunt .

In jis autem commemorandis , illud in primis studebimus , ut historiæ medicæ singulorum , qui decesserunt , eà lege præfigantur extispiciis , ut non solum naturalis , sed præternaturalis quoque illorum hominum status legentibus præluceat . Mala enim , quæ mortem

tem præcesserunt , manum quasi porrigunt ad illam inveniendam in cadaveribus causam , quæ , disrupto vitæ filo , animam divulsit è corpore . Quo fit , ut meritò ^a Fortunat. Fidei. scripserit : illud etiam præstat novifese , cum quisquam repentè moritur , quânam scilicet ægritudine ille correptus fuerit .

Quo morbo repente decedens laboraverit , maxime sciendum .


a De relat. Med. lib. 4 cap.7.

Deinde verò dabit , spero , veniam ingenuus Lector , si , quanquam ex defunctorum Medicis , Amicis , ac Necessariis integras tum naturalis , tum præternaturalis eorundem status historias haurire studuerimus , adhuc tamen alicubi mancas invenerit , præsertim circa pulsuum anomalias ; ad eos enim , qui improvisè de medio tolluntur , neque Medici accersiri , neque , si accersiti fuerint , tempestivè solent accurrere .

Supereft , ut aliquid circa scholiorum methodum admoneamus . In jis itaque , quemadmodum curabimus , ut particularis cujusque subitanæ mortis causa extricetur , atque reluceat , ita non omnium symptomatum , quæ singulos morientes vexarunt , rationes reddemus in singulis ; ne scilicet , cum eadem ipsissima phænomena in pluribus ægris observata fuerint , recoctam cum nausèa cram-

Hh bem

bem Lectoribus exhibeamus . Symptomatum
idcirco etiologias hæc illac nostris asperge-
mus in scholiis , ut , quæ de industriâ defi-
ciunt in singulis , desiderari vix possint in
omnibus .



OB.

OBSERVATIO I.

*Repentina mors ex apoplexiâ syncopali in
Viro obeso , & cacochymo.*

HISTORIA.



Antonius Maria Brillì Romanus , quinquagenario major , famulorum Eminentiss. Cardinalis Sacripantis decanus , obesi admodum habitus , vini ; & conjugalìs Veneris intemperans ; cùm ante annum vagis circa pectus , ac diaphragma doloribus tentaretur , gravi anhelitu , & omnigenâ pulsus inæqualitate urgeri cœpit . Deinde verò urinarum sensum inopiâ , ac pedum tumore laborans , futuri speciem hydropis exhibuit ; variis propterea pharmacis , & præsertim oxymellite scillit. , ac stomachicis fermentantibus curatus , rursus lotii copiam obtinuit , apertoque in crure fonticulo , meliùs se habuit .

II. Sed quanquam ad Aulæ officia

Hh 2 post

post multos menses rediisset ; pravo tamen colore foedatus, per acclivia anhela-
bat , atque jisdem pulsum anomaliis perpetuò detinebatur . Tandem die 15. Januarii 1706. , nocte mediâ , expergefactus, purpurinam quamdam totius corporis efflorescentiam, instar morbi , qui à Medicis appellatur *esserarum* nomine , ingenti cum pruritu, & calore, summo-
pere molestam persensit , à quâ ut alleviaretur, è lecto surgens, fenestram, sese frigidissimo expositurus aeri , imprudenter aperuit ; exinde decubitus , qui utiliter exteriùs factus erat , pessimo facto interiùs repulsus ; è vestigio brachii sinistri torporem, subitò evanidum, induxit . Neque interim Æger , jis auscultans morbi vocibus, ullam sibi medelam adhiberi, curavit ; sed postridie Aulam adivit, & Eminentissimi Purpurati curum pedibus cum cætero famulatu sequutus fuit , ut tandem viribus fractus , horâ 23. cum dimidiâ diei 17. Januarii , repente mortuus fuerit in viâ , quæ Parionis dicitur .

*Funestissima
esserarum ad
interiora re-
pulsio.*

CADAVERIS DISSECTIO.

TRanfactis viginti quatuor horis, cadaver in Theatro Romani Archilycei, coram Excellentifs. Viris, ac Doctõribus Lucâ Thomaffino Protomedico Generali, tribus Confiliariis, fcilicet Jacobo Sinibaldo, Antonio Placentio, & Joh. Trullo, duobus Medicis Sacri Palatii Apoftolici Michaele Angelo Pauli, & Gasparo Reali, & Publico Anatomes Professore Alexandro Pascolo, unâ cum Chirurgo ejuſdem Sacri Palatii D. Petro Ceſcono, necnon Phyſico, & Chirurgo Carcerum Joh. Latino, & Bartholomæo Simoncello, qui Publicus alioquin eſt Anatomes Miniſter, ab hoc ipſo, adſtantibus etiam Curiæ Judicibus, & Scribis, multoque concurrente Studioſorum numero, diſſectum fuit.

II. Et quoniam externa quoque cada-

*Ex cadaveri
facie quando-
que Medicus
eruditur.*

verum facies nos aliquando erudire ſolet; idcirco in primis advertimus, univerſum corpus mirè obefum, & pallidum, vultum autem obſcurè adhuc ingenti cum tumiditate rubentem occuſſiſſe; ex quo factum eſt, ut, antequam, detractâ cal-

va-

*Effusus sub
cranio sanguis
pro mortis
causâ perpe-
ram hęc accu-
satur.*

variâ , ipsius cerebri status nobis inno-
tesceret , rumoris nescio quid afflaverit
in Theatro, aliquibus, sanguinem, è va-
sis largè effusum , sub cranio inventum
iri, augurantibus. Sed o vana, & incerta
judicia hominum , quorum lingua ocu-
los, mentemque præcurrit!

III. At verò , ut rem consveto perfici-
ceremus ordine , abdomen principio se-
cuimus, quod multo adipe refertum erat.
Zirbus, obstructis suis glandulis, crassius-
culus. Intestina tenuia venis sanguine-
tumentibus aliquantulùm rubentia. Ven-
triculus prægrandis , & laxus. Lien na-
turali mole major. Hepar paulò auctius,
sed colore prope naturali, cujus interim
cystis, cùm forinsecus albicans observaretur,
exactiori locum fecit examini; post-
quam verò illam aperuimus, non bilem,
sed verum pus continere, atque internâ
sui superficie variis ulcusculis laceram,
raro quidem exemplo, deprehendimus.

*Pus, & ulcera
in cysti felleâ
deprehensa.*

IV. Ab ipso deinde abdomine in tho-
racem per amotum sternum referat â viâ,
statim multa circa pericardium flavescen-
tis adipis copia (qua cordis quoque basis
gravabatur) se obtulit. Pulmo solito de-
pref-

pressior. Cor verò prægrande inventum est. Summa cordis
-implacudo. Dextera auricula cum appensâ venâ cavâ, quæ modicam nigri sanguinis quantitatem continebat, duplo certè naturali diametro amplior apparuit.

V. In sinistro ventriculo maxima picci cruoris moles claudebatur. Arteriæ pulmonica, & aorta, finitimæque cordi tracheales partes multo adipe refertæ, glandulisque quibusdam obsessæ, mutuum nisum, & compressionem ostendebant.

VI. Tandem, cùm ad cranii sectionem Chirurgus accederet, scissis, diductisque tegumentis, super dexterum latus ossis sincipitis offendit in cranio foramen, per quod (cùm pericranium dumtaxat aditum intercluderet) majus specillum ad usque duram meningem, alioquin laxam, Dura meningis
laxitas. facilè intulit; atque, elevatâ calvariâ, cuniculum illum intrâ ossis lamellas à generationis fortè primordiis fuisse referatum, Cranii foramen
forsan in-
natum. indè judicavimus, quòd orbiculus non asper, sed lævigatus inventus fuit. Cæterùm in superficie cerebri subobscura vasorum sanguineorum turgescencia, & modica quantitas turbi-
di

di feri in ventriculis spectabatur . Sinus longitudinalis , & laterales , atque ji etiam , qui ad cerebri basim positi sunt , nigro sanguine tuebant , ut non fuerit dubitandum , quin solito major cruoris quantitas intrà cranium intercepta fuisset .

S C H O L I U M .

^a In comment., & annot. ad histor. 1. l. 2. consil.

Medico cum multà opus sit cautelâ in prædicendis interioribus cadaverum læsionibus .

IN hujus vestibulo scholii opportunè occurrit consilium , verè sapiens , ac rectum , quo Gulielmus^a Ballonius Medicos admonet , ut caveant prædicere , se deprehensuros aliquid in capitibus illorum , qui ex cerebri morbis interierunt . Etenim , cùm una , eademque affectio à variis , atque inter se non diversis modò , sed sæpe contrariis , diversèque operantibus , causis oriri possit , rarò fit , ut Medicus illam , quam incautè præcinerat , causam in dissectione cadaveris inveniat . Quod sanè extispicii hujus testimonio , omnium cum admiratione , comprobatum fuit ; nullum enim effusum in cerebro sanguinem offendimus , quem aliqui adeò confidenter prædixerant . Igitur , ut nos , sicut cauti fuimus

mus

mus in prænunciando , similiter in hujusce subitanæ mortis causis evolvendis ab erroris periculo longiùs abeamus , è re arbitramur annua istius Ægri mala diligenter investigare : quò namque remotiores ab observantium oculis repentinorum mortium causæ in dissectis cadaveribus esse videntur ; ita curiosiorem diligentiam postulant , ut eruantur , & patefiant . Porro nonnulla inventa , etsi non rarò in extispiciis nihili fiant , ex quo apud minùs versatos in rebus anatomicis minima putantur ; ea tamen magni æstimanda sunt , quoties cum languidulis viscerum fibris luctari , minimisque vasorum angustiiis intercipi potuerunt .

Mala , quæ mortem præcedunt , diligenter investiganda .

In extispiciis , etsi minima offendantur , magni æstimanda .

II. Primò itaque extra omnem dubitationis aleam positum per historiam censeo , hominem hunc ab anno ex cachexiâ valetudinariam vitam duxisse , cum labefactato fibrarum tono , & cum degeneribus à naturali crasi fluidis , quæ ad viscido-acrem naturam evecta erant .

Series morborum , subitam necem præcedentium .

III. Secundò ex cadaveris dissectione constitit , Ægrum loco cysticæ bilis , quæ balsamico-amaricans esse debet , acrepurridum pus multò priùs , quàm diem

Ii

suum

suum obiret, fovisse; non enim ulcera momento temporis ab erodente liquido visceribus insculpuntur. Hoc autem pus facere non poterat, quin, everso naturæ ordine, chylum non modò non defæcaret, sed exoticis particulis imbueret, novamque labem sanguini jugiter communicaret.

IV. Tertiò his addamus ex historiâ, Ægrum eò tandem pervenisse, ut acria corpuscula, jisque commixtam sulphuream lympham (erat enim vinosus) plenè cumulaverit, quæ profectò corpuscula ab universo suorum vasorum, ac viscerum fibroso genere, inductâ irritatione, ad externa corporis sub formâ essentiarum propulsa fuerunt; cui sanè propulsioni, nisi Ægrotus intempestæ noctis frigore imprudens fuisset obnixus, proculdubio indè levamen accepisset. Sed, cùm istius critici decubitus materies intrâ vasa repulsa, atque in cerebro, & spinalis medullæ principio intercepta fuerit, sinistri torporem brachii produxit, qui, ex tempore solutus, indicium præbuit, ignem non extinctum, sed doloso in cinere latuisse sepultum; causam
nem-

*Ex repulsi
esserit, brachii
torpor.*

nempe morbificam è corpore nequaquam eductam , sed , partim sanguini confusam , partim viscerum folliculis interceptam , delituisse.

V. His verò positis , facile est conjicere , causam subitanæ hujus mortis fuisse copiam crassescentis sanguinis , & serositatis , quæ quidem fluida , oleoso-volatilibus partibus destituta , & fixis salibus redundantia , propriæ fluxilitatis inopiâ per meningum arteriolas , per sinus , ac per reliqua cerebri vasa hæere cœperunt , ubi , debilitatis , ob spirituum paucitatem , in violento etiam corporis motu erogatorum , fibris muscularibus duræ matris , ac villis omnibus , corticem cerebri , ac cerebelli intertextentibus ; & inductâ ob sanguinis remoram tam pressione supra fibras , & glandulas ejusdem corticis , quàm obstructione intrâ oscilla secretoria liquidi nervorum , repentina suborta est syderatio liquidorum , & solidorum in cerebro , quam fortissimam dicimus apoplexiam cum mortiferâ syncope , quæ nostro in casu corripuit , non solum propter deficientem descensum spirituum à cerebro , & cerebello in præcor-

*Undenam
syncope mor-
tiferâ in hoc
Ægrotante.*

dia ; sed propter concurrentem renitentiam ad motum crassi, & resinosi sanguinis, per cavitates cordis tunc temporis devoluti .

*In hoc excitata febris subitam mortem forsan aver-
tisset .*

*Paralyfis mē-
branarum, &
corticis cere-
bri, ac cere-
belli.
a 6. aph. 57.*

• VI. Hoc autem indè arguitur, quòd isto in homine lymphæ viscidulo-acris, quæ per duos dies ante obitum efferas produxit, cùm à succutaneo organo intempestivè repulsa fuerit, nullam excitaverit febrim, quâ aut cum cæteris massæ principiis exactè, atque impunè rursus commisceri, aut per alia secernicula utiliter trudi potuisset. Factum proindè esse videtur, ut fluida, dissipatis postridie per laboriosum pedestre iter volatilibus particulis, quibus utcunque, in cerebro præsertim, fluxilia reddebantur, ex tempore substituerint, inductâque paralyfi in meningibus, ac totâ cerebri superficie, invincibilem, quam fortissimam dicunt, apoplexiam, a Senibus alioqui familiarem, pepererint.

VII. Firmant deinde nostras à priori conjecturas ea, quæ in cadavere palam occurrerunt. Quid enim aliud tumida, & subrufa vultus, & meningum species? Quid sanguineorum vasorum in univer-
sâ

sâ cerebri superficie turgescencia ? Quid finus omnes, nigro sanguine oppleti, demonstraverunt, nisi maximam fuisse humoris minùs mobilis quantitatem, quæ, intrâ cranium intercepta, tum circumpellentium fibrarum tonum enervare, tum vel maximè secretrices cerebri glandulas oppidò premere, ac validè obstruere potuit; unde lethalis spirituum animalium inopia inducta fuit; præsertim cùm apertissimè constiterit, plus acrium serositatum, & viscidorum humorum, quàm oleoso-volatilium particularum diù ægro in corpore redundavisse ?

VIII. Hoc tandem breviter admoneamus, non frustra aliquem suspicari posse, num repertum in cranio foramen ad infirmandum robur duræ matris conferre aliquid potuerit. Etenim apud hominem, qui ferè semper pro suo munere ad obsequia, nudato capite, incedebat, cuniculus iste aeri, aerique innatantibus corporibus fortè minùs, quàm natura postulat, obnitebatur. Si quis enim ab Ægro, dum adhuc erat inter vivos, sciscitatus fuisset, an aliquam sub perforato

Cranii foramen an duræ matri infirmanda contulerit ?

Cranio ob syphilitidem desquamato, cerebrium facile afficitur.

to cranio in magnis temporum mutationibus molestiam persensisset, eam probabiliter passurum fuisse, indè arbitramur, quòd, qui ex syphilide cranii desquamationem passi sunt, ferè semper de læsione ab externo frigore conqueruntur, cerebrique mala facillimè subeunt.

Cystis felleæ vitia multorum peccatoris morborum radix.

IX. De cætero viderint alii, quænam extiterit origo raræ illius exulcerationis, quæ in cysti felleâ inventa est. Nos enim, qui hujus primordia ægritudinis penitus ignoramus, illud hîc pro coronide tantummodo adjicimus, sæpe detexisse morbidam quasi radicem, vel saltèm conjunctam propaginem earum spirandi difficultatum, quæ, ex hypochondriis ortæ, ad hydropem tendunt, in ipso fellis folliculo altè implantatam; modò nimirum in lixiviali, fluidâque nimis, modò in tenaciori, atque in lapides conversâ bile, ut non sit dubitandum, quin vitium tam enorme ipsius cystis felleæ ad morbos istius Ægri maximè conspiraverit.

X. Neque similiter immoramur in persequendo impedimenta præcordiorum, ac præsertim arteriarum pulmonicæ, & aortæ, partiumque trachealium, multo ad-

adipe , auctisque glandulis obfessarum : non enim causas inquirimus annui anhelitus , pulsusque inæqualitatis , quæ à præternaturali , mutuoque vasorum nisu pendere potuerunt.

OBSERVATIO II.

Subita mors ex syncope ob cordis magnitudinem , prolapsum , atque aneurysma .

HISTORIA.

FAmulus olim cursor Illustrissimi Marchionis Spadæ junioris , nomine Philippus Turci Romanus , annorum circiter viginti quinque , habitus gracilis , staturæ mediocris , pallidi coloris , anhelitu in levibus etiam corporis motibus detineri solitus , ante annum laboravit suffocativâ anginâ , à qua , ter misso intra diei spatium sanguine , liberatus fuit , superstitibus tamen majori semper spirandi difficultate , & recurrente interdum

Series symptomatum , quæ cordis magnitudinem , & prolapsu ostendit .

cor-

cordis palpitatione, præsertim cùm citato gressu ambularet, unà cum sepulto præcordiorum angore, & quodam pulsatili pondere supra diaphragmatis centrum. Quæ quidem mala eòusque adaugebantur, ut illum, vel inter comedendum, atque ab assumpto potissimùm cibo, deterius haberent. Hic, die 4. Februarii ineuntis hujus anni 1706. tametsi manè faucium phlogosi, & quibusdam ad usque collum, & jugulum exporrectis contractionibus detineretur, pedibus nihilominus Herum suum per quingentos circiter passus prosequutus fuit. Domino verò alicubi diutiùs fortè morante, ipse cum socio in cauponâ largè, ac sinè delectu comedit, ac bibit; deinde domum reversus post horam, cùm frigore corripere-retur, apud fœminam se recepit, calefaciendi causâ ad ignem, qui femi-acensis carbonibus medio ardebat in cubiculo, ubi paulo post (fortè an etiam ex œstro venereo?) levi primùm capitis debilitate, deinde frontis, totiusque corporis madore cum vehementissimo anhelitu, cordisque angore, tandem syncope, in mortem statim desinente, correptus fuit.

C A.

CADAVERIS DISSECTIO.

A Perto abdomine, intestina tenuia aliquantulum subrufa; cætera verò naturalia viscera à nativo statu parùm recessisse, præterquam paulò turgidiora, ac veluti murice subtincta visa fuerunt.

II. Morborum, & ipsius necis sedes apparuit potissimum in thorace, quo referato, pulmones subalbidi, & dexter eorum costis legitimis tenaciter adhærens, oculis adstantium sese objecerunt.

III. Fauces rubore perfusas, asperam arteriam substantiâ gelatinæ non absimili, fuligineo tamen, ac subnigro interiùs colore, refertam cernimus. Rami bronchiales phlogosi pariter, ac veluti asperitate quâdam laborabant.

IV. Cor mole triplo naturali majus; vaccinum certè superabat, cum, ablato pericardio, & expresso omni cruore, penderit in lance libras duas, & semis. Hoc sanè viscus supra diaphragma ceciderat, ac proindè œsophagum, aortam, ac ventriculum facilè premebat.

V. Deinde, etiamsi externâ facie natu-

Kk

ra-

*Cordis moles
aucta, & pro-
lapsus in dia-
phragma.*

ralem servare videretur figuram, sectum tamen novam philosophandi materiem solertioribus naturæ Vestigatoribus præbuit. Auricula enim, & ventriculus dexter sanguine vacui, sed ordinariæ diametri, contra verò sinistræ cavitates nigro plenæ cruore, & duplo dexteris latiores occurrerunt. Arteria magna juxta cor pariter perampla.

*Sinister cordis
sinus duplo
major dexte-
ro.*

VI. Secto cranio, pia mater cum vasis solito tumidioribus se nobis præbuit. Cortex cerebri in superficie utriusque hemisphærii versùs posticam partem caloso quodam glutine tenaciter duræ matri adhærebat. Plexus denique constabant ex vasis sanguine plenioribus.

S C H O L I U M.

NE prolixitas morosa, neve brevitatis in hâc attingendâ ætiologiâ evadat obscura; sedulus Lector primò distinctè, mox verò promiscuè animadvertat primò nativum Ægri temperamentum, & gravissimos morbos, quibus miser homo per annum ante mortem torquebatur; secundo

dò proximas necis occasiones ; tertio ea omnia , quæ in illius cadavere observata fuerunt . Hæc enim , spero , satis luminis accendent , ut claras subiti hujus interitus rationes videre possit .

II. Quanquam verò singulæ affectiones , & causæ , quæ Ægrotum hunc detinuerunt , divisis suarum virium momentis , præcocem , subitamque necem afferre vix potuissent ; universæ tamen , momento composito , eandem facillimè induxerunt . Quod sanè minimè arduum videbitur , si quot , & quomodo istiusmodi causæ ad supremam , atque inopinatam Ægri perniciem conspiraverint , diligenter expendamus . Non enim una ,
Multiplices
 hujus impro-
 visæ necis
 cause .
 eaque simplex , aut interna solùm causa , sed multiplex , & tum externa , tum interna , vetus , ac recens ad improvisum illius interitum conjuravit .

III. Hoc sanè evidenter constabit , si duo ante omnia , quippe quæ admodum probabilia , adversam istius valetudinem præcessisse , intelligamus ; alterum nativum ejusdem temperamentum acerbiliosum , unà cum solito grandiori corde , ac paulò debiliori texturâ sinistri ventri-

Ipsarum enu-
 meratio .

*Præcordia in
Cursoribus cur
facile labefa-
scentur.*

culi, atque aortæ, quæ sanè res homini-
bus, præ cæteris animalibus, non rarò
contingunt; alterum verò adventitium,
nimirum intemperans, atque intempesti-
vè exagitatum Cursorum vitæ genus, per
quod non tantùm fluida ad acrem—vo-
latilem naturam, in gracilibus præsertim
corporibus, evehuntur; sed aeris quo-
que viæ, & pendulum intrà thoracem
cor perpetuâ concussione, ac divulsione
labefactantur. Ita certè clara habebimus
principia, unde causas derivemus non
modò suffocativæ anginæ, sed, quod
caput rei est, lethalis prolapsus, & aneu-
rysmatis cordis. Cùm enim præcordia
per arterias, & venas claviculis, axillis,
& collo, perque pneumonica vasa pul-
monibus alligentur; cùmque pulmones
per asperam arteriam, ac per laryngem,
veluti per funem, à jugulo, & faucibus
propendeant; facile est concipere, infir-
miora ex anginâ, & magis adhuc ex flui-
dorum acredine, & cursorio vitæ genere
reddita hujusmodi suspensoria, ægriùs
postmodum valuisse ad renitendum de-
scensui præcordiorum, quæ, solito ma-
gis ex mole gravitantia, suis etiam rela-

*Mechanicus
cordis prela-
bentis modus.*

xatis, exesisque proximioribus membranarum funiculis, necessariò ex lege gravium supra diaphragma lapsarunt.

IV. Cùm verò multarum officia partium apud animalia regantur, aut offendantur mutuo contactu, ac nisu, vel divisione, ac diffociatione; utique fieri non potuit, quin, gravitante corde præter naturæ ordinem supra diaphragma, & diaphragmate supra stomachum, indè non solummodo respiratio læsa, sed, tumente ex cibus ventriculo, arteria magna descendens (quæ sub corde septum transversum præterlabitur, stomachoque substernitur) validè compressa fuerit. Hinc fiebat, ut sanguis, impeditâ liberâ suâ trajectione, ac devolutione per inferiores arterias, necessariò quoquo modo alternè repelleretur versùs superiores arterias, atque in eundem sinistram cordis ventriculum, à quo vicissim fuerat extrusus: ibique arietatio quædam nixus trudendi, ac renixus trusi jam cruoris ab assumpto potissimùm cibo (quo sanè tempore ventriculus aortam valentiùs premit) sub angoris, ac palpitationis specie proficiscebatur.

*Cur maximè
ab assumpto
cibo respiratio,
& cordis pal-
pitatio ingra-
vescunt.*

V. Et

V. Et quoniam ex hac unâ radice præpediti motus liberi sanguinis per descendentes arterias sexcenti malorum fructus succrescere potuerunt ; mirum sanè haud erit, si nos indè principium derive-
mus dilatationis tum arteriæ magnæ , tum vel maximè sinistri cordis ventriculi (quas quidem partes nativâ debiliori texturâ laborare, posuimus) necnon adhæſionum pulmonis , congestionis lymphæ, callosi instar glutinis , in cerebri superficie , tandemque , concurrentibus externis causis, etiam subitæ mortis.

Morbosa præcordiorum dilatationis origo principii hydrometrici illustrata.

VI. Etenim, cùm clarè constet ex hydrometricis principiis, impedito, vel diminuto ex communi aliquo alveo per unam , vel alteram fistulam aquarum excursu, illico in proximos canales lymphas majori copiâ derivari, atque confluere ; immo easdem lymphas, ad rationem impediti liberi excursus, ad ipsum quoque alveum reflecti ; ut , quæ successivè fluxuræ essent, in eodem parumper subsistant ; satis dilucidè apparet , cur in homine isto cruoris excursus , per inferiores arterias ob expositas compressiones alternè diminutus, alternè pariter ma-

majori copiâ, & vi versùs cor, & in superiores arterias fuerit derivatus; facileque propterea non solùm faucium phlogoses, & capitis congestiones induxerit; sed etiam in sinistro cordis alveo dilatationem, si non primùm producere, saltem adaugere potuerit.

VII. Porrò cùm fluida, præsertim incompressilia, ferè induant naturam solidi, quotiescunque in angustum alicubi tubum violenter, ac pertinaciter urgentur; idcirco planum est intelligere, sanguinem, cùm à corde violenter intrâ compressam arteriam truditur, vectis, cuneique potentiam induere, tantò quidem majorem, quantò magis locali ejusdem motui acutæ durorum salium figuræ copulantur. Nihil igitur mirum, si apud hunc Ægrum, ex impulso sanguine intrâ impeditam aortam, eoque reverberato versùs semilunares valvulas, idem truncus, & sinister cordis ventriculus (texturâ alioqui debiles) dilatati fuerint; distractivæ namque percussionis, ac repercussionis vi adjuncta fuit in sanguine energia cunei erodentium salium, qui fibrosum earundem cavitatum con-

Sanguis, intrâ compressâ arteriam violenter trusus, cunei potentiam induit.

tex-

textum , repetitâ toties extrusione ulterius debilitatum , paulatim diloricare potuerunt ; quibus factum puto , ut viscus hoc (remorante etiam sanguine in minimis coronariis , proximisque distentiarum fibrarum spatiosis) gravius semper , ac majus evaserit , sui que idcirco prolapsus , & septi transversi , aortæque compressio nis causam longè magis adauxerit.

a Bened. Castell. in dem. mens. aquar. current. prop. 3.

Coniectura de tardiori sanguinis motu per aneurismaticum lacum cordis finium.

VIII. At verò , cùm ex ^a hydrometricis sectiones inæquales vasorum , per quæ fluida moventur , eorundem fluidorum velocitatibus sint reciprocæ ; sequitur , ut , enervatis fibris impellentibus , si lævæ cordis cavitates duplo majores dexteris detectæ fuerunt , duplo etiam tardior extiterit motus sanguinis in sinistris , quàm in dexteris ; eòque magis , quò distracta , & ampliata sinistri ventriculi latera in qualibet systole ad mutuum pervenire contactum , omnemque à se cruorem in aortam expellere , atque elutriare nequiverint , quo sanè copiosè subsistente , liberis tum ipsius cordis motibus , tum influentium à pulmone liquidorum undis , nova semper augebatur renitentia. Exinde maxima eruitur causa

sa tum sepultæ præcordiorum angustia, & gravitatis, quâ postremò Æger decessit, tum inventæ in cadavere stagnationis sanguinis intrâ sinistram dumtaxat ventriculum. Etenim cùm eò res in Cursore isto devenit, ut simul conspiraverint minor animalium virium potentia ad constringendum cor, & major cordis, ob adauctum suum pondus, renitentia ad motum; tunc hercle vires circumpulsivæ in cordis ventriculis ad eam rationem, & inter se, & cum contentis cruoris molibus pervenire debuerunt, quam invicem habebant sectiones cavitatum, & resistantiæ vasorum. Sed quoniam dexter ventriculus naturali diametro donabatur, & pulmonum vasa nullo apparenti vitio afficiebantur; sinister verò sinus duplâ diametro laborabat, & arteria magna per ampla ab ipso corde, & stomacho validè premebatur; idcirco apud Ægrum superstes major vis in dextero cordis ventriculo minorem sanguinis quantitatem liberè, majorique velocitatis gradu in pulmonica vasa impellere potuit. Contra verò sinister ventriculus, propter minorem ex dilatatione vim, majorem san-

Expofita conjectura novis rationibus confirmatur.

LI gui-

guinis molem in præpeditam aortam expeditè trudere prohibebatur ; quæ certè cruoris remorâ præcordiorum angustiam, tandemque mortiferam suffocationem, ac syncopem induxit.

Lympha con-
cretionū causa
ex chymicis.

IX. Neque verò hîc animus est longiùs persequi rationes diversarum lymphæ concretionum, quæ à salino-acrium cum oleosis miscellâ particularum in locis minoris motus, aut majoris impediementi apud valetudinaria corpora, & nostrum præsertim Ægrum, cum in pulmone dextero, tum in supremo cerebri cortice contigerunt. Etenim fati ex chymicis tentaminibus innotescit, acria, sulphureis admixta, invicem coalescere, præsertim apud vinosos : unde spiritum vini cum urinæ spiritu in tenax corpus facillimè abire, videmus.

X. Cæterùm, ut omnes hujus necis causas breviter perstringamus, repetere cogimur, ex cerebri vitio minus spirituum, quàm naturalis hujus hominis postulabat œconomia, aliquantò priùs tempore mortis secretum fuisse ; unde virium debilitas, ex præcordiis orta, major adhuc reddebatur ex diminutâ per
ce-

cerebri corticem liquidi animalis separatione, quæ ob callosum inventum ejusdem glutinum ultro se nobis obtulit. Factum proindè fuit, ut ad repentinum interitum Ægri simul conspiraverint primò nova partium salino-acrium in fluidis exaltatio, quæ ex postremâ faucium phlogosi apertissimè innotuit; secundò motus corporis, dum quiete indigebat; tertio ingluvies, & vini abusus, cum diætâ opus erat; quartò suffocativa bronchiorum irritatio ex carbonum fumo, qui in cadavere per fuliginem tracheæ colorem in apertum se dedit; tandem (si fortè accesserit) Veneris œstrum, quod spiritus, maximopere impuros, ac perturbatos, in novum, atque omnino impropportionatum motum circa præcordia agere potuit. Unde cor ipsum, suapte naturâ magnum, & sanguine subsistente, gravius redditum, ob exiguas animalium spirituum vires ab omni penitus motu constantissimè defecit.

XI. Sed, nisi hîc longè de scholii cancellis abire vererer, profectò exemplis etiam ostendere possem, quàm facilis via sit ad præcocem, inopinatamque mor-

LI 2 tem

*Causarum ad
hanc subitam
necem conspi-
rantium epilo-
gus.*

*Fuliginis
tracheæ color
ex fumo car-
bonum.*

tem nimis aucta cordis moles , ejusque prolapsus . Unum tamen casum , nostro quippe simillimum , à ^a P. Marchetto descriptum , coronidis loco afferre liceat . Venetus quadragenarius , crapulæ deditus , anhelitu , & hypochondriorum angustia detentus , multis frustra adhibitis remediis , Patavium petiit , ubi postera nocte repente obiit : in cujus cadavere nihil præter naturam intrâ abdomen se prodidit ; verùm in thorace cor adeò amplum observatum fuit , ut tria naturalis magnitudinis æquaret : ventriculis itidem amplissimis , suæ capsulæ ubique pressius adhærebat ; superioribus , ac lateralibus partibus pleuræ etiam adnexum ; inferiori verò eidem diaphragmati . Scilicet , ut minimè sit hæsitandum , adauctam cordis molem , situmque ex prolapsu vitiatum , ad repentinam denique mortem conducere . Neque fortè ab hoc abludit casus , quem refert Gul. ^b Harveus fati curiosum , & eleganter descriptum . Sed circa solito majorem cordis molem ea , si exciderint , repetantur , quæ diximus lib. pr. cap. X. num. III.

^a observ. 49.
^b exer. 3. de
circul. sang.
pag. 253.

XII. Quòd si verò malum hoc corripiat

piat hominem , in victu , ac motu satîs temperatum ; tandem hydropis speciem induit , pedum œdemate , nocturnâ orthopnoeâ , jugularium venarum palpitatione , urinarum paucitate , atque angore paulatim inductis . Nec interim deerunt fortè Medici , qui , hujus ignoratâ morbi radice , non hydragogis modò , & mercurialibus , sed multis vesicantium , ustionumque tormentis Ægros extorqueant : Verùm de jis fusè in nostro de Aneurysmatibus Tractatu.

Cordis prolapsus quandoque hydropis speciem induit.

OBSERVATIO III.

Cita mors ob interceptum motum aeris , & sanguinis in præcordiis , unâ cum cerebri consensu.

H I S T O R I A .

Ioannes Baptista Avanzius, octodecim annos natus, D. Cæcilæ de Nobilibus famulus, ex orâ maritimâ Romanæ ditionis malam, circa præteritum autumnum, reportavit
va-

valetudinem . Hinc pravo vultus colore cum anhelitu laboriosam vitam Romæ ducebat , improbâque victus ratione usus , cum planè imbecillis esset , tamen adhuc serviebat . Præcedenti suum interitum vespere , largâ castanearum copiâ se ingurgitavit , noctemque proindè valde molestam , ex spirandi præsertim difficultate , transegit ; & in eâ quidem , post vomitum viscidorum humorum , cum melius habere crederetur , sequenti tamen die quæ fuit 3. Febr. 1706. mortuus repertus est , è cujus ore spumosa lympha , ut ex naribus filamenta sanguinis pendebant .

CAD AVERIS DISSECTIO.

CAdaver post 24. horas inventum est cum latice sanguineo , ex sinistra nare profluente , & cum thorace solito elatiori , ac tumidiori . Sectis tegumentis , occurrerunt intestina tenuia aliquantulum rubicunda , & intrâ abdomen modica quantitas feri sanguinei . Lien prægrandis , ac plumbeus , ponderis exactè librarum quatuor cum dimidiâ . Hepar sanum dixisses , si
bi-

bilem subviridem suâ in cysti contentam excipias. Cætera naturalia viscera vix cum notabili labe inventa.

II. Elevato sterno, serum in utrâque pectoris cavitate magnâ copiâ offendimus, & pulmones, costis colligatos, non ordinariâ quidem superficierum cohæsione, sed per albas quasdam, teretes, ac verè nerveas fibras, quas, oculo iudice, tendines putavisses. E cordis vasis, & cavitatibus sanguis nigerrimus extractus est, grumis, non in unum tenaciter coagulatis, sed atrâ cum tincturâ diffluentibus. Dexterum cordis sinum insignes polypi, certè plûs unciâ pendentés, ferè universum opplebant; sinistrum verò exiguus occupabat. Cordis, pulmonumque parenchymata summopere flaccida tractabantur.

Tendineæ fibræ pulmones costis colligantes.

III. Digni quoque animadversione fuerunt pulmones, qui, manu pressi, ut à colligatione cum costis divellerentur, cruento latice per dehiscentes quosdam in superficie meatus facilè manabant.

Latex à compressâ pulmonis superficie manans.

IV. Circumsecto cranio, & durâ matre, pia occurrit, solito rubentior, turgidis sanguine vasis. Quinimo cerebri su-

superficies, diductis duobus hemisphæriis, usque ad corpus callosum eâdem tincturâ laborabat. Apertis ventriculis anterioribus, serum limpidum effluxit, & plexus, qui intus serpunt, ex vasis solito tumentioribus constabant. Transversales quoque duræ matris sinus nigro fanguine opplebantur.

S C H O L I U M.

DUbiûm sanè in primis oriri possit, an mors ista purè subitanea dicenda fuerit, quippe quam longus integræ ferè noctis agon præcessit; sed, cùm dissectum cadaver quædam animadversione nostrâ ostenderit non indigna; idcirco promiscuè citum hunc cum aliis improvisis interitibus usurpabimus.

II. Illud utique non dubium est, hujus mortis causam fuisse interclusam penitus circulationem sanguinis in præcordiis, & cerebro, quam magnus Hippocrates sub genere fortis apoplexiæ comprehensam quoque voluit, ut optimè philosophatur egregius ille Hippocraticæ do-

doctrinæ assertor Martianus, ubi ostendit, aliquando apoplexiam fieri interce-
ptis vasis in thorace; quia scilicet ani-
madvertit, jis in partibus maximè appa-
rere effectus interclusionis, difficultatem
scilicet respirationis, & angustiam. Hinc
aliàs citatus Eruditissimus Fracassatus
apoplexiam, impedito motu sanguinis
in pectore, sæpius per anatomen ostendit.
In casu siquidem nostro mortem præcessit
anhelitus, & non minùs intrà cerebrum,
quàm intrà pectus, clara indicia moræ
sanguinis, quam Hippocratis Interpretes
stationem vertunt, detecta fuerunt.
Quid enim cordis polypi? Quid sanguis
effusus per intestinorum substantiam,
& remoratus in meningum vasis?
Quid tandem exundans cum intrà pectus,
tum intrà cerebrum serositas ostendit,
nisi, oppilatis, convulsisque pulmonum,
cordis, ac cerebri tubulis, lymphatica
præsertim vasa hanc illac diffilisse,
& ipsa quoque sanguiferorum extrema
eòusque diducta fuisse, ut secernendo se-
ro vitiosè dehiscerent?

III. Quoniam verò res quærimus, non
verba, brevem idcirco, dilucidamque

Mm

ætio-

^a In com. ad
tex. 2. de
morb.

*Apoplexia ob
vaforum tho-
racis interce-
ptionem ex
Martiano, &
Fracassato.*

*Morbi, &
mortis hujus
ætiologia.*

ætiologiam cum morbi , tum mortis exponi posse , arbitramur , si nobis proponamus Adolescentem , qui ex malâ victus ratione , & maximè ex diutinâ morâ , autumnali tempestate , in hujus maris littore (ubi autumnali tempestate summo opere noxius est aer) vitia fermentorum , ac sanguinis abunde contraxit , indeque labefactato viscerum , vasorumque tono , illud^a Luciani scœmma adversus Romanos tantò justius promeruit , quòd non solùm æger ambulaverit , sed quòd æger fanis , & valentibus famularetur : eò propterea devenit , ut contumacioribus semper redditis in liene obstructionibus , inductâque sensim polyporum congestione in cavitatibus cordis , ille non asthmate dumtaxat detentus fuerit , sed ad pectoris hydropem properaverit . In hoc autem rerum statu constitutus , cùm die ante sui interitûs noctem insalubri castanearum cibo largiùs usus esset , facilè indè , acidâ contractâ stomachi cruditate , excitatoque vomitu , hypochondriorum subjicit convulsionem , quæ acres eodem tempore ichores , diù intrâ prægrandis lienis loculos , aliarumque

^a de merced. conduct.

que glandularum folliculos fortè detentos, validè per sanguifluas, lymphaticasque venas, perindè quasi per totidem syphones, versùs cor, & pulmones (diù jam semi-obstructa, atque enervata) circumpulit, & injecit. Hi autem acerrimi ichores duplici ratione circulationem sanguinis apud præcordia interciperè potuerunt, scilicet tum contentum fluidum coagulando, tum continentes canales convellendo. Etenim primo loco fermenta ista salino-acria, ex hypochondriis repentinè sanguini affusa, ejusdem compagem, ac mixtionem maximè perturbarunt; unde, variatis cohæsiõibus particularum, fluida componentium, earundem æquilibrium, atque indè fluxilitas, quæ ubique ferè æqualis esse debet, vitiata fuerunt; coactisque proindè mutuò sanguinis fibris, hîc grumi occurrerunt, & polypi; illic verò serositas intrâ cavitates copiosius exundavit. Deinde verò hujusmodi etiam acerrimi ichores moram injicere sanguini cœperunt, in quantum scilicet canalium convulsionem, quam Hippocrates interceptionem definivit, induxerunt.

*Præcordiorum
labes à liene
communicata.*

*Circulatio in
jisdem duplici
ex causâ in-
tercepta.*

M m 2.

Cùm

*Vasorum con-
vulso quomo-
do contingat.*

Cùm enim sanguineorum textura ductuum tota fibrosa sit, ac muscularis; quoties particulæ præter naturam fluxiliores, & acutæ, à sanguinis miscellâ secedentes, intrâ fibrosum rete magnorum vasorum penetrant, necessariò, tanquam extranei cunei, eorundem crispaturam producant, & convulsionem, per quam, minoribus factis vasorum diametris, fluxus necessariæ molis sanguinis, devolvendi cum à corde in cerebrum, tum à cerebro in cor, impeditur; unde idem sanguis, ob crassiorem fibrosarum partium acquisitam consistentiam, atque ob viarum interceptionem, tandem circuire desistit. Et quoniam, ex eodem

a 2. de morb. ^a Hippocr. *cùm sanguis non movetur, fieri non potest, quin universum corpus quiescat; in hoc sanè vera syncopis, atque apoplexiæ, quinimo celeris hujus interitus ratio elucescit.*

*Cruenta ex
naribus fila-
menta, vasorū
interceptionis
indiciū.*

IV. In exposito verò casu, ut concretio fibrosarum sanguinis partium ex polytis evidenter innotuit, ita ipsam interceptionem vasorum cruenta filamenta, quæ de naribus, dum æger interiit, pendebant, clarè demonstrarunt; nimirum

rum venas jugulares, & superiorem cavam ita fuisse convulsas, ut sanguinem, quem à supernis venis exhaurire minimè potuerunt, per exiliores venarum nasi extremitates transversim erumpere coegerint.

V. Quòd si simplex cavæ ligatura, Hydropi ex
cava ligaturâ. docentibus primùm Lowero, ac Willifio, ascitem sex horarum spatio incane, alioquin sano, inducere potest; quantò sanè celerius in nostro casu tot complicatæ causæ hydropem producere, atque hominem diù ægrotantem perdere valuerunt? Unà enim conjurarunt fusæ, atque exuperantes ex coacto sanguine ferositates, pulmonum tunicæ dehiscentes, & sanguifera vasa partim obstructa, partim strangulata, itaut hæc simul omnia inchoatum jam pectoris hydropem (quem sanè eventum sæpe vidimus) momento temporis compleverint: hinc ferum, præ sui copiâ, thoracis machinam extrudendo, solito elatiorem reddidit, intusque, pulmones premendo, spatium ademit, in quod jidem, cùm nihil renititur, ob vim incumbentis per tracheam aeris, dilatari solent; cujusmodi sanè in-
spi-

^a 4. de morb.
num.33.

spirationis renixum mechanicè , exemplo phialæ , demonstravit ^a Hippocrates .

VI. Patet igitur , præpeditâ in præcordiis liberâ ipsius sanguinis trajectio-
ne, atque etiam prohibitâ respiratione,
Ægrum hunc citò fuisse peremptum, &
quidem conspirantibus præfocatione,
syncope, ac nervorum syderatione. Ne-
que enim à censu causarum celeris hujus
interitus excludendus venit defectus mo-
tus sanguinis, & separatio spirituum in
cerebro, ubi adèò clara indicia coacti
sanguinis intrâ meningum vasa apparue-
runt. Etenim, cùm ichores malefici
apud miserrimum Juvenem ex hypo-
chondriis celerrimè in præcordia ponan-
tur transducti; dubitari non potest, quin
juxta citissimæ circulationis legem ali-
qua eorundem portio etiam ex præcor-
diis in caput, agonis principio, ocysimè
derivata fuerit. Unde patet, quomodo
ipsa quoque cerebri apoplexia in Ægri
perniciem denique conspiraverit.

*Ab hypochon-
driis ad cere-
brum citissima
infectio liquo-
ris derivatio.*

VII. Hæc profectò satis nobis esse vi-
dentur ad morbi, mortisque causam ri-
mandam; nisi pro coronide velimus ad-
de-

dere nonnullas annotationes, ab ipso extractis deducendas, &

VIII. Primò quidem perpendenda venit singularis illa, per albas, teretesque fibras, pulmonum cum costis colligatio, quam sanè nobis rarò observare contigit. Adglutinatio siquidem pulmonum cum costis, quæ fit à validâ, & ubique æquali superficialium pulmonum, & pleuræ cohæsione, frequenter occurrit; illa verò, quam in cadavere isto offendimus, fortè majori ex parte congenita, non tota per morbum inducta aliquibus videbitur. Egregiè porrò hâc de re M. Malpighius in oper. posthum. in respons. ad Liparum, ubi istorum nativorum meminit vinculorum, quippe quos, sicubi inveniuntur, inspirationi admodum famulari, arbitratur.

Pulmonum cum pleurâ per ligamenta cohesio aliquibus fortè congenita.

IX. Secundò rarum quoque se nobis præbuit curiositatis argumentum, quòd, compressis pulmonibus, serositates, veluti ex imbutâ spongiâ, per dilatatos poros fuerint extrusæ. Hoc sanè nequaquam contigisset, nisi duo in pulmonibus mala, colluvies nempe serosa, atque extremorum vasorum hiatus, ex salinis
icho-

ichoribus , tanquam ex cuneis , ampliores redditi , simul concurrissent . Hinc claro experimento doceri possumus , in quem laxitatis statum veniant vasorum tunicæ , cum in obscuris , abditisque abdominis locis ad ascitis productionem dehiscunt .

Vasorum de-
hiscencia in
ascite.

Morbosa san-
guinis in corde
fluxilitas, un-
de.

X. Tertio negligi certè à doctis Viris non poterit examen causæ , cur sanguis in cordis ventriculis non quidem consuetâ tenaci densitate , sed friabili , ac diffluente consistentiâ inventus fuerit . Hoc sanè phænomenon ex defectu mixtionis rubræ cum fibrosâ , & albâ sanguinis parte , quæ intrâ cordis sinus in polypos coaluerat , deduci posse , censemus : reliquum enim sanguinis faciliè diffluit fibrarum retinaculo solutum ; ut passim contingere videmus etiam in extracto per venæ sectionem cruore , in quo , cum superior pars in albam concrevit gelatinam , inferior , quæ nigra apparet , semper solito fluidior occurrit .

Polypi acidi,
non alkalicis,
dissolvuntur.

XI. Differendum aliquid superesset de causis , ac modo , quibus polypi intrâ cordis , & sanguiferorum cavitates concreverunt , deque menstruo acido , quo extra cor-

corpus dissolvi solent , quando alkalicis fixis , aut volatilibus nequaquam superantur ; sed opus hoc , studio , experimentisque plenum , rejicimus ad Tractatum longè majoris laboris , atque utilitatis , quem de Corde , & Aneurysmatibus adornamus.

OBSERVATIO IV.

Repentina mors ex convulsione thoracis , præcordiorum , meningum , ac totius corporis , in fortissimam apoplexiam ocysimè desinente.

HISTORIA.

Ioseph Sali Pistoriensis ann. 54. habitus mediocris, olim hæmorrhoidibus, & biliosis diarrhæis vexabatur, quibus tempore deficientibus, sepulti in pectore dolores, ac recurrens incertis diebus spirandi difficultas, absque ullâ quidem anacatharsi, sed cum faciei squallore, rigentique artuum fri-

Nn . go.

gore illum urgere cœperunt. Ante mensem identidem in asthmatis paroxyfmis penè animo linquebatur, atque ob gravia quædam pathemata miserè, & cum mœrore vivebat. Tandem pridie ante mortem à Monialibus B. M. Assumptionis ad famulatum vocatus, laboriosam, sedulamque operam, huc illuc festinando, proprias ultra vires, locavit. Denique, suffocativo correptus anhelitu, aphonus repentè factus est, & universo corpore convulsus, animam efflavit, facie admodum tumidâ, oculis intrâ orbitam retractis, & spumâ ad os, ac nares confluyente. Obijt autem die 13. Martii 1706. horâ 23. in publicâ viâ, quæ ducit ad Templum S. Mariæ in Porticu.

CAD AVERIS DISSECTIO.

UNiversa corporis superficies excolor, facies verò rubicundolivescens apparuit unâ cum spumâ intrâ os, & nares, quæ, amoto sterno, alioquin valde depresso, per solam pulmonum compressionem copiosius redundabat. Virga, elapsis

*Virga subrigi-
da in cadavere.*

viginti quatuor horis ab interitu, adhuc subrigida cernebatur.

II. Universalia integumenta, cum primum cultro inciderentur, statim fluidissimo, sed atrii coloris, sanguine, perinde quasi adhuc inter vivos versaretur Æger, affluenter manabant.

Summa sanguinis fluxilitas in eodem.

III. Referato abdomine, omentum, intestina gracilia, & mesenterium ruebant, diffuso, ac detento per minima illarum spatia sanguine.

IV. Pancreas ob morbidam substantiæ molliem ferè ductile deprehensum fuit.

Pancreatis mollioris excedens.

V. Hepar, quanquam neque mole, neque colore, aut substantiæ ratione à naturali statu recedere videretur, in cysti tamen bilem fluidissimam, ac subobscuri coloris continebat. Cætera in abdomine viscera prorsus illæsa, & integra invenimus.

VI. Aperto thorace, lerna malorum venit in conspectum; etenim pulmones, utroque in latere, pleuræ, diaphragmati, & pericardio ita adhærebant, ut nec digitis evelli, nec cultro æqualiter ab imo ad summum separari potuerint. Et quanquam in pulmonibus neque pus,

Fortis pulmonum ad singulas in thorace partes adhaesio.

Eorundem rigiditas.

Nn 2 ne-

neque serum occurrisset, contractio tamen quædam, & renitentia, seu diminuta flexibilitas observabatur.

Ira & cordis.

VII. Cor, licet mole non magnum, adeò tamen tumidum, tensum, & orbiculatumprehendimus, ut in systole adhuc positum dixisses. Vena cava, & auricula dextera naturali diametro aliquantulum ampliores, fluidoque sanguine tumebant; quo sanè cruore, & quidem multò fluidiori, scatebant sinistrae cordis cavitates, in quibus nullus polypos, aut grumus latitabat.

*Valida dura
matris contra-
ctio.*

VIII. Secto cranio, dura mater excolor, & supra cerebri corticem admodum contracta; pia verò, suis tumentibus ex fluido sanguine vasis, occurrit. Cùmque amputaremus portionem corticalis, & medullaris cerebri partium, vidimus (ut apud strangulatos) puncta sanguinea spisso agmine candidam medullæ substantiam variegare. Pallidam serositatem non apertis solum ventriculis profuississe, sed ad usque spinalem medullam redundasse, deprehensum fuit.

*Serum à cere-
bri ventriculis
ad usque spi-
nalem medul-
lam effusum.*

SCHO.

S C H O L I U M.

U Nicam nascendi , innumeras
 verò moriendi hominibus esse
 vias , nihil est , quod nos doceat
 apertius , quàm ipsa cadaverum
 sectio , quæ occultas necis causas
 ad solis lucem evidenter exponit. Vi-
 dimus in præcedentibus extispiciis , quàm
 variæ moriendi rationes fuerint detectæ ;
 nunc rara interitus causa se offert in
 descripto Ægro , ejusque dissecto cadavere.
 Etenim , quanquam morbus , quo dece-
 sit , vulgaris , ac notissimus videri possit
 alicui , qui solidarum vitia partium con-
 siderare solummodo velit ; fuit siquidem
 vehemens , atque contumax convulsio
 præcordiorum , quæ , cerebro , & univer-
 so corpori communicata , aeris , sangui-
 nis , & liquidi nervei alternum fluxum ;
 ac refluxum lethaliter præpedivit , unde
 fortissima tandem apoplexiæ species ex-
 orta est ; attamen si sedulò advertamus ,
 per dissectionem cadaveris singularem
 sanguinis crasim innotuisse , uberio-
 rem certè materiem admirandi simul , ac phi-
 losophandi offendemus : inventus quip-
 pe

*Morbi hujus
 natura qualis*

Sanguinis fluxilitas in cadaveribus rara.

pe fuit post integrum à morte diem cruor adeò solutus, & fluens, ut, si homo iste funeri superstes fuisset, fluidior esse non potuerit. Hæc profectò sanguinis in cadaveribus conditio ita rarò existit, ut, si quando id evenerit, portentis, ac prodigii simile numeretur; & quemadmodum ab insolenti causâ proficiscitur, ita vires, effectusque nonnisi insolentes nostris in corporibus producere valet. Sed jam utraque tam solidorum, quàm fluidorum mala seorsim, diligenterque perpendamus.

Signa, spasmi in præcordiis, & cerebro indicantia.

II. De mortifero præcordiorum, cerebrique spasmo clara occurrerunt indicia ante, & post mortem, videlicet sepulti in pectore dolores, difficultas respirationis absque ullâ anacatharsi, angor suffocativus, spuma ex naribus, & ore, quæ pressis pulmonibus, affluentior fiebat, sternum depressum, oculorum retractio, totius denique corporis, atque ipsius etiam penis convulsio; quibus adjuncta fuit elegans observatio rotunditatis, ac tensionis in corde, quæ probabiliter nos docuit, vitalem hunc musculum, dum Æger interiit, pertinaci con-

convulsione fuisse correptum . Cui sanè cùm ingens accesserit quantitas cruoris , intrà suas cavitates reperti , nostrum subit animum dubitatio de insuperabili renixu sanguinis , qui , cùm ob pulmonum ; totiusque corporis convulsiones liberum in arteriis spatium invenire non posset , ut cordis pulsioni obsecundaret , necessariò intrà ventriculos , diastolis tempore , admissus , à quantâcunque cordis contractione urgeretur ad egressum , subsistere tamen , tandemque validissimè reniti coactus fuit . Unde postremus ille ortus est præcordiorum angor , penitusque , & ex tempore disruptus vitalis ille circulus à corde in cerebrum , & à cerebro in cor . Qui sæpe vivorum sectionibus interfuerunt , ignorare nequeunt , sanguinem , arteriâ magnâ casu , vel arte compressâ , non invenire spatium , per quod liberè excurrere possit ; unde cor manet plenum , immobile , ac rotundum , citòque animal moritur .

Ex aorta compressione cordis immobilitas , rotunditas , &c.

. III. Status deinde duræ matris clarè pariter nobis ostendit pertinacem convulsionem , in quam ipsa paulò antè Ægri mortem venerat ; inventa enim est

Spasmus meningum uni-versæ convulsionis origo.

est excolor, simulque contracta, ut non sit hæsitandum, quin idem meningum spasmus, qui cerebrum obsidebat, ac circumcingebat, universæ radix extiterit convulsionis.

Sanguis in cadavere cur fluxilis adhuc persistit.

IV. Sed hæc notiora sunt, quàm ut longius examen mereantur. Pergamus igitur ad particularem illam, & raram conditionem fluiditatis, quâ sanguis non in præcordiis modò, & cerebro, sed in toto etiam succutaneo corpore donabatur. Hoc sanè phænomenon pro causâ habuisse suspicamur non solùm violentiam motûs corporis, quam Æger postremo suæ vitæ die sustinuit, & per quam id contingere cruori suo potuit, quod evenit in recenter effuso, & diù in vase agitato sanguine, qui eum ob motum in fibras coalescere nequit; sed potissimùm exaltationem salium acrium, maximè ad urinofam naturam accedentium, in homine, cæteroquin hæmorrhoidibus, ac biliosis diarrhæis olim detento: qui profectò sales, cùm per vehementem, crebròque repetitam corporis exercitationem, oleosis spiritibus, & aqueis partibus, quorum miscellâ cicurabantur,

ex-

exhausti fuerint ; nil mirum , si , intimè cum sanguine agitati , ac permixti , eam fluxilitatem eidem conciliare potuerunt , quam induci passim videmus in extracto recenter è venâ sanguine per additionem salis urinosi , & præcipuè spiritus salis armoniaci .

*Salis urinosis
vis ad san-
guinem dissol-
vendum .*

V. Cùm verò infusiones liquidorum acrium intrâ viventium brutorum venas nobis non semel ostenderint , easdem præcordiorum , totiusque corporis immanes convulsiones , quas illico mors sequitur , inducere ; nihil est , cur dubitemus , quin vera causa convulsionum , quæ nostrum Ægrum ad necem perduxerunt , extiterit copia hujusmodi fluidorum salino-acrium , quæ , cùm nimiùm exaltata , & acutissima reddita , ex hypochondriis intrâ sanguineos canales magnâ copiâ transducuntur , veneni naturam induunt . Tunc enim propriæ excessu molis naturalem reliquarum in sanguine particularum superant proportionem , ac proindè ratione propriæ indolis cruorem non tantùm fluidiorem , ac mobiliorem , sed , quod magis est , procliviorum efficiunt , ut ex naturalibus vasorum cancellis facilè se

*Conjectura de
convulsionum
causâ experi-
mentis confir-
matur .*

*Mali fomes
in hypochon-
driis .*

O o pro-

proripiat, atque intrâ strictissimam compagem fibrarum muscularium, vasorum, & glandularum ultro se insinuet, ac penetret; hinc nervorum, musculorum, vasorumque convulsiones, unâque simul incongruæ contentorum fluidorum separationes, ac moræ, ut in præsentî casu, solent contingere.

VI. Movet autem nos ad credendum, scatebram prædicti liquidi salino-acris, & armoniacalis in hypochondriorum folliculis latitasse, quòd observaverimus non solum cysticam bilem fluidissimam, ac subobscuri coloris (cujusmodi evadere solet artificiali admixtione salium acrium) sed ipsum quoque pancreas lentorem plicabilem, ac ferè ductilem adeptum fuisse, qui planè oriri poterat ex diurnâ, & copiosâ secretionem fluidi acerrimi, ac dissolventis, quod strictam illius glandulæ fibrarum cohæsiõnem eliminare, debilitare, ac ferè tollere valuerit; unde resistentia minor, seu mollities major eo in viscere producta fuit: quemadmodum sanè in cadaveribus illorum, qui ex diabete perierunt, renes omnino flaccidi, plicabiles, ac ductiles, ob eandem rationem, inveniri solent.

*Diabeticorum
renes ductiles.*

VII.

VII. Similiter non aliunde petenda esse videtur causa tam profundæ intrusionis sanguinis intrâ strictissimam cerebri medullam, quàm ex convulsione contentium, simulque dissolutâ nimium compage contenti liquidi, cujus major fluiditas, ut è succutaneis vasculis, ad simplicem integumentorum scissionem erumpendo, prodiit; ita in cerebro ulteriorem penetrandi vim nacta fuit à meningibus, sinubusque convulsis, perinde quasi à consociatis ad circumpellendum manibus. Unde cruor, ad usque medullarem cerebri substantiam expressus, rubentibus illam punctis variegavit.

VIII. Ipsa quoque perseverans post mortem penis tensio (quæ rarò in strangulatis non invenitur) præteritæ universalis convulsions testis adfuit. Cùm enim virile membrum sit musculus mirabilis contexturæ; cæterorum instar muscutorum, spasmodicas affectiones pati potest. Modum verò, quo penis juxta naturæ ordinem tenditur, egregiè tradidit Malpighius. Illud tantummodo ad rem nostram hic perstringimus, quòd, sicuti spuria quædam colis erectio in cadaveribus ex-

Sanguinis intrusio ad cerebri medullam unde.

Penis musculus.

¶ In cons. de impot. vener. apud Bibl. Med. Manget.

Ejusdem nota erectio in cadaveribus, quomodo exci-

Qo. 2.

ci-

citari potest per solam injectionem tepentis cujuslibet liquidi intrâ ejusdem arterias, dummodo venulæ filo strangulatæ, ne refluat, impediunt; ita profectò non dubitamus, quin ejusdem erectio, quæ ob nervorum, fibrarumque convulsionem, fluida in sinibus fistulosorum corporum intercipientem, ante hujus Ægri mortem cœpit, persistente eodem fibrarum spasmò, vel post mortem perseveraverit.

Sanguine fluxili existente, quomodo facies pallida, & extrema frigida perduraverint.

IX. Cæterùm non adeò laborandum in eâ dubitatione, quomodo scilicet stare simul potuerint summa fluiditas sanguinis, & facies excolor, atque artuum illud frigus, quibus Æger iteratis in præfocationibus detinebatur. Etenim eadem vasorum strangulatio circa præcordia, quæ suffocativum asthma sæpe intulit, liberum sanguinis per extremas arterias excursus, & ignearum particularum per minima carniùm diffusionem præpediebat; unde caloris, ac vividi coloris privatio exoriebatur; quam sanè privationem consequitur sensus frigoris, quemadmodum apud hystericas mechanicâ istâ vasorum lege accedere, ac recedere; passim ob-

observamus. Quo fit, ut magnus ille Medicorum Romulus, ut rectè ^a Hippocratem Solertissimus Baglivus noster, post Sydenhamium, appellavit, scripserit ad rem:—*Colorum mutationes, corde adstringente venas (intellige etiam arterias) ac laxante, fiunt; laxante quidem, rubicundi, ac bene colorati; constringente verò, cum pallore lividi, &c.*

^a lib. de off. nat. n. 28.

Juxta varias cordis affectiones colorum in facie mutatio, ex Hipp.

X. Mortuus itaque improvisò miserimus homo juxta magni Senis ^b effatum, ^b aph. 4r. cum tam frequenter, ac fortiter absque manifestâ, scilicet externâ, causâ animo defecisset; & denatus est ob complicationem trium malorum, suffocationis, syncopis, & apoplexiæ, quam sub voce syderationis, ab acri humore pendentis, idem ^c Hippoc. per hæc verba, oraculorum loco ^c l. de gland. habenda, accuratissimè descripsit:—*Cerebrum autem cladem perfert, etiam ipsum non sanum existens, sed, si quidem radatur (en modus convulsiois) turbationem multam substinet, & cerebrum convellit, ac distrabit totum hominem (en convulsio universalis) qui in se ipso vocem non edit (en aponia) & suffocatur (en suprema complicatio malorum, præfocationis scilicet, syncopis, & apo-*

Triplicem ob morbum hic Eger perit.

^{n. 9.}
Hippocratis oraculum.

Syderatio interdum à corde, ejusque vasis derivatur.

a. conf. de Anat. pract.

apoplexiæ) demum concludit, — Et hæc affectio syderatio, Et apoplexia appellatur: — quæ quidem non semper in solo cerebro quærenda est: Aliquando in vasis, aut cavitatibus cordis obstructis, compressis, atque convulsis, intercepto cruore, delitescit. Sæpe in uno ægro multæ partes, immo omnes observantur affectæ, vitio vel primario, vel secundario, ut scitè advertit Thomas.^a Bartholinus, & nos in præsentī casu notavimus.

OBSERVATIO V.

Improvisa mors ex subitâ cavæ intrâ pericardium disruptione, cum aneurysmate arteriæ magnæ.

H I S T O R I A.



Stephanus Ascieri sutor Januensis, sexagenario major, habitus carnosī, octo ab hinc annis podagrâ, & chigragrâ circa æquinoctia graviter vexatus, ante biennium tussi cum spirandi difficultate detine-

tineri cœpit ; deinde cordis palpitationem , & sepultum quemdam sub dextero sterni latere gravativum , atque interdum acutum dolorem , ad usque humerum propagatum , pectoris angustiam , ac profundam pulsationem passus fuit .

Sepultus sub dextero sterni latere dolor cum palpitatione cordis .

II. Decursu proximè præteritæ hyemis non rarò corripiebatur etiam vertigine cum sensibili capitis excalesfactione , ac præcipiti virium lapsu . Quare sæpe ad suendum ineptus reddebatur . Dimidium Quadragesimæ falsamentis transegit . Tandem die 14. Martii 1706. horâ 17. cùm à prandio merum ingurgitasset , statim aphonîâ , atque angore cecidit exanimis .

Verrigo tenerrima .

CAD AVERIS DISSECTIO.

Mirabile profectò nobis visum fuit , quòd nullum in abdomine contentum viscus à naturalis œconomîæ legibus recessisset ; adeò singula colore , mole , ac substantiæ ratione optimè constituta occurrerunt . Sola cystica bilis subobscurum quid referebat .

II.

II. Horrendum è contrario spectaculum thorax nobis exhibuit ; detracto enim sterno (quod parte sui dexterâ elatius erat sinistrâ) dexter pulmo rubicundior , & pleuræ admodum adglutinatæ , cum adnato duro , & magno corpore apprensus , curiositatem nostram lætavit , ut diligentius rei novitatem detegeremus . Latebat enim statim extra pericardium aortæ aneurysma ; deinde adacto cultro , illico lamellam osseam deprehendimus figuræ ovalis , quæ externam dilatatæ arteriæ partem , quâ sternum , costasque dexteræ respicit , occupaverat . Sub eâ laminâ , & circum aortæ cavitatem , quæ antè posita est , polypeam substantiam , instar lardi , in fornicem adeò concinnè incrustatam invenimus , ut nunquam aliàs in aneurysmatum cysti similem detegere datum fuerit ; hoc siquidem corpus igne priùs liquatum , & mox frigore integrè concretum videbatur ; non enim in multiples laminas , ac veluti in folia distrahi (ut passim solet) patiebatur . Unde constitit , validum aggerem pulsioni sanguinis versùs externas partes positum fuisse .

Fa-

*Dextera sterni
pari elatior .*

*Aorta aneu-
ryfina .*

*Lamella ossea
in aneurysma-
te .*

*Rara polypi
construtio in
aneurysmate .*

Facie verò , quâ pulmones tanguntur , minori polypeo repagulo obsessam , tectamque aortam deprehendimus . Aneurysmatis interea cavitas tam ampla occurrit , ut pugnum facilè admisisset , tamque grumoso plena sanguine , ut nihil fluidi amplius capere possè videretur ; nusquam tamen magno aliquo foramine dehiscebat , licèt ad cordis basim intrâ pericardium , & ad inferum latus aneurysmatis nigræ quædam striæ , majorum fortè futurorum hiatus indicia , observatæ fuerint . Longitudo ipsius aneurysmatis non excedebat longitudinis aortæ , quâ curva est , dimidium , quæ proindè aorta cum supra , tum juxta cor nativam diametrum , ac fibrarum validitatem fartam , tectamque eleganter servabat .

Striæ ad latus aneurysmatis quid indicarent .

III. Sed non hîc malorum finis ; etenim , cùm ipsum pericardium maximè tumidum , molle tamen , animadvertemus , suspicati fuimus de latente aliquo præternaturali fluido . Sectum proindè ingentem dedit , quantam scilicet capere poterat , effusi , atque in grumos conversi cruoris quantitatem , quæ certè duarum librarum pondus excedebat .

Concreti sanguinis copia intrâ pericardium .

Pp

San-

*Vena cava
ruptura.*

Sanguis verò effluxerat, aperto intrà vestibulum venæ cavæ juxtà dexteram auriculam foramine diametri unciaë circiter unius, quod paulatim ab erodente liquido factum fuisse in muscolari ejusdem texturâ, planè indicabant ipsius oræ, quæ non in fimbrias, ac lacinias solutæ, sed veluti per limam omnino expolitæ observabantur. Quominus autem sanguis multò priùs intrà pericardium exundaverit, impedivit forsitan subtilis illa, in quam muscularis definit, tunica, quæ, hiatus superextensa, egressum clauderat, cujus tunicæ tenuata fragmenta ad ulceris extrema videbantur pendere.

IV. Secto tandem cranio, niger sanguis ex vulnerato forte fortunâ posteriori sinu duræ meningis largè profluxit; quod genus magnâ pariter copiâ in lateralibus sinubus continebatur. Ventriculi cerebri limpido tumebant fero, quod ad principium spinalis medullæ redundaverat.

SCHO.

S C H O L I U M.

A Deò perspicuè patet natura , & vis lethalis mali , quo hic homo subitò decessit , ut nullo penè commentario indigere videatur . Etenim , cùm integritas , & continuïtas magnorum sanguiferorum ad vitæ conservationem omnium maximè sit necessaria ; mirum proculdubio videri non debet , si , adèò enormiter dilatatâ arteriâ magnâ , & abruptâ repentè continuïtate , & integritate summi caudicis venæ cavæ , fluxus sanguinis à venis in cor , atque à corde quaquaversum unâ cum vitâ illico in exposito Sene defecerit .

II. Possèm hîc de ortu , ac discriminibus aneurysmatum plura differere ; sed , quia nunc scholiorum brevitati studendum , aptiorem illis locum , volente Deo , tribuemus . Id verò crebra experientia nos edocuit , aneurysmata præcordiorum apud Ægros , erodentibus ichoribus refertos , plerunque incipere ab universali quâdam spasmodicâ arteriarum affectione , quæ postremò in corde , aut summis vasis determinatur .

Præcordiorum aneurysmata sæpe ab universali arteriarum spasmo incipiunt .

Pp 2.

Quo.

*Clariora præ-
fati morbi in-
dicia.*

Quo fit, ut primùm de vagâ , atque huc illuc per collum , & artus errante arteriarum palpitatione conquerantur . Deinde intrâ pectus malum sistitur , sæpe tuffis urget , cor salit , & graviùs pulsât , mox sepultus , ac brevî fugitivus corripit dolor , qui postea pertinaciùs hæret , & modò ad alteram scapulam , claviculamve , modò per brachium , quandoque usque ad cubitum propagatur . Tandem profunda persentitur pulsatio ; elevantur alicubi costæ , aut sternum ; cæteraque succrescunt gravia , & prorsus miseranda atrocis hujus mali phænomena , quæ ut plurimum subitâ morte finiuntur .

III. At verò , quanquam omnia , & singula symptomata , quibus hic homo suorum initio malorum tentatus fuit , & an eadem vexaverint , quæ superiùs exposuimus , noscere minimè potuerimus ; attamen qualiscunque morbi progressus , quem ab illius familiaribus sedulâ inquisitione comperimus , atque extispicio præfiximus , fatîs ostendit , ejusdem corpus , podagrâ obsessum , acribus , pungentibusque ichoribus (ut vel cystica bilis argumento fuit) redundavisse ;
qui

qui sanè ichores , cùm per biennium ante illius mortem subsistere cœperint in præcordiis , tussim excitarunt ; & paulatim , comitantibus doloribus , pondere , atque anhelitu , intrâ substantiam tendineam aortæ , simulque muscularem venæ cavæ intercepti fuerunt , quibus in locis , verosimile est , primùm irritationem , & convulsionem cum cordis palpitatione , deinde verò istorum etiam canalium exesionem , tandemque inchoatam fuisse diloricationem , in quâ vera aneurysmatum natura consistit .

*Aneurysmati
natura in quo
consistat .*

IV. Si quis autem diligenter animo teneat , arteriam magnam , & venam cavam in Ægro incurvi habitus ob artem futoriam , angustiiori situ , quàm humani corporis ferat constitutio , coerceri ; fortè causam inveniet , cur initio morbi sanguis , majori nisu ob tussim exagitatus , prædicta sanguifera vasa vehementiùs distenderit ; deinde quomodo per impetum reciprocati sanguinis minimo negotio haberi potuerit intrusio , & mora pertinax salino-erodentium ichorum intrâ fibras eorundem canalium . Rarò enim qui sessilem , incurvamque

*Arts futoria
quomodo infir-
mandis præ-
cordiorum va-
sa contulerit .*

*Artifices se-
dentarii cur
rarò sani con-
sensescent .*

du-

ducunt vitam, si vitiosis redundant succis, absque insigni aliquâ pulmonum, cordis, aut magnorum vasorum labe consenescent.

Ex aneurysmatis folliculi sanies effusa.

Cave erosio quomodo in aorta.

V. Et quoniam nigræ quædam striæ ab aneurysmatis fundo ad cordis basim intrâ pericardium apparuerunt; dubitandi ansam nunc præbent, subtilem, acremque saniem (quam aneurysmaticus quisque folliculus perpetuò fundit) sensim supra cavam destillasse, ut illius magnam erosionem saltèm acceleraverit; præsertim cum aorta isto in homine, ut dictum est, ex inflexo dilatati trunci situ necessariò magis appropinquaverit ad cavam: quo factum fuit, ut affectiones utriusque sanguiferi ferè per contactum adaugeri mutuò potuerint.

Frequens cordis palpitatio, & vertigo unde.

VI. Non admodum hîc laborabimus in exponendâ cæterorum ætiologiâ symptomatum, quæ Sutorem hunc ante mortem maximè exercuerunt; cum abunde ex legibus motus sanguinis evadat perspicua. Etenim, ut recurrens cordis palpitatio procedebat ex reflexione motus sanguinis ab aortæ aneurysmate versus cor; sic frequens vertigo, & capitis

ex-

excalefactio ex impeditâ identidem tra-
 jectione sanguinis à cavâ intrâ dexterum
 cordis ventriculum , proficiscebantur .
 Sanguis enim , qui à cerebri sinubus in
 jugulares , & cavam , indèque intrâ cor ,
 solutè , ac liberè , in homine valente , at-
 que incolumi , motus fuisset ; in casu no-
 stro ab erosâ , suisque propterea viribus
 enervatâ , cavæ texturâ , per cordis itine-
 ra nonnisi ægrè urgeri poterat ; ac pro-
 pterea idem sanguis , majori sæpe sæpiùs
 quantitate intrâ cavam collectus , impe-
 dimento erat , quominùs subsecuturus è
 jugularibus venis , sinibus duræ matris ,
 ac cæteris capitis sanguiferis , liberè de-
 scenderet . Unde quemadmodum ex ma-
 jori ignearum particularum per minima
 cerebri diffusionè , inæqualique irritatio-
 ne , & pressione calor , ac vertigo contin-
 gebant ; ita ex intercepto eodem tempo-
 re motu sanguinis è cavâ in cor , præ-
 ceptus virium lapsus oriebatur ; cujus cer-
 tè deliquii causam , quam aliam quære-
 mus ? cùm in promptu sit , cor inter
 duo positum fuisse aneurysmata , cavæ
 nimirum , quod sanguinem frequenter
 eidem subtrahebat , & aortæ , quod il-
 lum

*Quare præceptus
virium lapsus.*

*Cor duo inter
aneurysmata
locatum.*

lum identidem in cor repellebat ? Quæ sanè res in causâ fuit , ut sanguis , in cerebro etiam retardatus , ex dissecto duræ matris sinu largè pròfluxerit . Neque aliunde petenda est ratio inventæ serositatis intrâ cerebri ventriculos , quàm ex summâ plexuum turgentiâ , ac distensione , cujus vi , diductis , ampliatisque poris tunicularum vascula comprehendentium , subtilis percolatio feri , veluti per manicam Hippocratis , habita est .

VII. Denique repentina mors , quam
a in coac. ^a Hippocr. prædixit senibus , quibus cordis dolores sæpiùs consvescunt , tribuenda esse videtur subitæ ruptioni tuniculæ illius , quæ , cavæ foramen tegens , cruoris effluxui renitebatur . Sanguini verò duplex consociata probabiliter vis novissimè accessit , scilicet erosiva ex falsamentis , per dimidium Quadragesimæ ingurgitatis , & extrusiva , seu distractiva ex hausto tandem meraco . Unde junctis cunei , & vectis viribus in sanguine , tenuissimum illud membranæ repagulum cedere coactum fuit ; vitæque , fluente cruore de cavâ in pericardium , illico recessit .

Unde repentina mors .

VIII.

VIII. Neque sanè hujusmodi mortis genus novum erit jis, qui in Medicarum historiarum lectione versantur. Prostant enim similia exempla apud ^a Bellinum, aliosque; ut nostra nunc taceamus. Sed unum legimus descriptò casui ferè tam simile, quàm ovum ovo, apud ^b Andream Laurentium in Equite Guicciardino Legato Magni Ducis Hetruriæ ad Regem Gallorum; qui, tametsi, cum Magnatibus quibusdam obambulans, familiariter colloqueretur, subito respiratione, pulsu, & vitâ privatus cecidit; cujus in cadavere inventum fuit venæ cavæ ostium disruptum, & arteria magna ita dilatata, ut brachii amplitudinem æquaret. Sed hîc demirari satis non possumus, quomodo insignis adedò Anatomicus miratus fuerit, quòd nulla externa causa ad cavæ disruptionem accesserit; perindè quasi internæ, ut passim videmus, satis esse non potuerint.

^a de morb. pect. tit. de inter. pulm.

^b lib. 9. qu. 18.

Similis historia ex Laurentio.

Causa internæ ad vasorû disruptionem sola sufficiens.

F I N I S.

Qq

Le

Lectori suo.

HActenus pro viribus nostram fidem persolvimus. Speramus interea, ut quæ non minùs celeriter, inter occupationes nostras, quàm candidè scripsimus, ab æquis, ingenuisque Lectoribus, ad Reipublicæ utilitatem, ad quam studia nostra direximus, perhumaniter referantur. Huic verò labori, inchoato in Ædibus Vaticanis medio Januario, supremam imposuimus manum in Ædibus Quirinalibus, ipsis Kalendis Novembris ejusdem anni MDCCVI. Augustissimis nobis faventibus Auspiciis S. D. N. CLEMENTIS XI. PONTIF. verè, inter Optimos, Maximi.

IN.

I N D E X

Rerum , & verborum , quæ in hoc Opere continentur .

A

- A**bdominis tensionem e-
nervantia. pag. 193
Abscessus polypeus menin-
gum. 67
Acicula sub unguibus adacta
apoplecticos excitat. 192
Æquinoctia apoplexiarum fe-
racia. 128
Aer unum ex tribus fluidis ma-
joris usus. 3
— sanguinem fecundat. 76
— in conclavi calido, mon-
tiumque cacuminibus san-
guini premendo est insuffi-
ciens. 18. 20
— ad subitam necem diver-
simodè concurret. 18. 75. &
seq.
— ejus in pulmones ingres-
sus variè inhibitus repenti-
næ mortis causa. 50
— pondus, vel moles nimis
aucta, aut diminuta subitæ
necis causæ. 18. 20
— in fodinis metallicis pon-
derosus, & lethifer. *ibid.*
— qui pravus dicitur, juxta
corporum dispositiones no-
xiam infert. 21
— externus cum interno æ-
quilibratus mortem infert
repentinam. pag. 51
Aeris probi mutatio in deiete-
rium mortifera. 107
— motus vehemens, vaso-
rum rupturam cur accele-
ret. 144
— virus in hac Romanâ
constitutione non unicè cul-
pandum. 167
— ejus tamen intemperies
quomodo subitæ morti con-
tulerit. 170
Agyrtæ cur vitandi. 58
Aloetica phlegmaticis conge-
stionibus curandis opportu-
na. 156
Amara præservant à spasmis,
ex materiâ viscidâ. 147
Aneurysmata quid. 301
— sub varicum nomine
comprehendit Hippocra-
tes. 143
— præcordiorum sæpe ab
universali arteriarum spas-
mo incipiunt. 299
— istorum clariora indicia.
300.
— interna quosnam citius
perimant. 117
— ex horum folliculis sanies
effunditur. 302
— horum prophylaxis quæ
securior. 143. & seq.
Animalia in machinâ Boylia-
Qq 2. nâ

- nâ cur moriantur. pag. 18
 Animalium perfectorum vita
 in quo verè confultat. 4
 Animi deliquia inter signa cor-
 rosionis magnorum vaso-
 rum. 14
 — ut subitam mortem præ-
 fagiant, quid opus sit: 114
 Animi passiones, solida debili-
 tando, mortem improvifam
 accersunt. 17
 — spirituum excursum ad
 præcordia perturbant. 44
 — cur sint lethales. 33. 72.
 & seq.
 Animi tranquillitas, & diæta
 ad subitam mortem aver-
 tendam ex Sac. Pag. 159
 Anni quædam tempora no-
 xia. 105
 — etiam ex Hipp. 106
 Aortâ compressâ, cordis ro-
 tunditas. 287
 — ejus aneurysma. 296
 Aphonia præceps ab interce-
 ptione venarum ad cerebri
 basim. 40
 — ex hac quomodo, &
 quando oriatur apoplexia.
 40.
 Aphonis sublingualium inci-
 sio prodest. 185
 — ejus rei experimentum.
 199.
 Apoplexia ex epilepsiâ cur, &
 quando. 46. & seq.
 — epileptica ex animi pas-
 sionibus. 73
 — ob vasorum thoracis in-
 terceptionem. 273
 — ejus potior causa non est
 lymphæ in cerebri sinibus
 collecta. 34
 — à frigidis succis rarò pro-
 cedit. pag. 195
 — aliquando ob hæmor-
 rhoides suppressas. 124. &
 seq. 204.
 — rarò apprehendit absque
 præviis signis, & quæ sint.
 128.
 — hac correpti, vid. præfo-
 cati.
 — in senibus quando invin-
 cibilis. 80
 — pulmonum mortifera.
 102.
 — exemplo demonstratur.
ibid.
 Apoplexiæ præservatio Rô-
 mæ. 154
 — ejus curatio quibus reme-
 diis tractanda. 191. & seq.
 — non semper calefacienti-
 bus. 194. & seq.
 — per inediam curata apud
 Hippocratem. 81
 Aquæ antepilepticæ Langii
 vera formula. 148. & seq.
 Aquea utilia in spasimis hypo-
 chondriorum. 146. & seq.
 — in salinis pectoris conge-
 stionibus. 150. & seq.
 Arcanorum abusus in medici-
 nâ. 57. & seq.
 Aristoteles de vitâ obscure
 sensit. 2
 Ars Naturæ opera imitatur. 4
 Ars sutoria, vide sutoria.
 Arteriæ carotides, vid. caroti-
 des.
 Articuli pulmonum, vid. pul-
 monum.
 Artifices sedentarii cur rarò
 confenscant. 301. & seq.
 Artium sphacelatorum am-
 putatio quandoque subito
 interficit. 73
 Aspe-

Aspera arteria, vid. trachea.
 Asthma convulsivum quando mortiferum. pag. 105
 Athletæ quomodo, & quando repentinis mortibus corripiantur. 117. & seq.
 — quomodo à subitâ nece preservandi. 135. & seq.
 — his quando imperanda exercitatio. 136
 — jisdem stomachus validus obest. *ibid.*

Audacia, vide timoris.
 Auri tinctura absque menstruo corrosivo laudatur. 195
 Auster, & Aquilo noxii ex Hippocr. 171
 — ille Romæ deterior. *ibid.*
 Authoris ætas. 167
 Autumnale æquinoctiî phthisicis mortiferum. 120

B

B Aglivus laudatus. 293
 Balnea aquæ dulcis in calidâ paralyfi. 217
 Balneum frigidum post corporis calefactionem repentinæ mortis causa. 33
 — ejus usus in spasms à materiâ subtili. 147
 Bernabeus Physicus nominatus. 183
 Bernardini Medici mentio. 201.
 Biliaræ vesicæ pus, & ulcera in cadavere observata. 246
 — mala ab his producta. 250
 Bilis vitia multorum pectoris morborum radix. 254
 Bonaventura Eleemosynarius Sec. Pontificis cordis palpi-

tatione laborans. pag. 112
 Bonum nullum in terris absq; mixturâ mali. 180
 Bottinus Archiepiscopus convulvit. 198. & seq.
 Brill-Antonius Maria repente moritur. 242. & seq.
 Brutorum mors repentina quandoque ex causis universilibus. 165

C

C Adaverum frequens sectio magnæ utilitatis. 116
 — quales internæ læsiones inveniendæ sint, cautè à Medicis prædicendæ. 248
 Cadaverum foetor signum mortis certissimum. 88
 Calcis effluvia nocua. 212
 Camphorata in spasmo pectoris. 150. & seq.
 Capitis vulnera, vid. vulnera.
 — levis contusio &c. sæpe funesta, & cur. 64.
 Carbonum fumus, vid. fumus.
 Cardiaca in spasms pectoris quomodo usurpanda. 153
 Cardiogmos quando mortem repentinam portendat, etiam ex Hippocr. 113
 — rationes adducuntur, *ibid.* & seq.
 Carotides ad explorandum superstitem pulsum cur aptiores. 94
 Catarrhus suffocativus. 102
 Causæ subitanæ mortis quot, & quales. à pag. 15. usque ad 75.
 — semper cum tempore operantur. 15

Cc-

- Cerebri structura, ejusque viarum libertas ad vitam necessaria . pag. 59
- Cerebrum per nervos cor, & thoracem movet, & vicissim movetur. 5
- est unum ex tribus solidis majoris usus. 17
- ejus hemisphæria an è directo corporis partibus respondeant. 236. & seq.
- per decussim respondere, probatur. 237. & seq.
- horum subita, & constans læsio mortem repentinam accersit. 60.
- horum inæqualis moles; & consistentia in quodam cadavere. 225. & seq.
- ejus lentæ congestiones repente tandem jugulant. 65
- corticalis substantia polypea. 67
- vasorum turgentia quomodo dignoscatur. 217
- spasmus quænam indicent. 286. & seq.
- ejus, & cordis læsio, respirationis causâ; & contra. 76. & seq.
- eodem convulso, serum in ejus sinibus, tanquam effectus, reperitur. 34
- Cesconus Chirurgus Pontificius nominatus. 245
- Chalybeata, vide martialia.
- Chocolata pro causâ grassantis repentinae mortis perperam adducta. 167
- est prohi nutrimenti. 185.
- Ciborum indigentia, vide indigentia.
- Circulatio in præcordiis duplici ex causâ intercepta. 275
- Circulationis in cerebro inæqualitas ob sanguinis vitium. pag. 222
- ab Hippoc. indicatur. *ib.*
- Coffè potus in congestionum cura. 156
- Comatis ex consensu stomachi, & capitis, curatio. 209. & seq.
- Congestionum curatio Medicum exigit omnino prudentem. 155. & seq.
- Convulsio vasorum quomodo contingat. 276
- ejus causa experimentis roboratur. 289
- Convulsiones pertinaces ad subitam mortem sunt *viz.* 142
- ipsarum curatio extra paroxyfinum. 215
- Cor suis cum vasis est unum ex tribus solidis majoris usus. 3
- Eordis congrua structura ad vitam necessaria. 52
- etiam systole, & diastole. 55
- ejus, & vasorum vis circumpulsiva rationem habet ad determinatam sanguinis molem, & gravitatem. 33
- eadem à structura, fluidilique nerveo, & sanguineo pender. 54
- ideo, ab istorum fluidorum defectu, aut vitio labefactatur. *ibid.*
- convulsio, obstructio & c. mortis causâ. 54
- mira convulsio. 150. & seq.
- morsus à vermibus. 55
- dolor pertinax in senibus exitialis. 56. 112
- hujus rei ratio. *ib.* & seq. an.

- an in pectoris convulsio-
nibus cor compatiatur, ma-
ximè observandum. p. [150](#)
- Cordis motus in pseudo-mor-
tuis quinam. [94](#)
- sepultus quid indicet. [90](#)
- in pseudo-mortuis quo-
modo perquirendus. [94](#)
- palpitatio qualis plus, mi-
nus perniciofa. [110.](#) & seq.
- decubitu ad podicem, &
ad articulos, superata. [112](#)
- eadem cum sterni dolore
sepulto. [295](#)
- cum vertigine unde. [302](#)
- in palpitatione prodest
urina stranguriosa, vide uri-
na.
- paralyfis futuræ indicia.
[110.](#)
- Cordis farcomata in semiluna-
ribus valvulis. [227](#)
- vitia diversa ab Authori-
bus notata. [200](#)
- ingens amplitudo. [53.](#)
[247.](#) [257.](#)
- à Marchetto etiam inven-
ta. [268](#)
- magni, & prolabentis su-
pra diaphragma, symptoma-
ta. [255.](#) & seq.
- ejus rigiditas in cadavere.
[284.](#)
- immobilitas ex aortæ
compressione. [287](#)
- idem cor inventum inter
duo aneurysmata. [303](#)
- Cornacchini pulveris usus in
subitaneis morbis. [210](#)
- Corpora, repentinae morti sub-
jecta, multipliciter conside-
randa. [134.](#) & seq.
- bene nutrita phleboto-
miam cur feliciter fuerint
experta. [pag. 185.](#) & seq.
- Corporum varia dispositio ac-
ri noxio diversimodè resi-
stet. [21](#)
- post eorum excalectatio-
nem, frigidæ potus, & bal-
neum cur lethifera. [33](#)
- Corrosio lenta sanguiferorum
valetudinarios sæpe detinet.
[142.](#)
- Corrosionem magnorum va-
forum quænam præcedant.
[14.](#)
- Corticis Peruviani usus in præ-
servatione à spasmo. [147](#)
- Cranii foramen, vide foramen.
- Cranio desquamato, cerebrum
facile afficitur. [254](#)
- Crisis suppressa, ubi subitam
mortem prælagiat. [119](#)
- Crura, & pedes, paralyfi ten-
tata, facilius solvuntur,
quàm brachia. [201](#)
- hujus rei rationes, *ibid.* &
seq.
- Curforum præcordia cur facile
labefactentur. [260](#)
- Cyathus supra xiphoidem po-
situs ad explorandum, an
verè quis mortuus. [92](#)

D

- Decoctiones vulnerariæ,
vide vulnera.
- exiccantes dictæ, in apo-
plecticis sæpe noxiæ. [195](#)
- Deliquia animi, vide animi de-
liquia.
- Diabeticorum renes flaccidi,
ac ductiles. [290](#)
- Diaphragmatis vulnera, vide
vulnera septi, &c.

læso

- læsio tussim siccam exci-
tat. [pag. 67](#)
- qualis motus in pseudo-
mortuis. [92](#)
- idem quomodo perqui-
rendus. [ibid.](#)
- Diætæ athletis necessaria. [135.](#)
& seq.
- exiccans obefis injungen-
da. [139](#)
- præservativa in aneurys-
matibus ex Hipp. [143](#)
- cur in his tantopere com-
mendetur. [144](#)
- in epilepsiâ idiopathicâ.
[155.](#)
- pro præservatione à sub-
ito interitu. [159](#)
- Diætæ animi tranquillitas jun-
genda ex Divino Oraculo.
[ibid.](#)
- Diluentia temperata, ab Hipp.
quandoque laudata. [194](#)
- Disruptio vasorum non à solis
externis causis excitari po-
test, contra Laurentium.
[305.](#)
- in præcordiis, subitò; in
cerebro autem, non ita cele-
riter occidit. [36](#)
- hujus rei historia. [37](#)
- Divites à moribus repentinis
præ pauperibus cur felicius
evaserint. [173. & seq.](#)
- Dolores diurni circa cor,
&c. quid indicent. [14](#)
- interius pectoris, quinam
lethales. [102. & seq.](#)
- laterales, quosnam mor-
bos arguant. [103](#)
- in spasmodicis affectibus
quid admittant. [151](#)
- vagi externarum partium
quando lethales. [213](#)
- Doloris in sincipite, & oculo
sinistro causâ in opposito la-
tere delitescens. [1 ag. 67](#)
- Donarelli Physici Epistola. [23](#)
- Ducciæ in spasms à tenui ma-
teriâ pendentibus. [147](#)
- Duræ matris morbosa contra-
ctio in cadavere. [225. 284](#)
- laxitas. [247](#)
- paralyfis. [252](#)

E

- Emissarii oclusio sæpius
subitæ mortis prælu-
dium. [121](#)
- dum viget, est medela.
[124.](#)
- Emplastica in spasms, à subti-
li materiâ ortis. [147](#)
- Emulsiones in spasms pecto-
ris. [150. & seq.](#)
- Epicratica purgatio, vide pur-
gatio.
- Epidemica non fuit præsens
morientium constitutio. [172.](#)
& seq.
- Epilepsiâ cessante, cur inter-
dum mortifera corripit a-
poplexia. [46. & seq.](#)
- Epilepsia pertinax cur fre-
quenter in apoplexiam tran-
seat. [ibid.](#)
- quomodo contingat. [45](#)
- hac correpti, qui repente
decedant. [129. & seq.](#)
- in idiopathicâ abstinen-
dum à vino. [155](#)
- in sympathicâ tam vomit-
us, quàm purgatio, conve-
nit. [154](#)
- Epileptica apoplexia, vide
apoplexia &c.
- Escha-

- Escharotica nunquam spontaneis in hæmorrhagijs adhibenda. pag. 42
- Esterarum repulsio aliquando mortifera. [244](#)
- ex eâdem, brachii torpor. [250](#)
- Ethnicorum sententia de subitâ morte eligendâ damnatur. [132](#). & seq.
- Evacuaciones suppressæ modò sunt signa, modò etiam subitæ mortis causæ. [121](#). & seq.
- Exercitatio athletic quando imperanda. [136](#)
- ejus utilitas. [139](#)
- Exercitium vehemens vasorum rupturam promovet. [144](#).
- Experimenta Authoris de causis particularibus in singulis hoc anno orientibus. [168](#). & seq.
- Extispiciorum utilitas, & cautelæ. [228](#). & seq. [249](#)
- F**
- Facies in egrotis juxta cordis affectiones variè coloratur. [293](#)
- cadaverum sæpe Medicos erudit. [245](#)
- Facultas pulsiva ad vitam necessaria. [52](#)
- Febris quando subitam mortem possit avertere. [252](#)
- Ferramenta ignita pedum plantis admota in forti apoplexiâ. [191](#)
- Fibræ tendinæ, vide tendinæ.
- Fistulis ani occlusis, mors repentina quando. pag. [121](#)
- Fluida, & solida majoris usus animalium perfectorum vitam constituunt. [4](#)
- qualia sint. [3](#)
- Fluxilitas morbosa sanguinis in cujusdam corde, & cur. [280](#).
- summa sanguinis in cadavere. [283](#)
- rarò invenitur. [286](#)
- cur acciderit in nostro casu. [288](#). & seq.
- Fœminæ in hac mortiferâ constitutione maribus feliciores. [174](#)
- rationes adducuntur. [175](#)
- Fonticulorum occlusio sæpius mortis signum, quàm causa. [121](#)
- Fonticulus utiliter excitatur. [243](#).
- Foramen cranio forsan innatum. [247](#)
- quomodo infirmandæ duræ matri contulerit. [253](#)
- Frigidæ potus quando, & quomodo subitæ necis causa. [33](#). & seq.
- Frontis venarum incisio in præsentî constitutione utilis. [183](#).
- Frumenti corrupti exhalationes cur pestiferæ. [20](#). & seq.
- Fumus carbonum aerem ad necem usque inquinat. *ibid.*
- ex eodem trachæ color vitiat. [267](#)
- Funerum apparatus tardi cur inventi. [86](#)
- Fungi Melitensis vis vulneraria. [146](#)

G

- G** Attuccijs Physicus alle- pag. 220
gatus. pag. 220
Gaudio subito perculli cur in-
terdum repente concidunt. 33.
Glandula scirrhusa sub cere-
bello cur subitam mortem
asciverit. 71
Glandularum racemi ad sinus
duræ matris observati. 225
Glandulæ, uberiùs liquida fe-
cernentes, cur evadant gra-
ciliores, & è converso. 238.
& seq.
Graciles cur rariùs repente
moriantur. 118
Gummosa in phlegmaticis cõ-
gestionibus curandis. 156

H

- H** Æmorrhagia quando fit
subitæ necis præfagiã. 116.
— larga in quodam sene uti-
lis. 188. & seq.
— in spontaneã mirabilis fit
novi sanguinis reproductio.
43.
Hæmorrhoides senum sup-
pressæ, aliquando subitæ
mortis præludium. 120
— jisdem restitantis, for-
tis apoplexia. 204
— arte revocatis, morbi so-
lutio. 205
Harvæi experimentum pul-
chrum. 33. & seq.
Hemisphæria cerebri, vide ce-
rebri, &c.

- Hepatis tumor folliculatus
tussim siccam excitabat.
pag. 66. & seq.
— abscessus post interimen-
tia capitis vulnera. 130
Herbarum epicerastrarum u-
sus. 156
Hirudines naribus quando ap-
plicandæ. 217
Hispanicum vinum septeterio-
nalis ventus glaciatur. 20
Homo graviùs, & frequentius
ægrotat, quàm bruta. 131
Hydatis insignis in piã menin-
ge. 68
Hydrops pectoris repentinus
cur aliquando ex tempore
perimat. 50
— ex cavæ ligaturâ ortus.
277.
Hypochondriorum succi præ-
cordiis, & cerebro sæpe
mortiferi. 34
— quã viã ad has partes fe-
rantur. 206. 214. 278
— convulsiones eliminantia.
146. & seq.
— tensioni quomodo suc-
currendum. 214
Hystericis paroxysmis solum
tempus quandoque mede-
tur. 82
- I**
- I**mpetus liquidi, auctus in-
trã solidum minùs resistens,
sæpe funestissimus. 170
Indigentia cibi ab exercitio, &
ætate definienda. 137
Intemperantes &c. in præsen-
ti constitutione repente sub-
lati. 168. & seq. 175
In-

- Interceptionis vaporum Hippocraticæ modus exponitur. pag. 186
 — hanc phlebotomia tollit, teste Hippocr. *ibid.*
 Invincibiles repentinæ mortis causæ quales. 79. & seq.
 Jordanus publicus Romæ Machæseos Authoris Præceptor ex cordis convulsione convaluit. 151. & seq.
 Judicum cautela adversus simulatos mortuos. 84
 Jugularium incisio in hac constitutione cur proficua. 184. & seq.
 — cerebri, & præcordiorum morbos levat. 185
 Juris longi usus. 194

L

- L Acrymæ sanguineæ. 37
 Lactis usus in spasms à tenui materiâ. 146. & seq.
 Lamella ossea in aneurysmate. 296
 Laminæ ignitæ pedibus admotæ in forti apoplexiâ utiles. 191.
 Lana naribus admota ad dignoscendum, an quis mortuus. 91
 Latex à cadaveris pulmone compresso manans. 271
 Latinus Physicus carcerum. 245.
 Liquida quædam morbofa, per fecernicula naturalia ægré secedunt. 207
 Liquidi impetus, vide impetus.
 Liquidorum magna vitia soli-

- dis exitialia, & contra. pag. 78.
 Loquela, post raninas incisvas restituta. 200. & seq.
 Lympha, in thorace, aut cerebro collecta, non semper morbi, aut mortis causa. 34.
 Lymphæ congestio in spasms pectoris quibus avertenda. 150. & seq.
 — concretæ causa ex chymicis. 266.
 Lymphatica piæ matris varicosa. 67
 Lymphaticorum interiorum ruptura quomodo præcavenda. 145. & seq.

M

- M Ala, quæ mortem præcedunt, diligenter investiganda. 249
 Malaspina Abbas S. Pauli ex aphoniâ convaluit. 208. & seq.
 Mantredus inter Romanos Medicos, laudatur. 201
 Mares in hac constitutione feminis deterius habuerunt, & cur. 174. & seq.
 Marmontana, vide muris montani.
 Martialia in præservatione à spasms ex materiâ viscidâ. 147.
 Mechanicam in Medicinam primus invexit Hippocrates. 4
 Medici spes in hystericis paroxysms qualis. 82.
 — prudentia, & fama in
 R r 2 scien-

- scientiâ prædicendi. [pag. 96.](#)
& seq. [131.](#)
- ingens labor in curandis solidorum morbis. [218](#)
- cautela in prædicendis internis cadaverum læsionibus. [248](#)
- Medico-astronomicæ, vide observationes.
- Medicus in divinando fit peritus ex Hippocrate. [123](#)
- Meningum, & corticis cerebri motus ad vitam necessarius. [59.](#) & seq.
- ex horum constanti læsione mors citissima. *ibid.*
- compressis nervis, ad has partes tendentibus, idem, evenit. [71](#)
- convulsio in epilepsiâ idiopathicâ duplici de causâ contingit. [46](#)
- motus multipliciter ablati. [72](#)
- abscessus polypeus. [67](#)
- Menti, & sensibus non omnia innotescunt. [88](#)
- Del Miro Abbas, & Custos Bibliot. Vatic. nominatus. [148.](#)
- Mitchellus Physicus laudatus. [191](#)
- Morbi externi diurni curæ valitudinariis sæpe proficui. [157.](#)
- ex loco tantùm differunt. [207.](#)
- ipsorum occasiones perpendendæ ex Hippocrate. [221.](#)
- quomodo tractandi, ne subito perimant. [158](#)
- Morbi subitanei sub genere morbi attoniti omnes comprehenduntur. [pag. 75](#)
- Mors quid sit. [10](#)
- ejus divisio, & natura. [11.](#)
- etsi individua, in plures tamen vulgò distinguitur. [7](#)
- variæ ejus species multipliciter considerandæ. [8.](#) & seq.
- ejus varia discrimina Moralitatis ad corrigendos mores hominum utilia. *ibid.*
- inopinata à probis Viris non exoptanda. [132](#)
- naturalis accidit decrepitis æquè, ac juvenibus languidis. [11](#)
- subita ex obstructione, compressione &c. cordis, & vaforum. [54](#)
- quibus potissimum accidat. [100](#)
- quælibet est repentina, & cur. [7](#)
- subita ex constanti, magnâque partium majoris utius læsione. [16](#)
- in Senæ post haustam Villensem aquam. [70](#)
- ex interfecto Serpente. [29.](#) & seq.
- ex balneo calefacto cum lignis venenatis. [30](#)
- ex infuso per syringam aere intrâ vivorum venas, & cur. [19](#)
- ex venenato aere, & quomodo. [26](#)
- signis, non seorsim, sed collectim sumptis, tutius prædicatur. [108](#)
- ad eandem ex cerebro præfagiendam quæ requirantur. [123.](#) & seq.
- Mor-

Mortis idea ex Vitæ notione defumenda. pag. 1

— definitio mechanica. 10
— differentiæ unde petendæ. 9. & seq.

— causæ in repentinâ semper cum tempore operantur. 15

— sunt duplicis generis. 16

— occasiones sæpe confunduntur cum causis, vide occasiones.

— signum certissimum, vide fœtor.

Mortui simulati, quomodo dignoscantur. 84

— repenti, tardiùs sepeliendi. 86

Mortuus à pseudo-mortuo quomodo distinguendus. 90. & seq.

Motus non vitales aliquando etiam in mortuis. 92. & seq.

— cordis in pseudo-mortuis, vide cordis, &c.

Muris montani adeps ad paralyfim. 200

Mumiata in spasms præcordiorum quomodo usurpanda. 153

N

Narcoticorum usus in spasms cum dolore. 147.

Nalimueus suppressus à calcis effluviis. 212

— cruenta ab eodem filamenta pendentia interceptionis vasorum sunt indicia. 276

— venæ apertæ utiles in hac

constitutione. pag. 183

— eidem hirudines quando applicandæ. 217

Negligentiâ quandoque superantur morbi. 79

Nerveus succus unum ex tribus fluidis majoris usus. 3. & seq.

Nervis prope jugulum ligatis, mors in cane ex Valsalva. 71

Nervorum discontinuatio cû cerebro, insuperabilis causa repentinæ mortis. 79

— liquidi motus in pseudo-mortuis, qualis. 87. & seq.

— motiones sopitas excitantia. 96

— opticorum compress., vide optic.

Nobiles hujus constitutionis vim rari subjerunt. 173

— contrarium accidit Leidensibus, teste Sylvio. *ibid.*

Nuccarinus Fulginei Phycicus commendatus. 65

O

Obeis repentina totalis vasorum intrâ cranium obstructio facilis. 70

— cur præ gracilibus mors accidat improvisa. 118

— quomodo hæc prænoscat. 119

— præservativa remedia qualia. 138. & seq.

Observationes Medico-astronomiæ utiles ad prædicendum. 129

Ocasiones aliquando confunduntur cum causis subitæ mortis. 16

Odo.

Odoramenta venefica aerem pestiferum reddunt . pag. 20
 Oleosa cum fluidis exhibita à quibus spasms præservent. 147.
 — in spasms pectoris cum lymphæ congestione . 150. & seq.
 Omenti loco, nigra membrana in cadavere inventa . 226
 Opii ulsi vis vulneraria . 146
 Opticorum nervorum compressionem quænam indicent . 129
 Ordo anima disciplinarum . 123.
 Oris ventriculi morsus à vermibus . 55
 — collutiones ex dissolventibus utiles in aphonia . 199

P

Pacchionus Physicus laudatus . 68
 Palpitatio, vide cordis, &c.
 Pancreatis mollities excedens in cadavere . 283
 Paralysis præcordiorum, vide præcordiorum, &c.
 — cordis, & arteriarum 54. vide etiam cordis.
 — partium omnium intrà cranium . 252
 — post syncopem &c. opportuna . 216. & seq.
 — crurum cur facilius solvatur, quàm brachiorum . 201. & seq.
 — ex inæqualitate circulationis sanguinis . 222. & seq.
 — ex causâ calidâ, curatio . 217.
 Paregorica in spasms pectoris

quando conducant . p. 151
 Partes majoris usus vitam constituunt . 3. & seq.
 — minoris usus quomodo ad vitam conspirent . 6
 Pascolus Physicus, Publicus Anatomes Professor . 245
 Pauli Sac. Pal. Apost. Medicus . 245
 Pauperes, vide Divites.
 Pectoris hydrops repentinus, vide hydrops.
 — dolores, vide dolores pectoris.
 Penis est musculus . 291
 — rigidus in cadavere observatus . 282
 — spuria erectio in cadavere quomodo excitetur . 291. & seq.
 Pericardii cum corde adhæsio quibus familiaris . 232
 Pericardium concreto sanguine plenum . 297
 Periculum mortis quibus ægris aperiendum . 99
 Perspiratio in agentibus sessilem vitam, cur, & quibus in partibus minor habeatur . 137.
 Pestes animalium particulares unde . 21
 Philosophia experimentalis illustratur etiam his, quæ successum non habuerunt . 9
 Phthisicis quale æquinoctium magis lethale . 120
 Physicis mortium varia discrimina quid suggerant . 9.
 Piæ matris lymphatica, vide lymphatica.
 Pierleonus Medicus allegatus . 205.

Pilul.

- Pilul. de succino Cratonis u-
fus. pag. 206
— de spumâ chalyb. 154
Placentius Medicorum Urbis
senior in auctoritatem ad-
ductus. 167
— ejusdem mentio. 201. 220.
245.
Plethora nimia, repentina
mortis causa. 33
— oritur sæpe à stomacho
valido. 136
Podagrâ suppressâ, quinam
morbi insurgant. 68
Pondus aeris ex fodinarum ef-
fluviis majus. 20
Polypi acidis, non alkalicis,
dissolvuntur. 280. & seq.
— constructio in aneurys-
mate. 296
Præcordia in Curforibus, vide
Curforum, &c.
— jisdem convulsis, feri ef-
fusio intrâ thoracem. 34
Præcordiorum labe, à liene
communicata. 274. & seq.
— aneurysmata, vide aneu-
rysmata, &c.
— paralysis mortem infert
insensibilem. 14
— dilatatio morbosa princi-
piis hydrometricis illustra-
ta. 262. & seq.
— pertinax convulsio, post-
quam cessaverit, cur nihilo-
minus interdum mortifera.
56. & seq.
— Ipsimum quæ signa indi-
cent. 286
Præfocati aliquando naturali-
ter redivivi. 78. & seq.
Præservativa methodus à sub-
bitaneis mortibus. à 96. us-
que ad 160.
— ex Christi Oraculo vera
in tranquillitate, & sobrie-
tate. pag. 159
Prolabentis cordis supra dia-
phragma modus mechani-
cus exponitur. pag. 260. &
seq.
— cur in isto casu palpitatio
post cibum succedat. 261
Prolapsus cordis quandoque
hydropem mentitur. 269
— symptomata ipsam con-
comitantia. 255. & seq.
Prudentia summa est necessa-
ria in Medicinâ. 97
— quomodo acquiratur. 98
Pseudo-mortui difficulter à
mortuis distinguuntur. 87
— quomodo tamen id asse-
quatur. 90. & seq.
— in his centrum diaphrag-
matis solum trepidat. 87
— cordis motus in jisdem
qualis. *ibid.*
Puerperis mors repentina quæ-
do. 120
Pulmonicæ venæ, vide venæ,
&c.
Pulmonum adhæsiō cum co-
stis. 271. 283.
— aliquibus fortè naturalis.
279.
— latex ab ipsorum superfi-
cie manans. 271
— rigiditas in cadavere. 283.
& seq.
— apoplexia mortifera. 102
— eorundem articulorum
convulsio. *ibid.*
— eorundem vomica quos-
nam repente interimat. 104
— ex eâ quinam diutius ser-
ventur. *ibid.* & seq.
Pulsus in carpis deficiens non
sem-

- semper cordis motus cessationem testatur. p.93. & seq.
- intermittens non semper funestus. 109
- Authoris experimento comprobatur. *ibid.*
- quando periculosus. 110
- tardus quando exitialis. *ibid.*
- aliquando, ob tangentis incuriam, mortuis attribui potest. 95
- Purgatio epicratica quam plenitudinem adimat. 138
- eadem, Romæ præsertim, ab apoplexiâ præservat. 154
- valida non damnanda in curatione coactâ. 192. & seq.
- de Puteo-Equitis Commendatarii historia mirabilis. 65. & seq.
- Q**
- Q**uercet. antiepilepticum medicamentum laudatur. 218
- R**
- R**aninis incisus, vide loquela.
- Realis Sacri Palatii Apostoli Medicus. 245
- Remedia mixta quando usurpanda. 156
- Repentè mortui tardè sepeliendi. 86
- quo morbo laboraverint, maximè sciendum. 241
- Repentinæ mortis idea. p.13
- species rara etiam ex Laurentio. 305
- causæ sunt duplicis generis. 16
- semper cum tempore operari solent. 15
- non omnes invincibiles. 79. 81.
- vincibiles ex medentium audaciâ, & naturæ vi quales. 81
- quænam invincibiles. 80. & seq.
- eadem mors à magnâ sanguinis diminutione. 32
- ex pertinaci ejusdem morâ, aut impetu in præcordiis, & cerebro. *ibid.*
- ob spiritum spontè cohibitum. 59
- excelsis parietibus cordis, & sanguiferorum. 52. & seq.
- quomodo ex inflicto pugno sub xiphoide. 56
- inhibito spirituum animalium influxu ad præcordia. 60
- à levi capitis contusione, &c. 64
- cur in his præcedat rigor. *ibid.*
- quomodo ex sternutatione contingat. *ibid.*
- ex lentis in cerebro congestionibus. 65
- compressis &c. nervis, etiam extra cranium. 71
- aeris, ac instrumentorum respirationis vitio. 75
- ob triplicem contemporaneum morbum. 77. 293
- Repentina mors quandoque fal-

- falso adscribitur internæ causæ. pag. 61
 — ex dissecto cadavere distinguitur. *ibid.*
 — hujus rei exemplum. *ibid.*
 — quandoque grassatur in homines, & bruta; ex causis universalibus. 165
 — ejusdem causa in præsentî constitutione non universalis, sed particularis fuit. 166
 — idcirco non unicum signorum genus prævit. 175. & seq.
 — cum ab universali causâ producitur, eadem semper signa adfunt. 176
 — eâ grassante, cæteri morbi, & mortes, Romæ minùs frequentes. 177. & seq.
 — & contra. 180. & seq.
 Respiratio intercepta, qualis, ut occidat. 27
 Rotæ Præfulis historia. 183. & seq.
 de Rubeis Medicus nominatus. 205
- S**
- Sacchetti Cardinalis mors, ejusque cerebri inspectio. 68.
 Salis urinosi vis ad dissolvendum sanguinem. 289
 Salfæ infusio in paralyfi utilis. 199. 206.
 Sanguis unum ex fluidis majoris usus.
 — instar aquæ hydraulicâ machinâ movetur, & movet. 4
 — quadrupliciter fit causa mortis repentinæ. 32
 — intrâ compressam arteriam violenter trusus, cunei, & vectis potentiam induit. pag. 263
 — effusus in cerebro, ubi apoplexiam cum paralyfi, ubi aphoniam, & convulsionem, tandemque apoplexiam inducit. 41
 Sanguinis impetus, aut mora pertinax ubi mortis repentinæ causa. 32
 — fluxus ad cerebrum interceptus subito interficit. 35
 — missio parca in principio aneurysmatum laudatur. 143.
 — item in morbis capitis cû plenitudine. 154
 — in hac constitutione profuit ex syderatâ etiam parte, & cur. 182. & seq.
 — ex jugularibus, & sublingualibus. 183. & seq.
 — tollit vasorum interceptionem. 186
 — Romæ non semper prodest. 187. & seq.
 — quando omittenda. 210. & seq.
 Sanguinis coagulatio lacti coacto assimilatur ab Hipp. 171
 — hanc ferositatum exundatio consequitur. *ibid.*
 — morbosa penetratio ad cerebri medullam unde. 291
 — fluxilitas, vide fluxilitas.
 Sarcomata cordis, vide cordis, &c.
 Saxus Physicus allegatus. 220
 Secernicul. natural. vide liquida.
 Senes syderationibus sunt subiecti. 123. & seq.
 Ss
 quan-

- quando facile evadant apoplectici. p. [128](#). & seq.
- Sensibus, & menti non omnia innotescunt, vide menti.
- Senum tussis, vide tussis.
- dolor cordis, vide cordis.
- hæmorrhoides, vide hæmorrhoides.
- jisdem bene nutritis phlebotomia salutaris. [188](#)
- Septi transversi vulnera, vide vulnera thorac.
- Septentrionalis ventus mortifer, vinumque hispanicum congelians.
- Sepulchrorum exhalationes cur exitiales. *ibid.*
- Serpentum, ex morâ in arborum cavernis, venenum exaltatur. [76](#). & seq.
- jidem dicuntur Dryini. [30](#).
- Serum lactis quibus spasms conferat. [147](#)
- cum infusione radicis chinæ, ubi usurpandum. [158](#)
- Setonis usus. [218](#)
- Simoncellas Publ. Anat. Mistr. [145](#)
- Sincipitis sinistri dolor, vide dolor.
- Singularium natura per ideas abstractas raro elucescit. r. & seq.
- Sinibaldus Protomedicus latus datus. [189.220.245](#)
- Sinister cordis sinus duplo major dextero. [258](#)
- cur sanguinis motus per hunc tardior fuerit. [264](#). & seq.
- Sobrietas vitæ protrahendæ fundamentum. [138](#)
- aneurysmaticis maxime conducit. [pag.143](#). & seq.
- Solida, & fluida majoris usus quomodo animalium perfectorum vitam constituunt. [4](#)
- utraque sunt tria. [3](#)
- ad interitum mutuo conspirant. [49](#)
- eadem structurâ, vel motu pertinaciter læsa sunt mortis repentinæ causa. [49](#)
- Solidorum vitia fluidis exitialia, & contra. [78](#)
- morbi difficilis sunt curationis. [218](#)
- Solstitia apoplexiarum feracia. [128](#)
- Spada Præful ex epilepsiâ, in fortem apoplexiam degenerante, succubuit. [211](#). & seq.
- Spasmi pectoris quomodo sint tractandi. [150](#). & seq.
- Spasms, à materiâ subtili productis, quomodo succurrendum. [146](#). & seq.
- à materiâ viscidâ, aliter tractandi. [147](#)
- Spasmus universalis à meningibus. [288](#)
- Sphacelati artus, vide artuum.
- Spiritus in homine summa necessitas. [50](#)
- spontè cohibitus subitæ mortis causa. [50](#)
- Spiritus dictus vitæ quid, ejusque usus. [199](#)
- Spirituum defectus mortalis ex variis causis. [35](#). & seq.
- copia quomodo exitialis. [45](#).
- item acrimonia. *ibid.*
- vitium ab aere hauustum. [48](#).
- animalium descensus ad præ-

- præcordia inhibitus subitæ ,
mortis causa . pag. 60
- Splanchnici nervi quales . 3
- Sterni dolor sepultus , &c. 295
- pars dextera elatior in-
venta . 296
- Sternuentibus mors subita . 64
- mos precandi salutem
unde . 65
- Sternutatoria acria pro septimâ
respiratione excitandâ . 91
- Stibiata in thoracis spasms
quando convenient . 153
- in curatione phlegmati-
carum congestionum . 156
- Stibii diaph. usus ad aphoniam
utilis . 199
- Stomachus validus cur inter-
dum plethoricis insensus .
136
- debilis quomodo ad pro-
trahendam vitam conferat .
138
- ad ejus languorem jus ap-
propriatum . 210
- Succinata in thoracis spasms .
150 & seq.
- Suffocatio inter morbos hujus
constitutionis . 75
- Sulphurata in spasms pecto-
ris . 150 & seq.
- Sutoria ars infirmendis præ-
cordiorum partibus condu-
cit . 301
- Syderationis origo interdum
à corde, ejusque vasis . 294
- nomine, quid compre-
dat Hippocr. 293 & seq.
- Syncope ex cordis, & arteria-
rum paralyfi . 54
- morbus hujus consti-
tutionis . 75 & seq.
- hac correpti, vide præso-
cati .
- ab erosione &c. est invin-
cibilis . pag. 80
- ejusdem recursus . 214
- vitio valvularum cordis
observata . 235 & seq.
- Syncope lethalem ex ob-
structione &c. quænam præ-
cedant . 14
- Synopsis particularis mortife-
ræ causa mixta . 251 & seq.
- periculum detractum .
216

T

- T Abaci usus non fuit in
causâ grassantium repē-
tinarum mortium . 167
- Tabidis &c. cordis cum peri-
cardio adhæsiō familiaris .
232
- Taciturnitas quid indicet . 215
- 218
- Temperati mortem repenti-
nam hoc anno non subje-
runt . 173
- Tendinæ fibræ, pulmones
costis colligantes . 271
- Terræmotus pro causâ hujus
mortiferæ constitutionis fal-
sò accusatur . 167
- Thé in congestionibus curan-
dis . 156
- Thomassinus. Protomedicus
allegatus . 245
- Thoracis vasis interceptis, apo-
plexia succedit ex Martian.
& Fracass. 273
- Terebinthinata in spasms pec-
toris cum lymphæ conge-
stione . 150 & seq.
- in curatione congestio-
num . 156
- Ss 2. Tho-

Thoracis vulnera, vide vulnera thoracis.

— in spasmodis quid observandum. pag. 150. & seq.

Timidi quomodo à subitâ necesse præcavendi. 140

— ipsorum cerebri constitutio qualis. *ibid.*

Timor quomodo lipothymiam inducat. 26

Timore subito percussi, interdum repente concidunt. 33

— ex simplici timore mortui quomodo dignoscantur à mortuis ex veneno. 25

Timoris, & audaciæ causa in solidis partibus. 115

de Totis Præful forti ex apoplexiâ mortuus. 124. & seq.

Tracheæ vitio subita mors variè contingit. 49. & seq.

— color fuliginosus, vide fumus.

Trullus Physicus laudatus. 68. 209. 245.

Tuberculo apparente ad exteriora, pectoris, & cerebri quorundam symptomatum alleviatio. 218

Tuberculum pulmonis sepulturnum quomodo dignoscatur. 103.

— de ipso quando dubitandum. 150

Tussis sicca ex diaphragmatis labe. 67

— cum fœtore quid indicet. 104.

— diuturnæ humidæ in siccam conversio in senibus exitialis. 101

— suffocativa quomodo. *ib.*

V

Valetudinarii alii interiorius, alii exteriorius ægrotant. pag. 141. & seq.

— triplex affectionum genus eos ad subitam necem disponit. 142. & seq.

— quomodo ab eadem præservandi. 157. & seq.

— in præsentî constitutione subito perire. 168

Valetudinariis diuturni morbi externi sæpe conferunt. 157

— mors subita fuit Romæ instar malæ crisis. 169

Valsalva Anatomicus Bonon. laudatur. 221. 236

— ejusdem experimentum nobile. 71

Valvularum semilunariû farcomata. 227

— à nemine indicata. 232. & seq.

— productio quomodo evenit. 234

— ejusdem durantibus, quomodo pulsus æqualis esse poterit. 235

— quomodo syncopem sollicitaverint. *ibid.* & seq.

Varices in pulmone cadaveris. 227.

— pro aneurysmatibus accipit Hippocr. 143

— internæ cognitu difficiles. 98

— lymphaticorum piæ matris. 67

Variolarum retrocessio quando mortifera. 120

Vasorum magnorum corrosionem quid præcedat. 14

stru-

- structura, & libertas ad vitam necessaria. pag. 52
- convulsio, compressio, &c. mortis causæ. 54
- interceptio, vide interceptio.
- dihiscencia in ascite. 280
- disruptio, vide disruptio.
- Vasorum, & cordis vis pulsiva determinatæ moli, & gravitati sanguinis proportionalis. 33
- Vecchiottus à capitis veterno duabus largis hæmorrhagiis è naribus vindicatus. 188. & seq.
- tandem mortuus. 189. & seq.
- Venæ pulmonicæ dilatatæ indicia. 102. & seq.
- rupturam quænam præcedant. 103. & seq.
- Venæ cavæ ruptura. 298
- corrosio quomodo inducitur. 302
- Venenum aeris per quas vias in sanguinem feratur. 27
- an per omnia sensuum organa possit traduci. 28. & seq.
- Venetiis olim repentinæ mortes grassatæ sunt. 177
- Ventriculi vitia, cerebro, & præcordiis communicata. 34.
- Ventus interdum mortifer. 20
- Venus in senibus perniciofa. 44
- Vermium morsus quomodo mortem inferat. 55
- in ipsorum suspitione quid agendum. 147
- Vertigo tenebricosa. 295
- cum palpitatione cordis unde. 302
- Vesicantia sunt emissaria artificialia. pag. 191
- ipsorum usus, & utilitas. 190. & seq. 207. & seq.
- quid excitent. *ibid.*
- Veternus largâ hæmorrhagiâ in senes sanatus. 188. & seq.
- Victus plenus ubi noxius. 209
- Vini abstinentia athleticis necessaria. 135
- item in epilepsiâ idiopathicâ. 155
- Viperata in præcordiorum spasms quando præscribenda. 153
- valetudinariis præservandis. 158
- Virium præceps lapsus. 303
- Vis movens, ad vitam necessaria. 52
- Viscerum vigor confert ad morbos ad exteriora detruendos, & contra. 221. & seq.
- Vitæ notio veram mortis ideâ exhibet. 1
- de hac Aristoteles obscurè scripsit. 2
- universalis conceptus unde. *ibid.*
- tria sunt necessaria ex parte cordis, & magnorum vasorum. 52
- tria quoque ex parte cerebri, & nervorum. 59. & seq.
- Vita in animalibus perfectis in quo consistat. 4. & seq.
- ejus definitio physico-mechanica. 5. & seq.
- apud insecta hyeme absque sensibili motu quomodo conservetur. 88
- longa ob sobrietatem. 138.

sepul-

- sepulta in morientibus
quomodo excitanda. pag. 94
- Vocum numerum superant
res, rerumque modi. 2
- Volatilia, non tamen purè vi-
nosa, in repentinis morbis
hujus constitutionis utilia.
195. & seq.
- Vomica pulmonum, vide pul-
monum.
- Vomitus in epilepsiâ sympa-
thiciâ excitandus. 154
- quibus proficius. 193
- Urina stranguriosa in palpi-
tatione salutaris. 111
- quando dubia. 216
- Uteri convulsionum medela.
147.
- Uterus quomodo labem mor-
tiferam in præcordia, & ce-
rebrum suffundat. 34
- Vulnera circa jugulum cur le-
thalia. 36
- thoracis, & septi simul
transversi quænam, & cur
perimant. pag. 51
- capitis subito encantantia,
quæ. 130
- Vulnerar. decoct. usus in va-
forum atoniâ. 145. & seq.
- Vulnus capitis profundum cur
lethale. 64

X

- X Iphoidis cartilaginis per-
cussio cur aliquando
mortifera. 56
- mirabilis partium nexus,
sub ipsâ delitescens. *ibid.*
- cyathuseidem applicatus
ad quid. 92

Z

- Z Accagnius Abbas, &
Custos Biblior. Vatic.
nominatus. 148.

F I N I S.

147462

364



